

عِلّاجِ نَبَوِیؐ

اور  
جدید سائنس

پیٹ کی بیماریاں

ڈاکٹر خالد غزنوی

علاج نبوی

اور  
جدید سائنس

besturdubooks

ڈاکٹر الفیصل

نمائش ان تاجران کتب  
غنی سرگت انوار اسلام

الفیصل

615.321 Khalid Ghaznavi, Dr.  
Elaaj-e-Nabvi aur Jadedd Science/  
Dr. Khalid Ghaznavi.- Lahore: Al-Faisal  
Nashran, 2011.  
386p.

I. Elaaj-e-Nabvi I. Title Card.

ISBN 969-503-009-2

besturdubooks

جملہ حقوق محفوظ۔

اکتوبر 2011ء

محرر فیصل نے

آر۔ آر پرٹرز سے چھپوا کر شائع کی۔

قیمت:- 300 روپے

**AL-FAISAL NASHRAN**

Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore, Pakistan  
Phone: 042-7230777 & 042-7231387  
http: www.alfaishalpublishers.com  
e-mail: alfaishalpublisher@yahoo.com

# مندرجات

صفحہ نمبر

نمبر شمار

7	جشن یحییٰ سید محمد کرم شاہ الازہری	بسم اللہ	
9	حکیم محمد سعید	پیش نظر	
11	ڈاکٹر رفیق احمد چوہدری	مقدمہ	
	ڈاکٹر کٹر ایلٹھ سردسز پنجاب		
13	ڈاکٹر خالد غزنوی		
17	DIGESTIVE SYSTEM	آشامی کا نظام انضام	1
30	ANOREXIA	بھوک نہ لانا	2
41	AEROPHAGY	ڈکار مارنا	3
44	FLATULENCE	تخیر معدہ - اپھارہ	4
48	DYSPEPSIA	بد ہضمی	5
54	GASTRITIS ACUTE & CHRONIC	سوزش معدہ	6
60	PEPTIC ULCER	معدے کا اصر	7
77	CANCER STOMACH	معدہ کا کینسر	8
81	GASTRO ENTERITIS	معدہ اور انتڑیوں کی سوزش	9
		(التهاب معدہ و امعاء)	
106	DYSENTRY ACUTE & AMOEBIC	شہید اور امیبائی پیش	10
117	DIARRHOEA	اسہال	11
129	INFANTILE DIARRHOEA	بچوں کا اسہال	12
140	CHOLERA	بیشہ	13
150	TYPHOID FEVER	تب محرقہ	14
165	ULCERATIVE COLITIS	آنتوں کے زخم	15

## مندرجات

صفحہ نمبر

نمبر شمار

172	CROHN'S DISEASE	ستوں کے سوزشی زخم	16
	REGIONAL ILEITIS		
178	INTESTINAL TUBERCULOSIS	ستوں کی دق	17
200	MALABSORPTION SYNDROME	غذا کا عدم جذب	18
	COELIAC DISEASE	چکنائی کے امعاء	19
205	CANCER COLON	بڑی آنت کے خج	20
215	DISEASES OF THE LIVER &	جگر کی بیماریاں اور پیرقان	21
	JAUNDICE		
241	DISEASES OF THE GALL BLADDER	پتھر کی بیماریاں	22
266	INTESTINAL WORMS	دیت کے کیرے	23
	(HELEMENTIASIS)		
298	ASCITIES	استقاء (دیت میں پانی بھر جانا)	24
307	CONSTIPATION	قبض	25
336	PILES (HAEMORRHOIDS)	ہوا میر	26
348	DIABETES	ذیابیطس	27

## بسم الله الرحمن الرحيم

اللہ تعالیٰ نے ہادی برحق، مرشد جن و انس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو کتاب مقدس نازل فرمائی اس کا تعارف اپنی زبان قدرت سے یوں کرایا

تَنْزِيلًا مِّنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

یعنی اس کتاب میں جسمانی، روحانی، قلبی اور ذہنی بیماریوں کے لئے شفا ہے۔ اور اہل ایمان کے لئے سربا (سرچشمہ) ہے۔ اگر ہم اس نسخہ کیس کا اس نقطہ نظر سے مطالعہ کریں تو ہمیں ہر بیماری کا معجزہ دریافت ہو سکتا ہے۔

صحت و تندرستی کے مسئلہ کو علامہ ابن حبیب اللاندلسی نے لے کر آج تک ماہر اہلباء نے ہر حیثیت میں مرتب کیا ہے۔ ان میں سے ہر کتاب کو اس کی افادیت کے پیش نظر ہر زمانہ کے علماء و فضلاء نے شکر و تحسین کی بخشی۔

عہد حاضر میں ڈاکٹر خالد غزنوی نے صحت کی بقاء اور بیماریوں کے علاج کے لئے قرآن کریم اور احادیث طیبہ کے چشمہ شیریں سے استفادہ کے لئے جدید سائنسی معیار کے مطابق امراض کو ایک نیا بیج عطا کیا ہے۔ اس نیک کام کی ابتداء ماہنامہ خبیائے حرم کے صفحات سے ہوئی اور اب ان کی یہ کاوشیں اتنی ترقی پذیر ہو چکی ہیں کہ انہوں نے علاج نبوی کا جدید طریقہ علاج سے موازنہ کرتے ہوئے علم طب کو ایک باضابطہ کتاب کی صورت میں پیش کر دیا ہے۔

اس مستحسن اقدام کا آغاز انہوں نے ہیٹ کی بیماریوں سے کیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں انہوں نے نبی کریم رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے راہنمائی حاصل کی ہے۔

المعدة حوض البدن والعروق اليها واردة فاذا صحت المعدة  
صدرت العروق بالصحة - واذا فسدت المعدة صدرت  
العروق بالسقم - (نکاتی)

مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد گرامی سے ہماری راہنمائی  
کی ہے کہ اکثر و بیشتر بیماریاں پیٹ کی خرابی سے جنم لیتی ہیں اگر معدہ صحیح ہو گا تو  
سندرتی کو کوئی خطرہ نہ ہو گا۔ اور اگر معدہ میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کا معقول اور  
آسان علاج بھی ارشادات نبوی میں موجود ہے۔ بیماریوں کے اسباب میں غذا۔ منہض  
قوت مدافعت اور غذا کی حفاظت۔ پینے کا پانی۔ چھوت اور متعدد دوسرے فنی  
مسائل بھی زیرِ بحث آتے ہیں جن کو اس مفید مجموعہ میں جدید نظریات کے مطابق  
بیان کرنے کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ ان ہدایات کا ماخذ بھی اسلام ہی ہے۔  
میری دعا ہے اللہ تعالیٰ رحمہم واکثرہم فی نوری صاحب کی اس کاوش کو شرف قبولیت  
بخشے اور لوگوں کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ آمین ثم آمین

پیشکش پیر محمد کرم شاہ الازہری  
سجادہ نشین خانہ عالیہ امیرہ بھیمہ شریف  
راجستھان ریاست آف پاکستان  
نومبر ۱۹۶۹ء

## پیش لفظ

محترم صاحب ڈاکٹر خالد غزنوی نے طب نبوی کی روشنی میں جدید سائنس کے مطالعے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، وہ منزل بہ منزل آگے بڑھ رہا ہے، پہلے انہوں نے طب نبوی میں مجوزہ ادویہ دو کتابیں لکھیں اور جدید سائنس کی روشنی میں ان کے خواص و اثرات کا محققانہ جائزہ پیش کیا جو علمی اور طبی حلقوں میں کافی مقبول ہوا۔

اب اس سلسلے کی تیسری کتاب ”طب نبوی“ میں تجویز کردہ ادویہ سے امراض کے علاج پر ہمارے سامنے ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی وقت نظر کے ساتھ مرتب کی ہے۔

یہ محققین و معالجین کے لئے رہنما بھی ہے اور مریضوں کی مجوزہ کو غیر سائنسی اور محض روحانی سمجھنے والوں کے لئے ایک چیلنج بھی۔

مصنف کتاب نے طب نبوی کے حوالے سے تقریباً ستا سو امراض کا ذکر کیا ہے اور ان کے جدید طبی تحقیقات، تشخیص امراض اور علاج کی وضاحت کے بعد نہایت اعتماد یقین کے ساتھ طب نبوی سے بھی ان امراض کا علاج پیش کر دیا ہے۔

ڈاکٹر خالد غزنوی کی اس مفید اور اعلیٰ تحقیق کا سلسلہ اب صرف نظری نہیں بلکہ عملی مرحلے پر ہے اور جدید طبی علاج کے ماہرین کو ان کا مشورہ ہے کہ وہ جدید انداز سے اپنے ملاحظات مکمل کرنے کے بعد جب امراض کی تشخیص کر لیں تو طب نبوی کی مجوزہ ادویہ سے علاج کریں، انشاء اللہ سو فیصد نتائج حاصل ہوں گے۔ اور طب نبوی میں مجوزہ ادویہ سائنسی حقائق کا ایک جہاں تازہ سامنے آئے گا۔



میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے معافین اور سائنس دانوں کے لئے ان کی یہ کتاب وسیلہ رحمت ثابت ہوگی اور وہ خود اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانے کی سعی پیغ کریں گے۔

بلاشبہ یہ ایک عظیم خدمت ہے اور میں خدمت کی سعادت میسر آنے پر ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب کو مبارک باد پیش کرتا ہوں۔

عظیم محمد سعید

besturdubooks

## مقدمہ

جس کسی ملک کو سیاسی اقتدار حاصل ہوتا ہے تو دنیا بھر سے ہنرمند پذیرائی کی غرض سے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہاں پر علوم کی ترقی اور تحقیقات کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً آہ میں موجودہ کام کا مقامی زبانوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وہاں کے نوجوان اس علم کو حاصل کرنے کے لئے ترقی یافتہ ممالک میں جاتے ہیں اور پھر اپنے علم کو کام میں لاتے ہوئے تعلیمات کرتے ہیں۔

مسلمانوں نے دنیا بھر کے کتابیں حاصل کر کے ان کا عربی میں ترجمہ کیا تو ان میں ابو القاسم زہراوی اور ابن سینا جیسے بڑے ہوئے۔ یورپ کے طالب علم ہسپانیہ سے علم حاصل کرتے ہوئے واپس گئے تو انہوں نے ان کتابوں کو سائنسی علوم کی ابتدا فردوس الحکمت اور قانون کے تراجم سے ہوتی تھی کہ پھر ان کو پاپا ماسویہ صغیر دمشق کی تصنیف کا ترجمہ تھا۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمن سائنس دانوں نے علم حاصل کرنے کی دوڑ ہوئی تو روس اور امریکہ کے ایٹمی اور خلائی پروگراموں کے پیچھے جرمن سائنس دان نظر آنے لگے۔ سعودی عرب میں علوم کا ارتقاء بھی ہمارے سامنے کی بات ہے۔ سعودی نوجوان پاکستان کے میڈیکل کالجوں سے پڑھ کر جاتے رہے ہیں۔ پاکستان ڈاکٹر وہاں پر طبی خدمات بجالاتے رہے ہیں۔ مگر اب صورت حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے یہاں تین ایسے میڈیکل کالج قائم کر لئے ہیں جو دنیا کے کسی بھی مشہور شفاخانے سے زیادہ جدید اور عمدہ ہیں۔ جس طرح کبھی بغداد کے ہسپتال کو شہرت حاصل تھی آج وہی شہرت ریاض کے ہسپتال نے حاصل کر لی ہے۔

پاکستان کے لوگوں کو علوم و قانون پر دسترس کبھی تھی بات نہیں۔ تقسیم ملک سے

پہلے بھی یہاں پر عالمی شہرت کے سائنس دان موجود تھے اور جوہر قابل کی موجودگی۔  
 باوجود یہاں پر اتنا تحقیقاتی کام نہیں ہوا جتنا کہ ہونا چاہئے۔ اور جوہر وہ اپنی زبان  
 میں نہ ہو سکا۔ ان حالات میں جب کوئی سائنس دان اپنی زبان میں کوئی کوشش کرتا  
 ہے تو اس کی پذیرائی ہمارا قومی فریضہ بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر خالد غزنوی کی بہت اور  
 کوشش قابل داد ہے کہ انہوں نے علم طب پر ایک کتاب تن و تنہا مرتب کی۔ ”علاج  
 نبوی اور جدید سائنس“ میں مجھے جو سب سے بڑی خوبی نظر آئی وہ یہ ہے کہ اس میں  
 جدید علاج کے ساتھ طب نبویؐ کو شامل کر کے اس کی افادیت میں اضافہ کر دیا گیا  
 ہے۔ انہوں نے متعدد قسم کے علاج پیش کر کے اسے مفید ہی نہیں بتایا بلکہ اسے  
 مستندہ تحقیقات کے ذریعے اس کے لئے مشعل ہدایت بنا دیا ہے۔  
 میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے سائنس دان اسی طرح تحقیق پر توجہ دے  
 کر اپنے ملک کا نام روشن کر سکیں۔

ڈاکٹر محمد رفیع چوہدری  
 ڈاکٹر خالد غزنوی کے ساتھ سروسز پنجاب (دوبائی امراض)  
 ہیٹ کی بیماریوں کے علاج میں طب نبویؐ کے ڈاکٹر خالد غزنوی نے  
 ایک مفید کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ مجھے ”علاج نبویؐ“ کی یہ کتاب پسند آئی۔

پروفیسر محمد اشرف  
 صدر کلیہ علم الادویہ، جامعہ اسلامیہ رشتی  
 بیماریوں کے علاج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے لئے بہترین  
 راستہ ہیں۔ ڈاکٹر خالد غزنوی نے ہیٹ کی بیماریوں کے علاج میں اس مفید علم کو شامل  
 کرنے کا عظیم خدمت سرانجام دی ہے۔

پروفیسر محمد ابراہیم چوہدری  
 پرنسپل نیشنل میڈیکل کالج، ملتان

## علومِ نبیہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مرامی بہترین اخلاق کا نمونہ ہونے کے ساتھ ساتھ علوم و فنون کا سرچشمہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے احکام اور اسلوبِ زندگی سکھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ میں ان کو جب پسند فرمایا تو دنیاوی لحاظ سے خواندہ نہ تھے۔ قرآن مجید اس امر کا سرشقیت ہے کہ ان کو ہر وہ علم سکھا دیا گیا جو ان کو پہلے سے نہ آتا تھا۔ ایک ناخواندہ کو علوم و فنون کا سرچشمہ بنا دینا قدرتِ الہی کا شاندار مظاہرہ تھا۔

لوگوں کو اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہوئے انہوں نے میل جول کے طریقوں سے لے کر سب سے زیادہ اہم رکھنے کے اصول بھی مرحمت فرمائے وہ جسمانی صحت کے ساتھ دماغی صحت کو بروقت رکھنے کے طریقے بھی سکھائے۔

آج دنیا بھر میں خود کشی اور منشیات کے مسئلے قوموں کے لیے مصیبت کا باعث بنے ہوئے ہیں لیکن وہ کہ جو ان کے اسلئے عمل پیرا ہیں ان مسائل سے محفوظ ہیں۔ مسلمان خدا کی رحمت سے کبھی ہلکے نہیں ہوتے۔ وہ اپنی کسی بھی دینی معاشی یا کاروباری الجھن کے حل کے لیے اپنے خدا سے عرض گزار ہو سکتا ہے جو کہ اس کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور اس کے سامنے کی ضرورت مانتا ہے مسلمان کبھی تنہائی اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتا کہ جس نے دن میں پانچ مرتبہ صاف ستھرا ہو کر اہل محلہ کے ساتھ مل کر نماز پڑھنی ہے جہاں ہر قسم کی باتوں پر تبادلہ خیال ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان پر وہ سب کے کا حق ہے کہ وہ اس کی بیماری میں عیادت کرے۔ مر جائے تو جنازے کے ساتھ جا کر اس کی مغفرت کی دعا کرے۔ جب بھی اسے ملے تو اس پر سلامتی کی دعا کرے۔ بیماری کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے مریضوں کے لیے عیادت کرنے والوں کا بعدِ دست کرنے کے بعد علاج کے لیے بہترین طریقہ مرحمت فرمایا۔ قرآن مجید تصدیق کرتا

ہے کہ ان کو حکمت کا علم سکھا دیا گیا تھا وہ جب بھی بات کرتے تھے تو اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کہتے تھے ان کا ہر فقرہ وحی الہی پر مبنی ہوتا تھا۔ اس حقیقت کو جب علاج کے سلسلے میں دیکھیں تو علم طب میں ایک انقلاب نظر آتا ہے۔

جب ایک شخص بیمار ہو کر کسی معالج کے پاس جاتا ہے تو اس کی علامات کی روشنی میں وہ اپنے علم سے اندازہ لگاتا ہے کہ ان علامات کا مطلب کیا ہے؟ مثلاً سانس کی نالیوں میں سوزش ہے وہ سوزش کو جراثیم کا باعث قرار دے کر التهاب کا علاج کرتا ہے۔ مریض شفا یاب بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ سوزش کسی چیز کی وجہ سے یا تباہ کو نوشی کی وجہ سے ہے اور دافع التهاب ادویہ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور اس طرح علاج میں بار بار تبدیلی کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ معالج کے پاس اس کیفیت کے مداوا کی دوائی ہی نہ ہو اس قسم کی مثالوں سے ابن سہل ثابت کرتے ہیں کہ طب اور علاج قیادہ پر مبنی ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج وحی الہی پر مبنی ہونے کی وجہ سے یقینی، قطعی اور ہر حال میں شافی ہوگا۔

جب حضرت سعد بن ابی وقاص بیمار ہوئے تو انہوں نے تاریخ طب میں پہلی مرتبہ دل کے دورے کی تشخیص فرمائی ان کو کھانسی کے پاس لے جانے کی ہدایت فرمائی۔ چونکہ علم طب میں وہ بیماری ہی مذکور نہ تھی اس لیے انہوں نے معالج کو اصول علاج بھی حرمت فرما دیا۔ اس مبارک اور یقینی حکم سے حضرت سعدؓ کا تندرست ہو جانا ایک یقینی امر تھا۔ وہ دل کے اس دورے کے بعد پورے مشرق وسطیٰ میں گھومتے اور جنگیں لڑتے رہے۔ انہوں نے پورا ایران فتح کیا اور ہمارا آج کا مریض بیڑھیاں تک نہیں چڑھ سکتا۔

### علاج نبویؐ کی ضرورت اور اہمیت

بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے طبی تحائف کو جمع کرنا اور ان کا استعمال کا طریقہ جاننا اور پھیلانا ایک عظیم خدمت ہے۔ جس کے لیے ابن القیمؒ نے بڑا خوبصورت عنوان استعمال کیا ”تعلیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العلاج“

اس تیل کے ساتھ ورس۔ قط البحرى ملا کر چ دق (پلوری) کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہؓ مطلع کرتے ہیں کہ یہ تیل ستر بیماریوں کا تھمر ہدف علاج ہے ان ستر میں سے چار کا تذکرہ احادیث سے میسر ہے باقی چھیانوہ کوئی ہیں؟

اسی طرح مرز بخوش کے بارے میں حضرت انس بن مالکؓ روایت فرماتے ہیں۔

عليكم بالعوز نجوش، لانه جيد للخصام (ذہبی)

حضرت قاسم بن عبد الرحمنؓ روایت فرماتے ہیں

استشفوا بالعلبتہ (ابن القیم)

متھی ہی کے بارے میں ذہبی بارگاہ رسالتؐ سے مزید اطلاع دیتے ہیں

لو تعلم امتی ما فی العلبتہ لا شتروا ہا ولو بوزنھا ذہبا

ان ارشادات گرامی پر غور کریں تو کسی چیز کے استعمال کی ترکیب، مقدار اور عرصہ استعمال عطا نہیں فرمایا گیا۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ امت کے طبیب اصول علاج کو سمجھ کر ان کے بارے میں تحقیقات کریں۔ پتہ چلائیں کہ وہ کوئی 66 بیماریاں ہیں جن میں زیتون کا تیل مفید ہوگا؟ متھی اور مرز بخوش کو کوئی بیماریوں میں دیا جا سکتا ہے؟ اور کس مقدار میں دی جائیں گی؟

یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب میں لوگوں نے طب النبوی سے علاج کے مجموعے مرتب کئے اور ارشادات نبویؐ سے استفادہ کرنے کی ترکیب مہیا کیں۔ ہماری یہ کاوش بھی اسی سلسلے کی ایک ترکیب ہے۔

شیخ مصطفیٰ احمد اتیہاشیؒ نے ان کے ارشادات کو "السند الطفا فی الطب" کا نام دیا۔ یہ کتاب در حقیقت اسم بامسی تھی۔

علامہ جعفر المستریؒ نے اپنی کتاب کا نام "کمال الایمان فی اتداوی بالقرآن" پسند کیا۔ وہ حسب حال بھی تھا اور وقت کی اہم ضرورت بھی۔ ان بزرگان گرام نے احادیث شفا سے فائدہ اٹھانے کے لیے ابن قیسؓ ابن

المطعود“ طب اور صحت کے بارے میں ان کے ارشادات یا تحائف ایک عظیم انسانی ورثہ ہیں جس کو قدر دانوں نے پہلی صدی ہجری کے بعد ہی جمع کرنا شروع کر دیا تھا اس زمانہ میں طباحت نہ تھی کاغذ نہ تھا اور ایک جگہ کی بات دوسری جگہ تک لیجانا آسانی سے ممکن نہ تھا مگر قدر دان ان تحائف کو تلاش کرتے اور ان کی تدوین کرتے رہے۔

زیتون کے تیل کی افادیت کے بارے میں کچھ ارشادات توجہ کے طلبگار ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

ابتسوا بالزيت وادهنوا، فانه من شجرة مباركة

(مسند عمر)

حضرت مسلم بن عمار بھی اسی قسم کی ایک روایت بیان فرماتے ہیں۔

عليكم بزيت الزيتون، كلوه وادهنوا به، فانه تنفع من البواسير (ابن الجوزي)

اسی موضوع پر حضرت اسید الانصاری روایت فرماتے ہیں۔

كلوا الزيت وادهنوا به، فانه من شجرة مباركة (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

اسی بات کو حضرت عتبہ بن عامر یوں بیان فرماتے ہیں۔

عليكم بهذه الشجرة المباركة، زيت الزيتون، فتداووا به، فانه مصححه من

البواسير (ابن السنی، ابو یوسف)

روغن زیتون کی اہمیت کا خلاصہ ابو ہریرہ یوں فرماتے ہیں۔

كلوا الزيت وادهنوا به، فانه له شفاء من سبعين داء، منها الجنام

(ابو یوسف)

ان ارشادات گرامی میں زیتون کے تیل کو مبارک درخت سے قرار دینے

کے بعد بیماریوں کے لیے کھانے اور لگانے کی ہدایت فرمائی گئی۔ نمونہ کے طور پر

بو اسیر یا سور اور جذام کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت زید بن ارقم کی دو روایات میں

مسکویہ، بقراط اور جالینوس کے طبی اصولوں کو ان سے ہم آہنگ کر دیا۔  
 کمال ابن طرخان بنیادی طور پر وزارت مال کے عہدے دار تھے۔ مگر  
 انہوں نے حمل طب کے ساتھ امراض چشم میں انحصار حاصل کیا۔ اور کمال  
 ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ”کتاب العين“ لکھی اور  
 اس کے بعد طب نبوی کے عملی پہلو کو ”الاحکام الطبیہ فی الصناعتہ“ کی شکل  
 میں مرتب کیا۔ مسئلہ کو سلجھانے یا بیان کرنے کا یہ عنوان ہمیں آتا پسند آیا کہ  
 ہم نے اپنی اس حقیر کاوش کو:

### علاج نبوی

اور

### جدید سائنس

کا نام دیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس وقت کے حافظ اطباء کے اقوال اور  
 اعمال کو استعمال فرمایا۔ ابن القیم نے ابن سینا۔ بقراط اور ابن حشیش کے  
 متعدد حوالے دیئے ہیں۔

حیرت کی بات یہ ہے کہ بو علی سینا کے اکثر مشہور نسخے اور یہ النبویہ پر مبنی  
 ہیں۔ اور شاید یہ ان کی وجہ تھی کہ وہ اتنا حافظ مشہور ہوا۔

بیماریوں کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طبی فیضان کا اظہار ہے۔ اور  
 اسے جدید شکل میں پیش کرنا ایک ایسی سعادت ہے جس کے حاصل ہونے پر  
 خدائے بزرگ و برتر کا شکر گزار ہونا ضروری ہو گیا۔ قرآن مجید نے علم طب عطا  
 ہونے پر لقمان کو بھی منکھور ہونے کی راہ دکھائی تھی۔

الحمد لله رب العالمین

کتاب کی ترتیب اور مسودہ کے بارے میں محترم ڈاکٹر صدیق جاوید اور  
 کونسلر مرشد احمد صاحبان سے مسلسل معاونت میسر رہی۔ رانا بشیر احمد  
 صاحب کا پورا عملہ میری خاطر داری میں مصروف رہا۔ پریس کے پروف دیکھنے



میں عائشہ غزنوی کی سعادت مندی میری رفیق رہی۔  
شیخ الحدیث مولانا حافظ عبدالرشید صاحب نے اپنے گرامی علم سے  
نوازشات فرمائیں۔

اس مشکل کتاب کو چھاپنا ایک صبر آنا کام تھا۔ عزیز پر محمد حفیظ  
البرکات شاہ صاحب نے نہ صرف اسے اپنے شاندار مطبع ”القاروق کپیڈرز“  
میں چھاپا بلکہ بار بار کی اصلاحوں کو خوشی سے قبول کیا۔ محمد فیصل خان اس کے  
ناشر نہیں بلکہ مرتب بن کر ہر مرحلہ میں ساتھ دیتے رہے۔

محترم جیش پر محمد کرم شاہ صاحب الازہری، محترم حکیم محمد سعید صاحب،  
ڈاکٹر محمد رفیق چوہدری صاحبان نے پیش لفظ مرحمت فرما کر میری حوصلہ افزائی  
فرمائی۔

اس نیک کام میں جو صرف خلوص کی اساس پر ترتیب دیا گیا ساتھ دینے  
والے ان تمام صاحبوں کا شکریہ کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔  
آمین۔ اور مجھے توفیق دے کہ میں جسم انسانی کی مکمل پیاریوں کا احاطہ کر کے  
چیش کر سکوں۔ آمین

خالد غزنوی

42- حیدر روڈ، اسلام پورہ لاہور

## انسانوں کا نظام انہضام

### DIGESTIVE SYSTEM

خوراک کو ہم جس شکل میں کھاتے ہیں وہ ہمارے کام نہیں آ سکتی۔ مثلاً روٹی کے نوالے پیٹ میں جا کر پانی میں حل ہو کر جزو بدن نہیں بننے بلکہ خوراک کے ہر حصے کو عوامل کے پیچیدہ مراحل سے گزرنے کے بعد کارآمد بنانے کی نوبت آتی ہے۔ بہترین خوراک وہ ہے جس میں مختلف قسم کے عناصر ہوں تاکہ وہ ہر حصے کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ عام حالات میں جب ہم کو بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں ہات اگر پیٹ بھرنے کی ہو تو ہم تو کچھ بھی کھا کر اسے بھر سکتے ہیں۔ لیکن غذا کے تین اہم مقاصد ہیں۔

- جسم کو روزمرہ کے کام کاج کے لئے توانائی مہیا کرتا۔
- جسم کے غدودی نظام کو اپنے دوہر بناد کرنے کا خام مال مہیا کرتا۔
- جسم کو بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لئے خصوصی قسم کی Antigens مہیا کرتا۔

اس لئے زندہ رہنے کے لئے نہیں تندرستی کے ساتھ زندہ رہنے کے لئے ایسی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان مقاصد کو پورا کر سکیں۔ غذا میں توغ کا ہونا اس لئے بھی ضروری ہے کہ وہ چیز جو چاول میں نہیں دال سے مل جائے گی اور دال میں نہیں وہ گوشت میں کر رہے گا۔ اس لئے مرکب اور بدل بدل کر کھانے کھانا صحت کے لئے زیادہ مفید ہوتا ہے۔

علم غذا سے شناسائی حاصل کرنے سے پہلے جسم میں غذا کے جانے اور اس کے

انہج سے واقفیت اس کی نوعیت کا پتہ چلانے میں بھی مددگار ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک شخص روزانہ گوشت کھاتا ہے اس کے ساتھ سبزی بھی ہوتی ہے اور گندم کی روٹی بھی۔ غذائی علم کے لحاظ سے اس کی خوراک ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کرتی ہے۔ اور اگر ایسی کھل اور جامع خوراک کے بعد اسے بار بار کمزوری گھیرے اور اس کے جسم میں خون کی کمی واقع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی غذا یا تو ٹھیک سے ہضم نہیں ہو رہی یا اس کی چھوٹی آنت میں غذا کو ہضم کرنے والے بعض عناصر اور خامرے میسر نہیں آرہے۔ یا اس کا کھانا ہضم ہونے کے بعد آنتوں کے راستے جسم میں داخل نہیں ہوتا۔ خرابی کا پتہ چلانے کے لئے یا گڑبڑ والی جگہ معلوم کرنے کے لئے پورے عمل انضمام سے واقفیت ضروری ہے۔

خوراک کے منہ میں داخل ہوتے ہی ہضم کا عمل شروع ہوتا ہے دانت اسے چبانے زبان اس میں لعاب شامل کر کے معدے کو روانہ کر دیتی ہے۔ معدہ سے یہ تہست تہست چھوٹی آنت کو جاتی ہے وہاں پر ہضم کا عمل تکمیل پاتا ہے۔ خوراک کی پیادوی اکائیوں میں تبدیل ہو کر آنتوں میں بنے ہوئے خصوصی نکلات کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ ناقابل ہضم حصے پھوک کی شکل میں بڑی آنت میں آ جاتے ہیں۔ جہاں سے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے پاخانہ کی صورت میں باہر نکل جاتے ہیں۔

خوراک جن مراحل سے گزرتی ہے ان کے بارے میں ہمارا عم انسانی جدوجہد کی ایک افسانوی داستان ہے جس کا تذکرہ دلچسپی سے خانی نہ ہو گا۔

### کینینڈا کا شکاری

کینینڈا میں برفانی ریچھوں کا شکاری سینٹ مارٹن ایک روز ریچھ مارنے کے لئے اپنی توڑے دار بندوق میں گز بچھ رہا تھا کہ بندوق چل گئی۔ گولیاں اس کے پیٹ میں لگیں اور معدہ میں سوراخ ہو گیا۔ پروفیسر ہولواٹھ نے علاج کیا مگر معدہ کا سوراخ بند نہ ہو سکا۔ اور مستقل شکاف کی شکل بن گئی۔ ڈاکٹر نے موقع غنیمت جانا اور اس سوراخ کے راستے مختلف چیزیں داخل کر کے ان کے ہضم کے عمل کا جائزہ لینے لگا۔

مئل کی پوٹیاں بنا کر ان کو دھانکے باندھ کر سوراخ کے راستے داخل کرنے کے بعد ان کو ہر دو گھنٹہ کے بعد نکال کر تبدیلی کا جائزہ لیا جائے۔ پھر اسی راستے مختلف کھانے داخل کر کے یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ ہضم کا عمل کس کس خوراک میں کیا کیا تبدیلیاں لاتا ہے۔ ڈاکٹر پوٹوٹ اس عجیب سوراخ سے قابل قدر معلومات حاصل کر رہا تھا کہ سینٹ مارٹن مرغیا اور انسانی معدہ میں خوراک کے ہضم کے بارے میں مشاہدات کا سلسلہ بند ہو گیا۔

### روسی ڈاکٹر کا کارنامہ

سینٹ مارٹن کی موت سے ہضم کے بارے میں تحقیقات میں جو حائل پیدا ہوا تھا۔ ایک روسی ڈاکٹر PAVLOV نے اپنی فراست سے حل کر دیا۔ سب سے پہلے اس نے ایک کتا لے کر اس کا آپریشن کر کے سینٹ مارٹن کے معدہ کی طرح کا سوراخ مصنوعی طور پر بنا دیا۔ اس سوراخ کے راستے اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں داخل کی جاتی رہیں۔ ابتدائی معلومات کے بعد کتے کو منہ کے راستے باقاعدہ خوراک دی جاتی اور پھر معدہ میں اس کے مارج ہضم کا پتہ چلانے کے لئے سرنج کے ذریعے نمونے حاصل کئے جاتے رہے۔

ڈاکٹر پیولاف نے محسوس کیا کہ معدہ میں ہضم کرنے والے جوہر اور ان کی مقدار ضروریات اور حالات کے مطابق تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس نے کتے کے گلے میں بھی سوراخ بنا دیا۔ اس سے صورت حال یہ ہوئی کہ کتا جو کچھ کھاتا وہ گلے والے سوراخ کے راستے باہر نکل جاتا۔ گلے میں ایک دوسرے سوراخ کے ذریعہ ایک مختلف خوراک داخل کی جاتی۔ کتے نے ذائقہ گوشت کا پکھا لیکن معدہ میں روکھ گیا۔ اس تبدیلی سے معدہ پر کیا اثر ہوا؟ ان مطالعات کے بعد پیولاف نے خوراک دینے کے اوقات متعین کرنے شروع کئے۔ اوقات کے تعین سے اور نئی نئی باتیں معلوم ہوئیں۔ پیولاف کے تجربات اور مشاہدات سے جانوروں میں خوراک کے بارے میں جو دلچسپ حقائق معلوم ہوئے ان کا خلاصہ یہ ہے۔

○ جس کسی کو بھوک لگتی ہے تو اس کے منہ اور پیٹ میں خصوصی قسم کے کھانا

ہضم کرنے والے لعاب پیدا ہوتے ہیں جن کو HUNGER JUICES کا نام دیا گیا۔  
 ○ کھانا کھائے جب عرصہ گزر جائے تو بھوک لگتی ہے۔ یہ بھوک کھانے کا وقت ہونے، کھانے کا سنتے، کھانے کی خوشبو یا اپنے سامنے کسی کو کھاتے دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔

○ بھوک والے لعاب مشروط حالات میں پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ پورڈنگ ہاؤس میں بچوں کو کھانے والے کمرے میں جانے کے لئے تھنی جیتی ہے۔ پیولاف اپنے جانوروں کی خوراک کو اسی طرح متوتور دیتا رہا۔ ان کو احساس ہوا کہ جب تھنی جیتی ہے تو کھانا ملتا ہے۔ جب بھی تھنی جیتی جانوروں کے پیٹ میں غذا کو ہضم کرنے والے لعاب پیدا ہونے لگتے۔ کئی مرتبہ تھنی بچانے کے بعد کھانا نہ دیا گیا۔ لیکن لعاب کا پیدا ہونا تھنی سے مشروط ہو گیا جسے CONDITIOND REFLEX کا نام دیا گیا ہے۔

اس مشروط رد عمل کی روزمرہ مثال ماہ رمضان میں مغرب کی اذان ہے۔ روزہ دار دن بھر بھوک پیاس محسوس نہیں کرتے لیکن افطاری کا دخول سنیے یا اذان کی آواز سننے ہی بھوک اور پیاس لگ جاتی ہے۔

○ حواس خمسہ کے اکثر ارکان بھوک پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ خوشی یا غم کی صورت میں ایسے HARMONE پیدا ہوتے ہیں جو بھوک اڑا دیتے ہیں۔ جب کہ ستمی میں تلی جانے والی مٹھائی کو آنکھوں کے ذریعہ دیکھ کر خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح کباب پکے وقت گوشت کا جو پانی کونکوں پر گرتا ہے اس کی خوشبو ناک کے راستے جا کر بھوک کو بیدار کرتی ہے۔ ہنڈیا میں چھچھو چلانے کی آواز یا میز پر برتن بچنے کی آواز بھوک لگاتی ہے۔

○ جسم کا کنٹرول اتنا شاندار ہے کہ کھانا ہضم کرنے والے لعاب کھانے کی نوعیت کے مطابق پیدا کئے جاتے ہیں۔ تجرباتی جانوروں کو جب خشک گوشت پیش کر دیا گیا تو لعاب میں۔ پانی زیادہ ہوتا ہے اس کے برعکس تازہ یا پکے ہوئے گوشت کو ہضم کرنے کے لئے جو لعاب پیدا کئے جاتے ہیں وہ گاڑھے اور ان میں پانی کا تناسب نسبتاً کم ہوتا ہے۔

○ غذا کو ہضم کرنے کا عمل منہ سے شروع ہو کر چھوٹی آنت میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر پولوف کے دریافت کردہ یہ نکات ہاضمہ کے عمل کو سمجھنے 'اس کی خرابیوں کی تشخیص اور علاج میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔

## انسانی جسم میں خوراک کا سفر

### خوراک کا تصور

خوراک کی موجودگی اور اس سے آنے والی خوشبو اشتہا آور ہوتے ہیں۔ مصالحہ دار کھانوں کو ایلے کھانے پر خوشبو کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ سامنے پڑے ہوئے کھانے کی رنگت 'خوشبو کے علاوہ بعض اوقات کھانے والے کی ذاتی پسند بھوک میں اضافہ کرتی ہے۔ پھر منہ معدہ کے لعابوں کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے۔

### منہ میں خوراک

لقہ کے منہ میں داخل ہوتے ہی اس میں لعاب دہن شامل ہو کر اس کا مگلول بناتا ہے۔ زبان کے اطراف - پیچھے - مسوڑھوں اور گالوں کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے کیسے ہوتے ہیں جن کو TASTE BUDS کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر انسانی خوراک میں چار ذائقے تلخ 'ترش 'شیریں اور مٹھاس ہیں۔ منہ کے مختلف حصے ان ذائقوں کا پتہ دیتے اور کھانے والے کی پسند کے مطابق جسم کو اس کی قبولیت کا پتہ دیتے ہیں۔ کڑواہٹ ناپسندیدہ ذائقوں میں سے ہے۔ بعض لوگ معمولی کڑواہٹ پسند کرتے ہیں یا کھانے سے پہلے ایسے مشروب استعمال کرتے ہیں جو اپنی کڑواہٹ کی وجہ سے معدہ اور منہ میں زیادہ لعاب پیدا کرتے ہیں۔ اس غرض کے لئے APETISERS ایک علیحدہ صنف ہے۔ جرمنی میں اس سلیسے کا ایک مشروب اتا کڑوا دیکھا گیا کہ اسے چند لوگ ہی پی سکتے تھے۔ عام حالات میں کڑواہٹ متلی پیدا کرتی ہے۔ کھانے والی چیزوں میں کسے کڑوے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کی کڑواہٹ مار کر پکاتے ہیں اور

کچھ ان کو اصلی ڈانٹے میں کھانا پسند کرتے ہیں۔ ادویہ میں ٹیم 'رس' رسونت اور 'ضفل' بچوں کو شوق سے دیئے جاتے ہیں۔ جب کہ جدید ادویہ میں کونین 'سزکین' کلورونائی شین اپنی نژواہٹ کی بدولت مشہور ہیں۔

چینی کو منھاس کا نمائندہ قرار دیتے ہیں۔ ہماری زبان اس کے ایک خاص قسم کے ڈانٹہ کی عادی ہو گئی ہے۔ ورنہ منھاس 'گلوکوز' شہد اور فرکٹوس میں بھی موجود ہے۔ لوگ ان میں سے کسی ایک کو چائے یا دودھ میں چینی کی جگہ خوشی سے ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ ڈیابیطس کے مریضوں کو چینی کی جگہ کیمیائی مرکبات تجویز کئے جاتے ہیں۔ جن میں سکریں کو عام چینی سے 671 گن زیادہ میٹھا قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور کیمیائی مرکب P-400 کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ کھانڈ سے 5000 گنا زیادہ میٹھا ہے۔ لیکن اس میں زہریلے اثرات بھی ہیں۔ اس لئے استعمائے میں نہیں آتا۔

کھانڈی میں پھلوں کی ترشی کے علاوہ لوگ اس کے اشتہا آور اثرات کی وجہ سے اظہار کھاتے ہیں۔ یہ لعابوں کی مقدار میں اضافہ کرتے ہیں لیکن معدہ کی سوزش کے دوران غذا کی خوشبو اور حس ڈانٹہ منہ اور معدہ میں لعاب پیدا کر کے غذا کے ہضم کا بندوبست کرتے ہیں۔

غذا کو چبا کر چھوٹے چھوٹے ذروں میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ اس پر لعابوں کا اثر آسانی سے ہو سکے۔ چبانے کے دوران لعاب دہن میں موجود ایک جوہر PTYALIN نفاستہ دار غذاؤں کو گلوکوس میں تبدیل کرتا ہے۔ روٹی کا لقمہ اگر تھوڑی دیر چبایا جائے تو اس کا ڈانٹہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ لعاب دہن میں موجود لیس غذا کے ساتھ مل کر اسے نگٹنے کے لئے آسان بنا دیتی ہے۔

غذا کو چبانے کا مسئلہ بھی موضوع بحث بنتا رہا ہے۔ انگلستان کے ایک وزیر اعظم ولیم پٹ کا قول تھا کہ ہر لقمہ کو اتنی مرتبہ چباؤ کہ تھمارے منہ میں جتنے دانت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا دو گھنٹے میں ختم کرو۔ دوسرے ماہرین کہتے ہیں کہ لقمہ کو ایسا چبائیں کہ اس کے ذروں کا رقبہ تقریباً دو ٹی میٹر ہو جائے۔ مشہور انگریزی کہاوت ہے:

”غذا کو منہ میں اچھی طرح چبا لو۔ کیونکہ تمہارے معدہ میں دانت نہیں ہوتے۔“

اکثر چپائے اپنی خوراک چبائے بغیر نگل لیتے ہیں۔ بعد میں ان کو جب فرصت ملتی ہے تو وہ غذا دوبارہ نگال کر خوب چباتے ہیں۔ جنگلی کے اس عمل کے لئے ان کا ایک اضافی معدہ ہوتا ہے جہاں خوراک آئندہ ضرورت کے لئے ذخیرہ ہوتی ہے۔

پرندے بیج وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ پوٹ میں جمع کر لئے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پرندے کنکر بھی نگلتے ہیں پوٹ میں جب حرکت پیدا ہوتی ہیں تو بیج کنکروں سے ٹکرا کر چھوٹے پھوٹے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سٹندائی (معدہ) میں جا کر ہضم کے دوسرے مراحل سے گزرتے ہیں۔

### معدہ میں

چبانے اور نرم کرنے کے بعد خوراک تھوڑی تھوڑی مقدار میں معدہ کو جاتی ہے۔ نگلتے وقت یہ سانس کی ٹالی کے اوپر سے بھس کر گزر جاتی ہے۔ قدرت نے عجیب بندوبست یہ کیا ہے کہ اس وقت سانس کی ٹالی کے منہ پر ایک ڈھکنا آ جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر یا لیٹ کر کھانے پینے کے دوران یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ڈھکنا ٹھیک سے اپنی جگہ پر نہ بیٹھ ہو اور اس طرح خوراک کا کوئی حصہ سانس کی ٹالی میں جا کر شدید تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔

معدہ میں زیادہ تر Pepsin اور Hydrochloric Acid پائے جاتے ہیں معدہ کا اصل مقصد غذا کو ایک عبوری عرصہ کے لئے روکے رکھنا یا ذخیرہ کرنا ہے۔ ہضم کا پورا عمل چھوٹی سنت میں ہوتا ہے۔ معدہ غذا کو روک کر تھوڑی تھوڑی مقدار میں سنتوں کو قسطوں میں بھیجتا رہتا ہے۔ اس انتظار کے دوران Hydrochloric Acid نکاسے والی غذاؤں کو گلوکوس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یا آچھ حصہ Peptones میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پکٹائیوں پر معدہ میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔

معدہ میں اگرچہ ہضم کا معمولی سا عمل ہوتا ہے۔ لیکن یہاں سے ہضم ہونے والی



غذا جسم میں داخل نہیں ہوتی۔ معدہ سے پانی 'شراب' گلوکوس اور کچھ اوویہ اور شند براہ راست جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ورنہ عام حالات میں غذا کا ہر حصہ کم از کم آدھ گھنٹہ معدہ میں رکتا ہے اور اس کے بعد آگے روانہ کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ 'شراب' پانی، شند اور گلوکوس کے جسم میں داخل ہونے کے اثرات چند ہی منٹوں کے بعد محسوس کئے جا سکتے ہیں۔ کئی زہر بھی معدہ سے براہ راست جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس لئے ان کے اثرات کو زائل کرنے کی کارروائی فوری طور پر شروع کرنی ضروری ہوتی ہے۔

کھانے میں موجود نامناسب اجزاء معدے میں خراش اور جلن پیدا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم تاکید بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے بار بار ارشاد فرمایا کہ کھانا بہت گرم نہ کھایا جائے۔ یہ بات خصوصی طور پر ان لوگوں کی توجہ میں آنی چاہئے جو توست سے اترتی ہوئی گرم گرم روٹیاں کھانے کے شوقین ہیں۔ ان کا یہ عمل معدہ کی بھلیوں کو جلا سکتا ہے یا وہاں کے درجہ حرارت کو اعتدال سے بڑھا کر تیزابیت میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔


## چھوٹی آنت میں

چھوٹی آنت کے تین اہم حصے 'DUODENUM-JUJENUM-ILEUM'

ہیں۔ معدہ سے یہاں موصول ہونے والی غذا میں چونکہ تیزابیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے پہلے حصہ سے سوڈا پانی کارب پیدا ہوتا ہے تاکہ اس تیزابیت کو زائل کر سکے۔ چونکہ غذا کو ہضم کرنے کا مکمل بندوبست یہاں پر ہوتا ہے اس لئے چھوٹی آنت میں کئی قسم کے لعاب مختلف غدودوں سے خارج ہو کر غذا پر گرتے اور اس کے ساتھ شامل ہوتے اور اسے ہضم کرتے ہیں۔

چھوٹی آنت میں ایک سینٹی میٹر کے گولے کی طرح کے ٹکڑے بنے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اندر سے یہ مسلسل جاری ہے لیکن باہر سے اس کی SEGMENTATION واضح محسوس کی جا سکتی ہے۔ آنتوں میں سمندر کی لہروں کی طرح ہر دقت حرکات پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ جن کی بدولت خوراک کے ساتھ لعاب ملتے اور ان کو بار بار ہلایا جاتا

ہے جس سے ہضم کا عمل تکمیل پاتا ہے۔ یہ ریز ذرا رک کو آگے دھکیلتی ہیں۔ غذا کو ہضم کرنے کے لئے آنتوں کی دیواروں میں پائے جانے والے غدود کچھ جوہر پیدا کرتے ہیں۔ بلڈ PANCREAS میں پیدا ہونے والے لعاب بھی ایک خصوصی نالی کے ذریعہ چھوٹی آنت میں گرتے ہیں۔ پتہ کا صفرا بھی اسی مقام پر آکر شامل ہوتا ہے۔ چھوٹی آنت میں پیدا ہونے اور باہر سے آنے والے ہضم کرنے والے لعاب جسم انسانی کے لئے اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک تندرست آدمی کے پیٹ میں اس طرح پیدا ہونے والے لعابوں کی اوسط مقدار یوں ہوتی ہے۔



SALIVA	1000 cc
GASTRIC JUICE	1500 cc
PANCREATIC JUICE	1000 cc
BILE	1000 1500 cc
SMALL INTESTINE JUICES	1800 cc
LARGE INTESTINE JUICES	200 cc
BRUNER'S GLANDS	200 cc

-----  
6700 cc روزانہ

ان لعابوں میں سے ہر ایک میں متعدد قسم کے خامرے ہوتے ہیں۔ جن کا کام صرف ایک ہی قسم کی غذا کو کیمیائی عمل کے ذریعہ ہضم کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً کے طور

پر بیلہ کے لعاب کے اہم خامرے

لیمبات کو ہضم کرتا ہے TRYPSINOGEN

چکنائیوں کو ہضم کرتا ہے LIPASE

اپنے مختلف اثرات کے بعد غذا کو اجزا میں تبدیل کر دیتے ہیں جو آسانی سے آنتوں کے ذریعہ خون میں داخل ہو کر زود بدن بن سکتے ہیں۔

نشاستہ دار غذاؤں اور چینی کو گلوکوس اور فرکٹوس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ آسانی سے حل پذیر اور جگر میں جا کر گلوکوس کا اکثر حصہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جلا ہے چلنے کے اس عمل سے حدت اور توانائی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک گرام گلوکوس کے چلنے سے حرارت کے 4.1 حرارے پیدا ہوتے ہیں۔ جو مقدار ضرورت سے زیادہ ہو وہ جگر کے اندر اور عضلات میں GLYCOGEN کی شکل میں آئندہ ضروریات کے لئے محفوظ کر لی جاتی ہے۔ ایک عام انسان کے جسم میں تقریباً 500 گرام گلائیکو جین محفوظ رہتی ہے۔ جو فائدہ کشی کے دوران نکل کر توانائی مہیا کرنے کے کام آتی ہے۔

روزمرہ کی ضروریات کے لئے خون میں گلوکوس کی ایک مقررہ مقدار گردش کرتی

رہتی ہے۔ فائدہ کے دوران خون میں 120-90 ملی گرام گلوکوس ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ جب کہ کھانا کھانے کے دو گھنٹہ بعد یہ مقدار 180-120 ملی گرام خون کے 100 cc میں پائی جاتی ہے۔ خوراک میں ملحاس کم ہو تو یہ مقدار کم رہتی ہے۔ اگر زیادہ کم ہو جائے تو یہ صورت حائل HYPOGLYCAEMIA کہلاتی ہے۔ جس میں ٹھنڈے پینے آتے ہیں۔ دل ڈوبنے لگتا ہے۔ ہاتھ پیروں سے جان نکلنے لگتی ہے اور مریض کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دم نکل جائے گا۔

گردوں کو یہ تربیت دی گئی ہے کہ وہ پیشاب کے راستے گلوکوس کو خارج نہ کریں اور اگر خون میں گلوکوس کی مقدار 180 ملی گرام سے بڑھ جائے تو گردے اضافی مقدار کو پیشاب میں خارج کرنے لگتے ہیں۔ یہ کیفیت اگرچہ ذیابیطس کی بیماری کا پتہ دیتی ہے لیکن غددوں کی بعض بیماریوں اور غذا میں کسی روز شکر کی زیادہ مقدار استعمال کرنے سے بھی پیشاب میں شکر کی کچھ مقدار عارضی طور پر خارج ہو سکتی ہے۔

چکنائی کی ساخت کو لیٹرول اور GLYCERIDES سے ہوتی ہے۔ آنتوں اور بلب کے لعاب میں موجود LIPASE اس کو گیسرین اور خمی ترشوں ACIDS میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس عمل کے دوران پتہ کا صفرا ضروری ہوتا ہے۔ خمی ترشوں کو آنتوں سے جذب کرنے کیلئے صفراء میں پائے جانے والے BILE SALTS درکار ہوتے ہیں۔ یہ ان ترشوں کے ساتھ مل کر ایک ایسا مرکب بناتے ہیں جو آسانی سے آنتوں میں موجود انجذابى سوراخوں میں داخل ہو کر جگر کو جاتے ہیں۔ جہاں ان پر کیمیائی اثرات اس صورت میں ہو سکتے ہیں جب مناسبت کا گلوکوس بجل رہا ہو۔ ان کے جلنے سے ہمیں ہر ایک گرام سے حرارت کے 9.4 حرارے حاصل ہوتے ہیں۔

چکنائی اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو اسے مختلف مقامات پر چربی کی شکل میں جمع رکھا جاتا ہے۔ اس جمع رکھی جانے والی چربی کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ضروری چربی یا ESSENTIAL FATS کہلاتی ہے۔ یہ جسم کو موسمیاتی اثرات سے بچانے والی تہ کے علاوہ اعضاء و ریشہ یعنی دل اور گردوں کے ارد گرد پٹی کی صورت میں موجود

رہتی ہے۔ کوئی شخص خواہ بھوک سے مر جائے اس کے جسم میں چربی کے ضروری ذخیرے استعمال میں نہیں لائے جاتے۔ جب کہ غیر ضروری چربی کے وہ ذخیرے جو عضلات، جھیلیں اور جوڑوں کے آس پاس پسلیوں کے اندر اور گوشت سے وابستہ ہوتے ہیں فرد کی خوراک اور صحت کے مطابق کم و بیش ہوتے رہتے ہیں۔ چکنائی کے ایک گرام سے 9.4 حرارے حاصل ہوتے ہیں۔

جسمانی چکنائی کا نالو حصہ خون کی نالیوں میں جم کر ان کی وسعت کو متاثر کر سکتا ہے۔ حیوانی ذرائع سے حاصل ہونے والی چکنائیاں نباتاتی چکنائیوں سے زیادہ جو بھل ہوتی ہیں۔ خیال کیا جاتا تھا کہ جسم میں چربی صرف چکنائی کھانے سے جمع ہوتی ہے۔ دو برطانوی ماہرین نے جانوروں کے دو ہم عمر اور ہم وزن بچے بے کران میں سے ایک

ایک کو ایک سال تک ایسی غذا دی جس میں چکنائی نہ تھی۔ جب کہ دوسرے کو چکنائی آمیز مرکب غذا دی گئی۔ ایک سال بعد ان کو ہلاک کر کے جب جسمانی چربی کا موازنہ کیا گیا تو ان دونوں میں یکساں مقدار پائی گئی۔ جس سے معلوم ہوا کہ جسم کے اندر جا کر نشاۃ بھی چکنائی میں تبدیل ہو سکتا ہے یا ضرورت کے وقت چکنائی سے گلوکوس بنایا جاسکتا ہے۔

### لحمیات

ہم گوشت، دال، آنا اور بعض سبز یوں سے لحمیات (PROTEINS) حاصل کرتے ہیں۔ ان کی عمدہ قسم حیوانی ذرائع سے حاصل ہوتی ہے۔ آنتوں میں جا کر ان کو ایمونائی ترشوں AMINO ACIDS میں تبدیل کر کے جذب کیا جاتا ہے۔ دیگر غذاؤں کی مانند یہ جسم کے اندر جا کر عمل تحول کے دوران جل کر ایک گرام سے حرارت کے 4 حرارے مہیا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسری غذاؤں کے جلنے کے عمل کو تیز کر کے 15 فیصدی زیادہ حرارت مہیا کرتے ہیں۔

انسانی صحت کے لئے ان کی موجودگی از حد ضروری ہے۔ کیونکہ ہمارے جسم کا سارا دفاعی نظام ان سے مرتب پاتا ہے۔ جسم کے اہم ترین غدودوں کے HARMONES ان ہی سے تیار ہوتے ہیں۔ بلکہ ہر گینڈ کو اپنی ضرورت کے لئے

خصوصی نوعیت کے ایمونیائی تڑپے درکار ہوتے ہیں۔ اگر وہ میسر نہ ہوں تو ان کی فعالیت متاثر ہو کر صحت میں شدید گزبڑ ہو جاتی ہے۔

غذا میں پائے جانے والے معدنی نمک اور وٹامن کسی خاص عمل کے بغیر جذب ہوتے ہیں۔ البتہ وٹامن K ہضم ہونے کے لئے صفراء کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یرقان کی وجہ سے یہ میسر نہ آئے تو یہ جذب نہیں ہوتی اور اس کی کمی سے خون بننے کی تباہی ہو سکتی ہے۔ کیلشیم اگرچہ ہماری غذا میں کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے لیکن تنوں سے صرف اتنی مقدار جذب ہوتی ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اضافی مقدار بلکہ یوں کہئے کہ غذا میں پایا جانے والا 75 فیصدی کیلشیم پاخانہ کے راستے باہر نکل جاتا ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین اور بڑھنے والے بچوں کے علاوہ ایک عام سندرست فرد کے جسم میں کیلشیم کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ فکلت و ریخت اور خون کے دوران کے مسائل کے سلسلہ میں معمولی مقدار مطلوب ہوتی ہے۔

چھوٹی آنت میں ہضم کے بعد غذا کا بیشتر حصہ جذب ہو جاتا ہے۔ غیر مطلوبہ اور ناقابل ہضم غذائیں سیال حالت میں بڑی آنت کو بھیج دی جاتی ہے وہاں اس میں سے پانی کی کافی مقدار اور نمکیات جذب ہوتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جن کی ضرورت نہیں ان کو پاخانہ کی شکل میں جسم سے نکال دیا جاتا ہے۔

## امراض معدہ

معدہ غذا کا ایک سنور ہے جو غذا کو وصول کرنے کے بعد تھوڑا سا پتلا کرتا ہے اور ہضم کرنے کے لئے آگے روانہ کر دیتا ہے۔ وہ غذائیں جو معدہ میں رکھی جاتی ہیں اگر ان میں کوئی خرابی ہو تو وہ معدہ کو بھی بیمار کر سکتی ہیں جسم کے دوسرے اعضاء کی طرح اس پر چوٹ کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ جل سکتا ہے یا جسمانی بیماریوں میں بعض کے اثرات قبول کرتا ہے۔

## بھوک نہ لگنا

### ANOREXIA

ہر جاندار کو بھوک لگتی ہے۔ پہلا کھانا جب بھضم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خون میں گلوکوس کی مقدار کم پڑنے لگتی ہے۔ اور جاندار کو بھوک لگتی ہے۔ بھوک کا عمل تندرست افراد میں متعدد امور سے وابستہ ہے۔ ہیٹ میں پیدا ہونے والے JUICES HUNGER سے لے کر ذہن کے نفسیاتی عوامل تک ہر چیز بھوک کو بڑھانے یا کم کرنے کا باعث ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر پیولاف کے کتوں پر تجربات سے معلوم ہوا کہ کھانے کی اطلاع، اس کی خوش اس کا منظر بلکہ دوسروں کو کھاتے دیکھ کر بھوک لگ سکتی ہے۔ مشرقی اور فرانسیسی کھانوں کو پکانے میں خوشبو کا عنصر بھوک بڑھانے بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے۔ کھانے پکانے کے دوران جانکھل، جاوتری کا استعمال اور پک جانے کے بعد الائچی، لونگ، دار چینی، زیرہ اور سیاہ مرچ کا پسا ہوا اسفوف اس پر خوشبو پیدا کرنے کے لئے چھڑکایا جاتا ہے۔

مذاہبی محارروں میں خواہصورت چیزوں کو دیکھ کر بھوک اڑ جاتی ہے جب کہ حقیقت میں ہذاائقہ کھانا بھوک اڑانے کا باعث ہو سکتا ہے۔ کھانے سے پہلے میٹھی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، مٹھائی، چائے، آئس کریم، قند، پھلوں کے جوس اور شربت بھوک کو کم کرتے ہیں۔ دو کھانوں کے درمیان نشستہ دار غذا میں جیسا کہ کیک، بسکٹ، کھیر، فرنی، جیلی، پیسٹری، کریم کے بنے ہوئے بسکٹ وغیرہ بھوک اڑانے یا کم کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔

بھوک لگانے میں معدہ کے اعصاب سے دماغ کے مختلف مراکز تک اپنا اپنا کام ہوتا ہے۔ اس لئے جب کسی شخص کو بھوک نہیں لگتی یا بھوک نہ لگنا ایک روزمرہ کی بات بن جاتی ہے تو اسے امراض کے دائرہ میں لے آتے ہیں۔

### اسباب: متعدی بیماریاں

ملیریا اور ہر قسم کے بخاروں اور خاص طور پر 'انفلوئنزا'، 'زکام'، 'نمونیا' وغیرہ میں بھوک اڑ جاتی ہے۔ 'دل'، 'جگر'، 'گردوں' اور 'تھوڑوں' کی اکثر بیماریاں اور سوزشوں میں بھوک نہیں لگتی۔

کالا گردہ کی خرابیاں اور غدہ خفاسیہ کی بیماریاں از قسم ADDISON'S DISEASE SIMMOND'S DISEASE - HYPOTHYROIDISM

### معدہ کی بیماریاں

تیزابوں کی کمی، معدہ کا کینسر، معدہ کی مزمن سوزش، خون کی کمی

### غذائی کمی کی بیماریاں

عام طور پر VITAMIN-B کی کمی بھی اس کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے حصہ B-1 کی کمی سے بھوک کی کمی اور قیض ہوتے ہیں۔

### نفسیاتی مسائل

بیزاری، اہل خانہ سے نفرت، پریشانیاں، ڈر، دہشت اور خوف میں بھوک نہیں لگتی۔ بعض لوگ غذا کے انتخاب اس کے پکانے کے اسلوب یا اوقات خوراک میں معمولی تبدیلی سے متاثر ہو کر بھوک گنوا لیتے ہیں۔

مائیں اکثر بچوں کے بارے میں بھوک نہ ہونے کی شکایت کرتی ہیں۔ ایسے بچوں کے مشاہدے پر یہ بطور بیماری محسوس نہ ہوئی بلکہ اکثر بچے ماؤں کی پسند کے خلاف بغاوت کے طور پر جزوی بھوک ہڑتیں کرتے ہیں۔ مثلاً ایک خاتون بچوں کو پراخوں



کے اوپر کھنکھائی کی بھرپور مقدار داخل کرنے کا شوق رکھتی تھیں۔ جب کہ بچے اتنی زیادہ چکناچی پر آمادہ نہ تھے۔ ناشتہ میں اسی قسم کے اوٹ پٹانگ نسخے بچوں کی بھوک اڑاتے ہیں۔ علی الصبح دودھ کا فیڈر پلانے کے بعد بچوں سے بھرپور ناشتہ کی توقع کرنا درست نہیں ہوتا۔ بچہ اگر حسب توقع کھانا نہ کھائے تو اس کی تلافی میں دودھ کا ایک فیڈر اور پھر سوتے میں ایک اور فیڈر اس کی اشتہا کو خراب کر دیتا ہے۔ بچوں کے گلے فیڈر اور چوسنی کی وجہ سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ وکھٹے گلے کی وجہ سے ان کو نلکے میں مشعل پڑتی ہے۔ اس سے بھوک کم ہو جاتی ہے۔ بڑھنے والے بچوں کے لئے دودھ ضروری ہے۔ ان کو کم از کم 6590 گرام دودھ روزانہ پینا چاہئے۔ لیکن دودھ کی یہ مقدار کسٹروڈ، کارن فلور، کارن فلیک، سوپوں میں اور دہی کی شکل میں لڈیہ بنا کر بھی دی جاسکتی ہے۔

### علامات

بھوک نہ لگنا متعدد بیماریوں کی علامت ہے۔ اکثر مریضوں میں اس بیماری کی علامات واضح ہوں گی لیکن غذائی کمی کی وجہ سے جسمانی کمزوری اور پھر کچھ عرصہ بعد جسم کی مدافعت کمزور پڑتی ہے تو دوسری بیماریاں آ جاتی ہیں۔

ان کا زیادہ تر شکار ایسی نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں جو حال ہی میں بالغ ہوتی ہوں۔ ان بچیوں کو عام طور پر گھر سے یا تعلیمی سرگرمیوں وغیرہ کے دوران کسی طرف سے شدید ذہنی صدمہ سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ ایک تندرست اور ہنستی کھیلائی بچی کا وزن کم ہونے لگتا ہے۔ اس کی ماہواری کم ہونے لگتی ہے۔ اور دوستوں میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا دل پڑھائی سے اچھا ہو جاتا ہے۔ نیند کم ہو جاتی ہے۔ سردی زیادہ لگتی ہے طبیعت جھجی جھجی سے رہتی ہے۔

اگرچہ مرد بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن ان کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے۔ ایک مرد کے مقابلے میں عورت کا تناسب 290 تک ہو سکتا ہے۔ جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ گالوں میں گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ وزن میں کمی تولنے کے بغیر بھی نظر آتی ہے۔ ہاتھوں پر جھریاں پڑنے لگتی ہیں۔ ہاتھ بڑھ

جائے تو چلنا پھرنا بھی دو بھر ہو جاتا ہے۔

### علاج

مریض کو کھانا اس کے وقت پر کھلایا جائے۔ اگر اس نے متوقع مقدار سے کم کھیا ہو تو دو کھانوں کے درمیان کوئی اور چیز نہ دی جائے۔ کھانا اطمینان سے کھلایا جائے۔ اس وقت کسی اور کام کی جلدی نہ ڈالی جائے۔ جیسے کہ بچوں کو ایک طرف سے ناشتہ دیا جا رہا ہو اور دوسری طرف سکول جانے کی افراطی ان پر مسلط ہو۔ یہ صورت حال بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔

طب جدید میں بھوک لگانے والی ادویہ کی ایک کثیر تعداد زمانہ قدیم سے مشہور رہی ہے۔ یہ ادویہ ذائقہ کے لحاظ سے شدید کڑوی تھیں اور یہی ان کی افادیت کا باعث تھا۔ جن لوگوں نے ان کے اثرات کا مطالعہ کیا انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی کڑوی چیزیں منہ میں جاتی ہیں تو وہ زبان پر پائے جانے والے ذائقہ کے آلات کو تحریک دیتی ہے۔ جس کے رد عمل کے طور پر معدہ میں تیزاب پیدا ہوتے ہیں اور بھوک لگتی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے کے ماہرین کا خیال تھا کہ ادویہ معدہ میں جا کر اس کے اعصاب کو تحریک دے کر بھوک لگانے کا باعث ہوتی ہیں۔ بعد کے مشاہدہ کے مطابق کوئی بھی کڑوی چیز منہ میں تھوڑی دیر رکھے خواہ تھوک دی جائے اس سے بھی بھوک لگ جائے گی۔ اس سلسلہ میں برٹش فارماکوپیا نے جن ادویہ کو پسند کیا ان میں - QUASIA - COLUMBA - GENTIAN زیادہ مقبول ہوئے۔ ہندوستان کی جڑی بوٹیوں پر مشاہدات کے بعد یہاں کی ادویہ میں چرائتہ بھی انہوں نے اس غرض کے لئے اپنا لیا۔ جسے سنخوں میں TR. CHIRATAE کے نام سے شامل کیا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ کونین، نیم، رس، رسونت، منڈی، شاہترہ اور عشبہ کو بھی اس غرض کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ تلخ ہونے کی وجہ سے پلندہ بھی استعمال ہو سکتا ہے وہ ٹانک بھی ہے۔ مگر زہریلے اثرات کی وجہ سے اسے معمولی کاموں کے لئے استعمال کرنا درست نہیں۔

ان کڑوی ادویہ کو دوا سازی کی اصطلاح میں STOMACHIC BITTERS

کہتے ہیں۔ جرمنی اور فرانس میں آفستین اور کڑوی جڑی بوٹیوں کی آمیزش سے کڑوے سیال عام کیجئے ہیں۔ 1940ء تک سار سپرلا ٹائی ایک تلخ مرکب خون صاف کرنے اور بھوک بڑھانے کے لئے عام بلکاتا تھا۔ بد قسمتی یہ کہ ان تمام چیزوں میں سے آج کوئی بھی نہیں ملتی۔

کھانے بدل دل کر اور خوش ذائقہ بنا کر دیئے جائیں جن میں خوشبو نہ ہو۔ ایلے کھانے بھوک نہیں بڑھاتے۔ دو کھانوں کے درمیان نشاستہ دار غذاؤں اور پھسٹری وغیرہ سے پرہیز رہے۔ سالن میں گھی کم سے کم ہو اور گھی والی روٹی اور دوسری مرغن غذاؤں سے بچا جائے۔ کھانے کے بعد پھل مفید ہیں۔

طب جدید میں ANABOLIC STEROIDS کا ایک پورا خاندان کیمیا دانوں نے وزن اور بھوک بڑھانے کے لئے تیار کیا ہے۔ جس کے مشہور اجزاء میں -DIANABOL -DURABOLIN-WINSTROL -ADROYD -DECCA -DURABOLIN ان کے شہرت اور گولیاں ملنے رہتے ہیں۔

یہ بڑی شہرت رکھتی ہیں۔ چونکہ ان کا تعلق جنسی ہارمون کی ساخت سے ہے اس لئے ان کے استعمال سے دوسرے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ جن میں ہلکی علامت ہاتھ پیروں کی جلن اور تپش ہے۔ یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ اس قسم کی ادویہ کا استعمال دل کی بیماریاں اور کینسر پیدا کر سکتا ہے۔ اس لئے اب یہ بازاروں سے غائب ہو رہی ہیں۔

پرانے ڈاکٹر بھوک لگانے کے لئے کمزور مریضوں کو انسولین INSULIN کے 10 یونٹ کا ٹیکہ کھانے سے دس منٹ پہلے زیر جلد لگاتے تھے۔ یہ مقدار ضرورت پڑنے پر 15 یونٹ تک کی جاسکتی تھی۔ اس ترکیب سے ناخوشگوار حادثات ہوتے اور ڈاکٹر کا مریض کے پاس رہنا ضروری ہے۔ اب اس کی جگہ ذیابیطس کے عطلال والی گولیوں کے علاوہ اشتہا کے لئے CYROHEPATADINE نام دوائی کو حال ہی میں مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ ابتدا میں اسے الرجی اور حساسیت کے لئے دیا جاتا تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ یہ بھوک لگاتی ہے۔ بازار میں اس کی گولیوں اور شہرت PERIACTIN کے

نام سے ملتے ہیں۔ دوائی مفید ہے لیکن اس کی معمولی مقدار سے بھی بہت زیادہ نیند آتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ دس سال کے بچے کو اگر اس کے آٹھ دس قطرے دیئے جائیں تو وہ اگلے دن بھی سوتا رہتا ہے۔

اس سلسلے میں آج کل دو نئے شہرت FORT MOSEGOR اور TRISOHEX بازار میں آئے ہیں۔ دونوں کی شہرت اچھی ہے۔ نیند تو خیر ان سے بھی آتی ہے لیکن دوسری دواؤں سے کم۔ MOSEGOR کا دعویٰ ہے کہ یہ آدھ سر کی درو یعنی حقیقت میں بھی مفید ہے۔

## طب یونانی

طب جدید میں بھوک بڑھانے والی تمام کی تمام ادویہ طب یونانی سے حاصل کی گئی ہیں۔ جنیانا۔ بہارنگی کو انگریزی ناموں سے بڑی مقبولیت حاصل رہی حالانکہ ہمارے ہاں کے اطباء نے انہیں عام طور پر قاتل توجہ نہیں گردانا۔ جہاں تک کڑوی چیزیں کو دینے اور ان سے بھوک بڑھانے کا تعلق ہے تو مقامی بڑی بوٹیوں میں اجوانن، انستین، پورینہ، جنگلی پورینہ، پتھری، چرائنہ، وم الاخوین، دارچینی، زیرہ، لوگ، زرشک، ادراک، صندل، سونف، سائے، شامہ، عشب، فلفل، بھوک بڑھانے کی قاتل اعتماد دوائیں ہیں۔ کڑواہٹ کے لحاظ سے نیم، بکائن رس رسونت مشہور ہیں۔

جدید اطباء کا مشاہدہ ہے کہ کڑوی ادویہ کا اثر ذائقہ کی حیات کو تحریک دینے سے ہوتا ہے۔ اس لئے ان ادویہ کو اگر گولیوں کی شکل میں دیا جائے تو فائدہ نہ ہو گا۔ لیکن ہمارے حکیم ان کی گولیاں ہی دیتے آئے ہیں۔

اٹریفل زمانی، جوارش جالبیوس، اٹریفل اسطو خودوس اور معجون نانخواہ بھوک بڑھانے والی مجرب دوائیں ہیں۔

بھوک نہ تینے کی وجوہات میں اطباء قدیم نے کھانوں کی زیادتی کو بھی ایک وجہ قرار دیا ہے۔

ایک مشہور حکیم صاحب مہاراجہ کشمیر کے معالج تھے۔ ایک روز مہاراجہ نے بھوک کی کمی کی شکایت کی تو معلوم ہوا کہ میز پر 10-12 کھانے تھے۔ جن میں سے لقمہ لقمہ اٹھاتے ہوئے وہ دیرانتاج کھا گئے۔ مگر بھوک کی کمی کی شکایت بدستور رہی۔

حکیم صاحب نے پوچھا اور میں نے ایک خوشبودار میخون تیار کر کے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے کھانے کی ہدایت کی اور تاکید کی کہ وہ دوسرے کھانے میں میز پر صرف ایک کھانا رکھیں۔

جب ایک کھانا رکھا گیا تو مہاراجہ صاحب تین پلینیں بریانی کھا گئے۔ وہ اس میخون کے گرویدہ ہو گئے۔ حالانکہ بھوک ان کی پہلے بھی درست تھی البتہ کھانوں کی کثرت سے اندازہ غلط ہو رہا تھا۔

یہ مسئلہ حکیم صاحب کی فراست سے حل ہوا۔

اہل عرب نے اسے بطلان اشتہاء کے نام سے بیان کیا ہے۔ اور اس کے علاج میں سفر جمل، شربت لیمون، سبز پودینہ، ہمراہ سرکہ، سرکہ کے ہمراہ پیاز، مانی شور، انار ترش یا رب انار ترش، شربت پودینہ استعمال کرتے رہے ہیں۔

طب اکبر نے کبوتر کے بچے یا مرغی کے بچے یا تیتڑ کی ہڈی کو بھون کر اسے چبا کر اس کا پانی اور گودا کھانے کا مشورہ دیا ہے۔ یہ نسخہ خون کی کمی کے لئے یقیناً مفید ہو گا۔ لیکن اس میں بھوک لگانے والا اگر کوئی عنصر ہے تو وہ وٹامن ب کے بعض مرکبات ہیں جن کو خالص صورت میں زیادہ آسانی سے حل کیا جاسکتا ہے۔

بھوک اڑانے والی دواؤں میں

کچھ لوگ اپنی بھوک سے تنگ ہوتے ہیں یا وہ اپنا وزن کم کرنے کے لئے ایسی دوا یہ استعمال کرتے ہیں جو بھوک اڑاتی اور اس طرح پیدا ہونے والی غذائی کمی ان کے وزن میں بھی کمی کا باعث ہوگی۔

اس باب میں دلچسپ ترین بات قرآن مجید نے فرمائی۔

ليس لهم طعام الا من ضرع ○ لا يسمن ولا يفتن من جوع ○  
(الغاشيه 60)

(ان کو کانٹے دار جھاڑیوں کی خوراک دی جائے گی۔ یہ ایک ایسی خوراک ہوگی جس سے نہ تو بھوک میں کمی آئے گی اور نہ ہی اس سے توانائی حاصل ہوگی۔)

جس خوراک سے نہ پیٹ بھرے اور نہ توانائی میسر آئے ایسی بے کار غذا کا کیا فائدہ؟ لوگ پہلے آرام طلب زندگی گزارتے ہیں۔ پھر بسیار خوری کر کے چکنائیاں کھا کر اپنا وزن بڑھاتے ہیں۔ وزن میں زیادتی کی وجہ سے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ پھر اسے کم کرنے کے لئے یوٹی کیٹک اور سلیمنگ کلیٹک تلاش ہوتے ہیں۔ جہاں وزن کم کرنے کی بجائے بیماریاں نصیب ہوتی ہیں۔

لاہور میں مونوں کو پتلا کرنے کا ایک کلیٹک قائم ہوا۔ جس کی خوب اشتهار بازی ہوئی۔ بڑی ذرق برق غیر ملکی خواتین کو علاج کرتے دکھایا گیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ کوئی دوائی نہیں دیتے۔ لیکن فیس ہزاروں تھی۔

ان کے علاج سے فارغ ہونے والے کچھ مریضوں کو ایمرجنسی میں گھروں میں جا کر دیکھنا ہوا۔ جسمانی ضرورت کے اہم عناصر کی مسلسل کمی کی وجہ سے کئی قسم کے مسائل پیدا ہو چکے تھے جن کو درست کرنے میں ہفتوں لگ گئے۔

قرآن مجید نے روزنیوں کے لئے غذا کا جو معیار بتایا ہے اگر کسی کو ایسی غذا کچھ دنوں تک لگاتار دی جائے تو وزن میں کمی ضرور آئے گی۔ لیکن مریض کا حال ناگفتہ بہ ہو جائے گا۔ عرب اطباء نے بھوک کی زیادتی یا بسیار خوری کو بیماری قرار دے کر اس کو جوع الکلب (کتے کی بھوک) جوں البقر (بیل کی بھوک) اور جوالحفشی (بہوش کر دینے والی بھوک) کے عنوانوں تلے بیان کیا ہے لیکن علاج کے لئے انہوں نے انہیوں کے علاوہ کوئی معقول دوائی بیان نہیں کی۔

طب جدید میں بھوک اڑانے والی ادویہ میں DEXEDRINE  
AMPHETAMINE- METHEDRINE وغیرہ قسم کی گولیاں بڑی مقبول رہی

ہیں۔ ان دواؤں سے بدن میں چستی سی بھی آ جاتی تھی اور بھوک کے ساتھ خند بھی اڑا دیتی تھیں۔ پھر یہ نشہ بازوں کے ہتھے چڑھ گئیں اور ان کا استعمال متروک ہو گیا۔ اب یہ بازار سے غائب ہو گئی ہیں۔

وزن کم کرنے کے لئے اسبغول کی قسم کا ایک گوند آ رہا ہے۔ اس کی چوبک گم کی طرح کھانے سے معدہ میں بوجھ پیدا ہو کر بھوک اڑ جاتی ہے۔ غالباً ”مکی کام اسبغول کا نصف چمچ کھا کر اس سے بہتر کیا جاسکتا ہے۔“

عرب ریاستوں کی مارکیٹ میں جلاب کی مشہور دوائی CASCARA SAGRADA سے بنی ہوئی میٹھی گولیاں اور ٹافیاں ملتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان سے بھوک اڑ جاتی ہے۔

بھوک اڑانے والی ہر دوائی جسم کے اعتدال کو متاثر کر کے خطرناک قسم کی خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ SLIMMING CLINICS سے علاج کروانے والوں کی حالت زار دیکھ کر اب یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ یہ کام خطرے سے خالی نہیں اور ایسا کرنے والے اپنی تندرستی کو داؤ پر لگاتے ہیں۔

دزن کم کرنے کے لئے تھوڑی ورزش کے ساتھ غذا میں چاول، چکنائی اور نشاستہ دار غذا میں کم کردی جائیں اور جب ایک تھائی بھوک باقی رہ جائے تو کھانا بند کر دیں۔ اس طرح دزن میں آہستہ آہستہ کمی آتی ہے اور جسم کے افعال متاثر نہیں ہوتے۔

## طب نبوی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی کمی کا مسئلہ حل کرنے میں اسے ہر طرف سے سلجھایا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے غذا کے دو اہم اوقات متعین فرمائے۔ ناشتہ صبح جلدی کیا جائے اور رات کا کھانا بھی جلد اور ضرور کھایا جائے اور اس کے بعد چل قدمی کی جائے۔ بھوک کی کمی کے نفسیاتی اسباب کو توجہ میں رکھتے ہوئے کھانا اطمینان سے کھانے کی یہاں تک تلقین فرمائی کہ دسترخوان لگ گیا ہو اور وہی

وقت نماز کا بھی ہو تو نماز چھوڑ کر کھانا اطمینان اور تسلی سے کھایا جائے۔ وہ کھانے میں اشتہا اور اشیاء کو پسند کرتے تھے۔ اور اگر بات پھر بھی نہ سنے تو حضرت عائشہ صدیقہؓ روایت فرماتی ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَانًا وَجَعَ  
"لَا يَطْعَمُ الطَّعَامَ" فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالتَّلْبِينِ، فَحَسَوْهُ أَبَاهَا۔ وَيَقُولُ:  
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا تَفْسِلُ بَطْنَ أَحَدِكُمْ كَمَا تَفْسِلُ أَحَدًا  
كُنْ وَجْهَهَا مِنَ الْوَسْخِ (ترمذی، احمد، النسائی، الحاکم)

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی یہ شکایت کی جاتی کہ فلاں کمزور پڑ رہا ہے اور اسے بھوک نہیں لگ رہی تو فرماتے کہ تمہارے لئے تلین جو موجود ہے۔ اس کو کھاؤ پھر فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یہ تمہارے پیٹ کو اس طرح دھو کر صاف کر دیتا ہے جیسے کہ تم لوگ اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت اُتار دیتے ہو)

جو کا دلہا ایک طاقتور اور مفید غذا ہے۔ پیٹ سے تیزابیت دور کرنے کے علاوہ یہ خون کی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ اور پرانی قبض کا بہترین علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھوک لگانے والا قرار دیا ہے۔ ان کے ارشاد کو برحق قرار دیتا ہی ہماری فرمانبرداری ہے۔ ورنہ ہم کو اس نسخے سے پچھلے 15 سالوں سے نہایت ہی اچھے نتائج حاصل ہوتے رہے ہیں۔ انہوں نے پیٹ کو صاف کرنے کے سلسلے میں ایک اور مفید چیز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کی چچی روایت فرماتی ہیں۔

ابِطَيْخٍ قَبْلَ الطَّعَامِ يَغْسِلُ الْبَطْنَ غَسْلًا " وَ يَذْهَبُ بِالْإِذَاءِ  
اصلاً" (ابن عساکر)

(کھانے سے پہلے تریز کا استعمال پیٹ کو دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ اور وہاں کی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے)

کھانے کے وقت سے ایک گھنٹہ پہلے تریز کھانے سے بھوک خوب لگتی ہے اور



آنتوں میں سوزش وغیرہ کے اگر کوئی مسائل ہوں تو وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اس صحت میں تریز کا جس طرح سے ذکر کیا گیا ہے اسی اصول کو استعمال کرتے ہوئے وہی افادات اس نوع کے دوسرے پھلوں پر بھی منطبق کئے جاسکتے ہیں۔ ہمارے تجربہ میں خربوزہ، گراما، سردا، پیسٹہ اور انٹنس بھی تقریباً یہی فوائد رکھتے ہیں۔

انجیر کھانے کو ہضم کرتی ہیں۔ کچھ مریضوں میں بھوک نہ لگنے کی ایک وجہ پیٹ میں ہضم کرنے والے خامروں کی کمی بھی ہوتی ہے۔ چونکہ دوسرے کا کھایا ہوا کھانا ہی شام تک پیٹ میں بوجھ بنا لگتا ہے۔ اس لئے اگلے کھانے پر طبیعت تیار نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد اگر تین دانے خشک انجیر کھائے جائیں تو آئندہ کی بھوک کا معقول بددوست ہو جائے گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شگترے کی تریف فرمائی ہے۔ عبدالرحمان بن ولیم روایت فرماتے ہیں کہ ان کا ارشاد ہے

و علیکم بالاتوج فانه يشد الفؤاد (دہلی)

(تمہارے لئے اترج میں بے شمار فوائد موجود ہیں۔ یہ دل کو مضبوط کرنا ہے)

اور دل کے دورے میں مفید ہے)

شیشے شگترے کا جوس اتنا مفید نہیں جتنا کہ اس کو گودے سمیت کھانا ہے۔ جنت میں فتنے والی چیزوں کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے ان میں اورک بڑی خوبیوں والا بتایا ہے۔ وہاں پر جن گھاسوں میں پانی دیا جائے گا ان گھاسوں کی ساخت میں اورک کی منک ہی ہوئی ہوگی۔ محدثین نے اورک کو آنتوں کے مسائل کے لئے اسیر قرار دیا ہے۔ یہ جگر کی اصطلاح کرتے ہوئے پرانے سدے نکال دیتا ہے۔ تجیر کو دور کرتا ہے ایک نسخہ کے مطابق ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے۔ یہ بھوک لگانا اور قبض کو دور کرتا ہے مگر مسلسل نہیں ہے۔ یہی پھل یا اس کا مرہ بھی مفید ہیں۔

طب نبوی میں مذکورہ 93 چیزوں میں سے ہر ایک بھوک بڑھاتی ہے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی مناسب نسخہ میں بھوک بڑھانے کی غرض کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

## ڈکار مارنا

### AEROPHAGY

مجلس میں ڈکار مارنا بد تمیزی ہے۔ بعض لوگ کھانا کھانے کے بعد بڑے زور سے ڈکار مار کر اپنی بسیار خوری کے اعلان پر بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ دودھ چوسنے کے عمل کے دوران چھوٹے بچے ہوا کی کافی مقدار معدہ میں داخل کر لیتے ہیں۔ اگر یہ ہوا اسی طرح موجود رہے تو ان کو بے قراری، پیٹ میں بوجھ کے ساتھ قے آ جاتی ہے۔ دودھ پلانے کے بعد مائیں بچے کو اونچا کر کے سینے کے ساتھ لگا کر بچے کے کندھوں کے درمیان تھکی یا ہاتھ پھیرتی ہیں تو ان کو ایک دو ڈکار آ جاتے ہیں۔ جس سے پیٹ میں جمع ہوا نکلنے کا پتہ چلتا ہے اور بچہ آرام سے سو جاتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بڑی بے تکلف مگر باوقار ہوتی تھی۔ اجلہ دیہاتیوں پر بے جا مجلسی پابندیاں مسلط نہ تھیں۔ ان کو سلیقے سے بیٹھنے اور بات چیت کی تربیت دی جاتی تھی۔ کیونکہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آئندہ دنیا بھر میں حکومت کرنی تھی۔ اس مجلس میں ایک نوآئندہ رسائی نے سب کے سامنے کونے میں جا کر مسجد جیسی مصفا جہ پر پیشاب کر دیا۔ لوگ اسے منع کرنے کو تھے کہ حضور نے روک دیا۔ لیکن ان ساری سولتوں کے باوجود جب ایک شخص نے مجلس میں ڈکار مارا تو اسے باہر نکال دیا گیا۔ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ڈکار اپنی مرضی

درا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص چاہے تو اسے روک سکتا ہے۔

انگریزی میں ڈکار مارنے کو ERUCTATION کہتے ہیں۔ مگر اب طب جدید نے اسے AEROPHAGY سے تبدیل کر دیا ہے۔ جس کے لفظی معنی ہوا نگھٹا ہے۔ علماء طب کا کہنا ہے کہ مریض غیر شعوری طور پر پسینے ہوا نگھٹتا ہے اور پھر اسے ڈکار کی شکل میں نکالتا ہے۔ ڈکار کو تیار کرنے کے لئے اگر کسی نے 100cc ہوا اندر نگلی تو ڈکار کی صورت میں 70cc ہوا باہر نکلی اور اس طرح ہر ڈکار کے ساتھ 30cc ہوا معدہ اور آنتوں میں بوجھ پیدا کرنے کے لئے باقی رہ گئی۔ ایسے لوگوں کا ہاضمہ ہمیشہ خراب رہتا ہے اور پیٹ میں نفخ روز کی شکایت ہوتی ہے۔

اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ ڈکار اندر سے نہیں آتا اور ہوا انجانے میں نگلی جاتی ہے اور اس کے بعد وہی ہوا ڈکار کی شکل میں نکلتی ہے تو مسئلہ آسان اور اسے حل کرنا مریض کے اپنے بس کی بات بن جاتا ہے۔

برطانوی ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہوا کو نگھٹنے کے لئے مریض کا منہ بند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہوا نگھٹنے سے باز رکھنا ممکن ہوتا ہے مریض اگر اپنے دانتوں کے درمیان ریز کا کوئی موٹا ٹکڑا رکھ لیا کریں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیونکہ کھلے منہ ہوا کا نگھٹنا ممکن نہیں اس لئے وہ کوشش کے باوجود ہوا نگھٹ نہ سکیں گے۔

کھانا کھانے پانی پینے کے دوران نہ چاہتے ہوئے بھی پیٹ میں ہوا کی کچھ مقدار اندر چل جاتی ہے۔ جسے نکالنے کی کوشش اگر نہ کی جائے تو یہ آنتوں میں جا کر سیدھی طرح باہر نکل جاتی ہے یا کبھی کبھی اس سے ڈکار بھی بن جاتا ہے۔

طب جدید میں تیزابیت کو مارنے والی ادویہ اس کے علاج میں استعمال کی جاتی ہیں جن کا کوئی جواز نہیں۔

ڈکاروں کے ساتھ اگر بد ہضمی شامل ہو یا مریض کا پتہ خراب ہو تو اس کا باقاعدہ علاج کیا جائے۔ پتہ کی سوزش اور پرانی پیچش کے اکثر مریض پیٹ میں بوجھ محسوس کرنے کی وجہ سے جان بوجھ کر اس امید پر ڈکار مارتے ہیں کہ ہوا کا کچھ حصہ اس طرح باہر نکل جائے گا۔ یہ درست نہیں۔ ڈکار مارنے کی ہر کوشش 'سوڈے کی بوتلیں

اور خاص طور پر لیونیڈ قسم کی کھٹی بوتلیں بیماری میں اضافہ کا باعث ہوتی ہیں۔ اطباء قدیم نے سفوف اور اجوائن کے مرکبات کے علاوہ <sup>سکنجبین</sup> کو اس کے علاج میں استعمال کیا ہے جو کہ بد ہضمی کا علاج ہیں۔ شد اور انجیر و کار سے بچاتے ہیں۔ بد ہضمی اور تجیر کے علاج میں استعمال ہونے والا طب نبوی کا ہر نسخہ ہوا نکلنے سے پیدا ہونے والے مسائل کا علاج ہے۔

## تبخیر معدہ (اچھارہ)

### FLATULENCE

پیٹ میں ہوا بھری رہنا بیماری نہیں بلکہ متعدد دوسری بیماریوں کی اہم علامت ہے۔ جیسا کہ۔

ہوا نگٹنے کی عادت: سوڈا واٹر کی بوتلیں چٹا، جلد جلد کھانا ٹھیک سے چبائے بغیر کھانا، کثرت سے پان کھانا، تمباکو اور نسوار کھانا، زیادہ مرجوں اور مصالحوں والی غذائیں، مٹھائیوں کی کثرت، ذہنی اسباب میں تفکرات، صدمات اور ہر وقت چلتے کھڑے رہنا اس کے اہم اسباب ہیں۔ ہوا نگٹنے سے مراد ڈکار مارنا لیا ہے۔

منہ میں کثرت سے تھوک آنا، پتہ کی سوزش، منہ کے راستے سانس لینے کی عادت (جن کے ناک کسی بیماری کی وجہ سے بند رہتے ہیں) ایسی ادویہ کا استعمال جو آنتوں کی حرکات کو کم کرتی ہیں۔

ان بیماریوں اور حالات کے علاوہ انٹروں میں خوراک کے زیادہ دیر قیام کا باعث بننے والی چیزیں یا غذائیں چکناٹیوں کی کثرت اور ٹھیک سے چبائے یا پکائے بغیر نفاست دار غذاؤں (شکر قندی، کھیر، حائل) کا استعمال، پرانی قبض، اسہال، پرانی بچھش، جلاب کی دواؤں کا اکثر استعمال، پیٹ میں غذا کو ہضم کرنے والے خامروں کی کمی، آنتوں میں سڑاند پیدا کرنے والے جراثیم کی موجودگی، جراثیم کش ادویہ کا بار بار استعمال، پیٹ میں ہوا بھرنے کا باعث بنتے ہیں۔

پیٹ میں ہوا رہنے کی شکایت کرنے والے حضرات یہ بیماری بداعتدالی سے

حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنے پیٹ میں وقفہ دینے بغیر اتنا کچھ ڈال لیتے ہیں کہ اسے ہضم کرنے کے لئے ایک معقول عرصہ درکار ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے غذا پیٹ میں زیادہ دیر رہتی اور اس میں سڑاؤ پیدا ہو جاتی ہے۔

پیٹ میں تیزابیت اگر زیادہ ہو تو تب بھی ہوا بھر جاتی ہے۔ جیسے کہ تفکرات اور معدہ کا زخم یا کثرت سے اجار، لیووں اور مصالحے کھانا، ان میں تبخیر کے ساتھ ساتھ جلن بھی ہوتی ہے۔ دوسرے وہ ہیں جن کے پیٹ میں تیزاب ضرورت سے بھی کم ہوتے ہیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ دنیا کی آبادی کا 5 فیصد ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جن کے پیٹ میں تیزاب بالکل نہیں ہوتا۔ زندہ تو وہ بھی رہتے ہیں۔ مگر تکلیف کے ساتھ۔ چونکہ خوراک ہضم کرنے کا پہلا مرحلہ ہی ان کے لئے مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے ان کی غذا اعتدال سے زیادہ عرصہ پیٹ میں رہتی اور سڑاؤ سے تبخیر پیدا ہوتی ہے۔

### تشخیص

عام حالات میں ایسے مریضوں کے لئے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چند دن کے علاج کے بعد صورت حال واضح ہو جاتی ہے۔ مریض کو اگر فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اضافی اخراجات کی ضرورت نہیں۔ اور اگر فائدہ نہ ہو یا وقتی آرام ہو تو ایسی صورت میں معدہ اور آنتوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔

### علاج

دوا کے انتخاب کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ مسئلہ تیزاب کی کمی کا ہے یا زیادتی کا۔ لیکن عملی طور پر کسی معالج کو اس معیبت میں پڑنے دیکھا نہیں گیا۔ یونانی اطباء کا سرا الریاح اودیہ دیتے ہیں اور ڈاکٹر تیزاب کو کم کرنے والی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں کے اکثر مریض فائدہ پاتے ہیں۔

طب جدید میں پیٹ سے ہوا نکالنے کے لئے DIGEX POLYCOL

DISFLATYL-SIMECO مشہور دوائیں ہیں ایسے مریض دیکھے گئے ہیں جو سالوں سے یہ دوائیں کھا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میں جب SIMECO کی دو گولیاں چبا لیتی ہوں تو جلن جاتی رہتی ہے اور پیٹ ہلکا ہو جاتا ہے۔

تجربہ کار ہر مریض اختلاج، دہشت اور گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ درجنوں مرتبہ دل کا معائنہ کروا چکے ہیں۔ غذا ہضم نہ ہونے کی وجہ سے جسم میں کمزوری اور دردیں ان کے لئے معیبت کا مستقل باعث بنے رہتے ہیں۔ اس کیفیت کا حل ڈاکٹروں نے یہ کیا ہے کہ ان مریضوں کو ود جی بھر کر خواب آور ادویہ دیتے ہیں۔ LIBRAX تو ان کے لئے مخصوص ہو گئی ہے۔ درد سکون آور ادویہ کے نام سے ملنے والی تمام دوائیں ان کا مقدور رہتی ہیں۔ جیسے کہ LIBRIUM - SEREPAX - VALIUM - ATIVAN وغیرہ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جسمانی احساسات کو کندہ کرنے والی یہ دوائیاں مریضوں کو بڑی پسند آتی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ عرصہ کے استعمال کے بعد جب ان کا گولی کھائے بغیر گزارا نہیں ہوتا یا اس کے بغیر نیند نہیں آتی اور جسم تھکا تھکا سا رہنے لگتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ وہ خود فرسی کے کسی مقام پر ہیں۔

یونانی طریقہ علاج میں اطریفل زانی، جوارش کیونی، سونف اور اجوائن کے عرق عام طور پر مفید اور بے ضرر ہیں۔ جوارش جالینوس بڑی عمدہ اور مفید دوائی ہے۔ لیکن جن کے پیٹ میں تیزاب پہلے سے زیادہ ہوں ان کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ لہذا اس کے لئے اس سے بہتر کوئی دوائی دیکھی نہیں گئی۔

• جب کاسر الریاح اور خواب آور دواؤں سے فائدہ نہ ہو تو ڈاکٹر غذا کو ہضم کرنے والے جوہر دے دیتے ہیں۔ جن سے ابتدا میں فائدہ ہوتا ہے۔ بعض اداووں نے تمام جوہر ترک کر کے پھتہ کا جوہر نکال کر اس کا سیال تیار کیا ہے اور یہ واقعی مفید ہے۔ PAPAINE کے نام سے ملنے والا یہ جوہر اکثر شربتوں جیسے کہ CARIPEPTIC کا جزو عامل ہوتا ہے لیکن ایسے علاج کا کیا فائدہ؟ جس روز بھی بند کریں اگلے دن پہلے سے زیادہ تکلیف ہو۔

## طب نبوی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی ادویہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اس بیماری میں مفید ہے۔ جناب کے ذکر میں انہوں نے سنا کے ساتھ جس سنت کا ذکر فرمایا ہے اسے صحہ شین نے سویا قرار دیا ہے۔ سویا پیٹ سے ہوا نکالنے میں اس حد تک مفید ہے کہ انگلستان کی وڈورڈ کمپنی 150 سال سے گرائپ وائر کے نام سے بچوں کے پیٹ سے ہوا نکالنے والی دوائی کی کمائی کھا رہی ہے۔ جس کو دنیا کی ہر ماں پسند کرتی ہے۔ گرائپ وائر، سوڈا بائی کارب، سوئے کا تیل، تھوڑی سی الکحل اور گلوکوس کا مرکب ہے۔ یہ آسان سانسہ کسی بھی ڈسپنری میں تیار ہو سکتا ہے یا سوئے کا عرق نکال کر اگر دیا جائے تو وہ زیادہ مفید اور قابل اعتماد ہے۔ بلکہ پاکستانی دوائی ہمدرد کی "توہماں" اس سے زیادہ مفید ہے۔

صبح اٹھ کر یا عصر کے وقت خالی پیٹ شدہ پینے سے پیٹ کی جھن کم ہوتی اور ہوا نکل جاتی ہے۔

کھانے کے بعد 3 دانے خشک یا تازہ انجیر کھانے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور ہوا نکل جاتی ہے۔

رات سوئے وقت 1-2 بڑے بچے زیتون کا تیل جھنوں کی جھن دور کرنے کے ساتھ انجیر کا عمل ختم کر دیتا ہے۔

کھانے کے بعد کلونچی، قط، کاسنی، مرز بخوش، حب میں سے کوئی بھی چیز 2 گرام تک کھا لینے سے ہوا بھی نکل جاتی ہے اور وہاں اگر کوئی بیماری موجود ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہم نے اکثر مریضوں کو

10 گرام	قط الجری
50 گرام	کلونچی
2 گرام	سوئے

پس کر شد میں ملا کر میٹھن کی صورت میں تجویز کیا۔ اس مرکب کا پون چھوٹا چم پیٹ سے ہر قسم کی تبخیر ختم کر دیتا ہے۔



## بد ہضمی

### DYSPEPSIA

بد ہضمی ایک عام سی بیماری ہے جسے لوگ اکثر سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ پیٹ میں بوجھ یا کھیلنے کے بعد بوجھ، کھٹے ذکار، منہ میں کھٹا پانی آتے رہنا، صبح اٹھنے پر منہ کا ذائقہ کسٹلا، پیٹ میں ہوا بھی رہنا بد ہضمی کی عمومی علامات ہیں۔ چونکہ یہ تمام کیفیات پیٹ کی خرابی کی آئینہ دار ہیں اس لئے کھانا ٹھیک سے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے جسم میں کمزوری خاص طور پر ٹانگوں اور کمر کے پٹھے درد کرتے ہی۔ زیادہ تر مریض سوڈے کی بوتل، کوئی چورن یا ہسپتالوں کی لال مکھڑ پر گزارا کرتے ہیں۔ اکثر یہ نیچے سالما ساں سے استعمال کرتے چلے آتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب ہاضمہ کی لال مکھڑ یا سوڈا منٹ یا لال چورن ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ اس مرحلہ پر مریض کسی معالج سے مشورہ کرتا ہے۔ لیکن مریضوں کی اکثریت اس کیفیت کو بیماری سمجھنے پر تیار نہیں ہوتی اور اگر ان کو باقاعدہ علاج کا کہا جائے تو اکثر لوگ اس پر آمادہ نہیں ہوتے۔

بد ہضمی بذات خود بیماری نہیں بلکہ پیٹ میں ہونے والی متعدد بیماریوں کی علامت ہے جیسے کہ:

عام بد ہضمی

مرغن غذاؤں، مسلسل بسیار خوری، آرام طلب زندگی، پرانی قبض، کھانے کے غیر

ضمین اوقات یا کھانا کھانے کے بعد جلد سو جانے کی وجہ سے آنٹوں میں غذا معمول سے زیادہ ٹھہرتی ہے۔ جس کی وجہ سے بد ہضمی کی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ پیدل چلنے سے آنٹوں میں موجود خوراک بھی آگے کو چلتی ہے۔ جو لوگ گھر سے سواری پر کام پر جاتے اور اسی طرح واپس آتے ہیں ان کو بد ہضمی کی بیماری ان کی اپنی کوشش سے حاصل ہوتی ہے۔

### نفیاتی بد ہضمی

اگر کوئی دباؤ ہو، غصہ، گھبراہٹ، ڈر خوف، فرار، اضطراب اور پریشانی۔ صدمات کی وجہ سے آنٹوں کے افعال متاثر ہوتے ہیں۔ ان تمام ذہنی کیفیات میں بھوک اڑ جاتی ہے۔ آنٹوں میں غذا کا سفر طویل ہو جاتا ہے۔ قبض اکثر ہوتی ہے۔ جس میں دودیں اکثر اوٹ خرابی ان کے ذیلی نتائج ہیں۔

### آنٹوں کی سوزش

پرانی بچپن، اپنڈکس، پیٹ کے یہاں سے اس طرح کی صورت GIARDIASIS بد ہضمی کا باعث ہوتے ہیں۔

### شرح اسباب

اپنڈکس اور ذہنی اثرات سے ہونی والی بد ہضمی عرصہ دراز رہتی ہے اگر علامات میں کمی آتی رہتی ہو تو یہ معدہ کے السر کو ظاہر کرتی ہے۔ جگر کی خرابیوں اور کینسر کی صورت میں بھوک اڑ جاتی ہے۔ ذہنی بد ہضمی اور معدہ کی سوزش میں حلی بھی ہوتی ہے۔ اگر قے آ رہی ہو تو اس کا مطلب شدید بیماری یا رکاوٹ ہے۔ خون کی قے، جگر کے انحطاط، معدہ کے السر، معدہ کی سوزش اور کینسر میں آتی ہے۔

مستل قبض آنٹوں کے زخم، معدہ کے کینسر، معدہ کے منہ کی بندش، اپنڈکس کی سوزش میں ہوتی ہے۔ جب کہ اسہل آنٹوں کی سوزش، بڑی آنت کے کینسر اور بلبہ کی سوزش میں ہوتے ہیں۔ سیاہ رنگ کا پاخانہ اس صورت میں آتا ہے جب فولاد کا

کوئی مرکب کھایا جا رہا ہو ورنہ یہ آنتوں میں زخم اور کینسر کی علامت ہے۔  
 منہ میں تیزابی پانی معدہ کے زخموں اور معدہ کی مزمن سوزش میں آتا ہے۔ تبخیر  
 اور پیسٹ میں ہوا زیادہ تر پتہ کی بیماریوں کے علاوہ ڈکار مارنے کی بری عادت سے ہوتے  
 ہیں۔

مریض کی علامات اگر تبدیل ہوتی رہتی ہوں اور اسے کافی عرصہ آرام رہتا ہو یا  
 صبح کو متلی اور درد بغیر کسی کوشش کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ درد ایسا ہو کہ غینہ میں  
 خلل نہ آئے اور تفکرات زیادہ ہوتے ہیں تو ان میں پریٹانی کی کوئی بات نہیں ہوتی۔  
 یہ کیفیت اکثر خطرناک بیماری کے علاوہ ہوتی ہے۔

## طب یونانی

صبح الملک حکیم اجل خان صاحب نے بھرے پیٹ کھانا کھانے 'جلد جلد کھانے'  
 ہینر خوری کھانے کے درمیان زیادہ پانی پینے سے چاول اور ٹھنڈی چیزیں کھانے اور  
 فٹیل غذاؤں کو بد قسمی کا باعث قرار دیا ہے۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ ابتدا میں گرم پانی  
 کے ساتھ سکینین دے کر مریض کو تھکے کر والی جائے۔ پھر انی کے پانی کے ساتھ سناکی  
 دے کر مریض کو جلاب دے دیں۔ باقاعدہ علاج میں جوارش نمونی کے ہمراہ

سونف      تخم سکوت

5 ماشہ      3 ماشہ

کو عرق بادیان اور گلاب کے ساتھ کھلائیں انہیں کا ایک دوسرا نسخہ یہ ہے۔

سونف      پودینہ خشک      الاچھی سبز      کھنڈ

7 ماشہ      3 ماشہ      3 ماشہ      4 تولہ

کو پانی میں جوش دے کر چھان لیں۔ اس میں 4 تولہ مسکنجبین ملا کر روزانہ پلایا  
 جائے۔ بچوں کے پیٹ میں تکلیف کے لئے چار عرق بڑے مشہور ہیں۔ لاہور کے  
 ایک ذاکر صاحب حکیم محمد اکبر نے بھی کے شربت کے ہمراہ سونہ تجویز کی ہے اس

عرق کے افلاکیت کا یہ عالم ہے کہ وہ روزانہ: 100 سی سی 100 عہدہ بوتلیں بیچ لیتے ہیں۔ طب یونانی میں پیٹ سے ہوا نکلانے والی ادویہ کی ایک بڑی عمدہ اور اچھی تعداد موجود ہے جس سے نسخہ لکھنے والا اپنی مرض کا انتخاب کر سکتا ہے۔ عام طور پر جوارش جالینوس، جوارش کمونی، سنت مالتی، سوف، ملٹھی، پورینہ، پیٹک، ناخواہ، اجوائن، زیرہ، دارچینی، لوٹک، فلفل، سوئے، تیزبات، اناردانہ، ہیبتہ وغیرہ اس سلسلے میں استعمال کئے جاتے ہیں۔

اکثر حکماء نے اپنی اپنی پسند کے نسخے ترتیب دیئے ہیں جن میں سب سے زیادہ دلچسپ دواخانہ نورالدین کی "اکسیر شانی" ہے۔ جس میں 21 کاسر الراح ادویہ شامل ہیں جن میں سوف سے لے کر پیٹک تک ہر قسم کی چیزیں ڈالی گئیں ہیں۔ بدھنسی کی خواہ کوئی بھی قسم ہو یہ دوائی مفید ہو سکتی ہے۔

مطب جدید نے یونانی اطباء سے کاسر الراح ادویہ کا تصور لیا۔ ان میں سے اکثر ادویہ ایسی ہیں جو گھروں میں کھانا پکانے کے دوران مصالحے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ اور یہ چیزیں یورپ والوں کے لئے نئی ہیں۔ چونکہ یہ چیزیں بھوکہ بڑھاتی، کھانے کو ہضم کرنے میں امداد کرتی اور پیٹ سے ہوا نکالتی ہیں۔ اس لئے انہوں نے ان کو CARMINATIVES کے نام سے برطانوی قریبا دین میں شامل کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں الاپچی سبزیوں مقبول رہی ہے۔ اس کے ساتھ چند دوسری چیزیں شامل کر کے TR. CARDAMOMI Co ایک مشہور دوائی ہے۔ اس کے علاوہ دارچینی، لوٹک، جاتفل، زیرہ، سوئے کے تیل جن کو AROMATIC VOLATILE OILS کہتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے اپنی اپنی پسند کے عناصر جمع کر کے مختلف نسخے ترتیب دیئے ہیں۔

ہپتالوں کا مقبول نسخہ لائن کچھ عام طور پر یہ ہے۔

SODA BICAB grains 20

TR. CARD CO 30 drops

SPT. AMMON AROMAT 10 drops

AQUA MENTHA PIP. ad one ounce

ایک اونس کھانے کے بعد

بعض لوگ اس نسخے میں اورک اور اجوائن کی جگہ TR. ZINGEBERIS اور

TR. HYOSCYMUS بھی شامل کرتے ہیں۔

بد ہضمی بذات خود کوئی بیماری نہیں بلکہ متعدد بیماریوں کی علامت ہے۔ ذہنی بوجھ یا ثقل نغراؤں کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورت حال کا علاج تو ادویہ سے کیا جاسکتا ہے لیکن پتہ یا اپنڈکس کی سوزش کا دواؤں سے علاج خطرناک ہے۔

جدید علاج میں سن کل ایک نیا رجحان پیدا ہو گیا ہے۔ معالج حضرات کے پاس کتنوں کو سکون دینے والی ادویہ کی ایک بڑی تعداد آگئی ہے جیسے کہ STELABID 2 LIBRAX وغیرہ۔ یہ ادویہ بنیادی طور پر اعصاب پر مضبوط اثر رکھتی ہیں۔ جس سے مریض کی حسیات کند ہو جاتی ہیں یا آنتوں میں حرکات کم کر کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اطمینان ہو گیا۔ حقیقت میں اصل بیماری اپنی جگہ قائم و دائم موجود ہوتی ہے۔ اب اسی خاندان کی اور بھی دوائیں کثرت سے استعمال میں ہیں اور مریض خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ان کی بیماری جاتی رہی۔

## طب نبوی

بد ہضمی پیدا کرنے والی اکثر بیماریوں کا تفصیل سے تذکرہ کیا جا چکا ہے بد ہضمی کا بنیادی علاج شہد ہے۔ حالات خواہ کچھ بھی ہوں۔ شہد پینے سے آرام آتا ہے 'معدہ اور آنتوں کی جلن رفع ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ شہد اگر گرم پانی میں پیا جائے تو اکثر اوقات نیند آ جاتی ہے۔ جس کے بعد علامات کا بیشتر حصہ ختم ہو جاتا ہے۔

کھانے کے بعد بوجھ زیادہ ہو تو 3-4 دانے خشک انجیر چبا لینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پیٹ میں اگر السر نہ ہو تو انجیر کو کچھ عرصہ لگانا کھانا مفید رہتا ہے۔ یہ فائدہ پتہ کی سوزش میں بھی جاری رہتا ہے۔ معدہ میں کینسر یا زخم کی صورت میں زیتون کا تیل

ایک شلانی علاج ہے۔ اکثر مریضوں میں جو کالدیہ شدہ ملا کر دیا مفید رہتا ہے۔ کیونکہ جو کی لیس جلن کو سکون دیتی ہے۔ یہ قبض کشا ہے۔ جسمانی کمزوری کا بھی علاج ہے۔  
تجیر معدہ کے سلسلہ میں مذکورہ نسخے بھی اس میں مفید ہیں۔ ان کے علاوہ :

40 گرام	قطہ البھری
50 گرام	کلونجی
10 گرام	سوئے

ملا کر صبح، شام، پون چھوٹا پیچ کھانے کے بعد دینے سے اکثر مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔

## سوزش معدہ

### ACUTE GASTRITIS

معدہ میں سوزش عام طور پر جلن پیدا کرنے والی دواؤں مثلاً اسپرین، شراب، فولاد کے مرکبات اور جوڑوں کے درد کی دواؤں از قسم PHENYL BUTAZONE کھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لئے یورپی ممالک میں شراب پینے والوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ خالی پیٹ بارہ نوشی سے پرہیز کریں۔

اس سلسلہ میں سب سے اہم ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی کہ کھانا گرم گرم نہ کھایا جائے۔ گرم کھانا جب پیٹ کے اندر جاتا ہے تو معدہ کی جھلیوں میں اپنے درجہ حرارت کی وجہ سے خون کا ٹھنڈاؤ پیدا ہوتا ہے جب ایسا بار بار ہوتا ہے تو معدہ میں سوزش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

گروں کے فیل ہونے کے نتیجے میں جب خون میں یوریا کی مقدار بڑھ جاتی ہے یا خون میں پیپ پیدا کرنے والے جراثیم کی وجہ سے زہر بار پیدا ہوتا ہے تو اس کے اثرات معدہ پر سوزش کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔

معدہ کی جھلیاں متورم ہو جاتی ہیں۔ ان میں سرخی آ جاتی ہے۔ اس کے رد عمل کے طور پر نازک غلے گھسنے یا گھنے نکتے ہیں۔ جس کی وجہ سے اندرونی طور پر جریان خون ہو جاتا ہے یہ معمولی بھی ہو سکتا ہے اور شدید بھی۔

## علامات

بھوک ختم ہو جاتی ہے خاص طور پر ناشتہ کو جی نہیں چاہتا۔ مٹلی، کبھی کبھی قے یا خون کی قے، پیٹ میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ پیٹوں کے نیچے پیٹ کے درمیانی حصہ میں درد ہوتا ہے۔ بار بار خون ہنے اور بھوک کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی لاحق ہو جاتی ہے۔ چونکہ معدہ کی دیواروں سے خون بنانے والا ایک جوہر بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے دہاں پر بیماری کی صورت میں اس جوہر کی پیدائش متاثر ہوتی ہے اور یوں خون کی کمی کا ایک اور باعث معرض وجود میں آ جاتا ہے۔

## علاج

جدید علاج میں عجیب دو عملی ہے۔ ایک طرف سے وہ مشورہ دیتے ہیں کہ بیماری کا علاج تیزابیت کو ختم کرنے والی ادویہ سے کیا جائے دوسری طرف ان کا کہنا ہے کہ اس بیماری میں معدے کے تیزاب کم ہو جاتے ہیں۔ اس لئے مریض کے ہانسہ کو قائم رکھنے کے لئے کچھ تیزاب کا مرکب بھی دیا جائے۔

عام طور پر سکون اور ادویہ 'تیز اور مصالحہ دار غذاؤں سے پرہیز کے نتیجہ میں بیماری اپنی ابتداء ہی میں ختم ہو جاتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ مزمن شکل اختیار کر لیتی ہے۔

## مزمن سوزش معدہ CHRONIC GASTRITIS

معدے کی جھلیوں کا بیماری کے دوران مطالعہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ جن لوگوں نے اس سلسلہ میں کوشش کی وہ ناکام رہے۔ کیونکہ جسم سے باہر آنے کے بعد یہ جھلیاں اپنی ماہیت تبدیل کر لیتی ہیں۔ اس لئے جدید علوم میں ان کی واضح شکل و صورت کچھ مدت پہلے تک معلوم نہ ہو سکی تھی۔

یہ بات صراحت سے معلوم نہیں کہ ابتدائی سوزش جب ٹھیک نہ ہو تو اس کے



نتیجہ میں مزمن نوعیت پیدا ہوتی ہے۔ یا یہ ابتدا ہی سے مزمن ہوتی ہے کیونکہ یہ معدہ کی جھلیوں میں شدید نوعیت کی انخطاطی تبدیلیاں لاتی ہے۔ جس کو معدہ کی دیواروں کے گل جانے یا تغیر پذیر ہو جانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب دیواریں ان کی جھلیاں اور ان میں پائے جانے والے عضلات اور غدودیں گھنا شروع ہو جائیں تو خون کی کمی اور سوء ہضم کا پیدا ہو جانا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ پرانے استاد بد ہضمی کے ساتھ پیٹ میں جلن کے ہر مریض کو سوزش معدہ تشخیص کیا کرتے تھے۔ مگر اب کی تحقیقات نے بتایا ہے کہ یہ تشخیص نہ صرف کہ غلط ہے بلکہ سوزش معدہ ایک خطرناک بیماری ہے جسے تیزاب مارنے والی دواؤں سے ٹالا نہیں جاسکتا۔

یہ بیماری بنیادی طور پر انخطاطی ہے۔ اس لئے مریض جلد ٹھیک بھی ہو جائے تب بھی اس کی سائنٹ کچھ نہ کچھ خرابی ہمیشہ کے لئے رہ جاتی ہے۔ معدہ کی فعالیت متاثر ہونے کے علاوہ اس کا اگلا مرحلہ کینسر ہے۔ GASTROSCOPY کرنے پر معدہ کا رنگ میلا نظر آتا ہے۔ جھلیوں پر لیس کا جماؤ ہوتا ہے اور سوزش کے آثار دیکھے جاتے ہیں۔

معدہ کی مزمن سوزش کا اظہار عام طور پر بد ہضمی کی صورت میں ہوتا ہے۔ لیکن ماہرین نے خون کی کمی، پھلپھلیں، زیا بیٹس اور گردن کی غدود اور غدہ درقہ کی سوزش کو بھی اسی بیماری سے وابستہ کیا ہے۔

### علامات

عام علامات السر کی مانند ہوتی ہیں۔ لیکن وہ علامات جو معدہ کے سرطان کے سلسلہ میں بیان کی گئی ہیں شامل ہوتی ہیں۔

معدہ سے کافی مقدار میں خون خارج ہوتا ہے جو قے کی شکل میں یا پاخانہ میں سیاہ خون کی شکل میں نکلتا ہے۔ دست اکثر آتے ہیں۔

پیٹ میں درد، بوجھ، بھوک کی کمی، اور گلے کی اندر ہٹم جمع رہتی ہے۔ شراب پینے پر پیٹ میں درد، قے ہوتے ہیں۔ یہی کیفیت اسپرین کی گولی سے بھی ہوتی ہے۔ کچھ غذائیں بھی معدے کو ناگوار گزرتی ہیں اور ان کو کھانے کے بعد درد، متلی اور

نے کے دورے پڑتے ہیں۔

## علاج

زیادہ تکلیف کے دوران مریض چارپائی پر لیٹا رہے۔ پیٹ پر گرم پانی کی بوتل سے لگور کریں۔

معدہ کو تکلیف دینے والے اسباب از قسم گرم گرم کھانا، مرچیں، تمباکو، شراب، اسپرین اور جوڑوں کی درد کی دواؤں سے پرہیز کیا جائے۔ کھانا اچھی طرح چبا کر کھایا جائے۔

وہ تمام طریقے اختیار کئے جائیں جو السر کے علاج میں کئے جاتے ہیں۔

## طب نبوی

### معدہ کے کینسر اور مزمن سوزش کا علاج

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معدہ کو بیماری کا گھر قرار دیا ہے۔ انہوں نے معدہ کی مہلیوں کی حفاظت کے سلسلہ میں متعدد اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں جن میں ناشتہ صبح جلدی کرنے کا حکم بھی ہے۔ رات بھر کے فائد کے بعد معدہ صبح کو خالی ہوتا ہے۔ اس وقت اگر چائے یا کافی یا لیموں کا عرق پیا جائے تو معدے کی تیزابیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں وہاں پر سوزش اور السر کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے علی الصبح خود ہمیشہ شہد پیا، جو تیزابیت کو کم کرتا ہے اور معدہ کی مہلیوں کی حفاظت کرتا ہے ناشتہ جلدی کرنے کی تاکید یوں فرمائی۔

خير الغذاء بواکرو

(بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح جلدی کیا جائے)

السر کے علاج کے سلسلہ میں معدہ اور آنتوں کی سوزش کے بارے میں طب نبوی سے جو افادات پیش کئے گئے ہیں وہی اس بیماری میں موثر اور مفید ہیں۔

نہار نہ شہدہ ناشتہ میں جو کا دلیا شہدہ ڈال کر جس وقت پیٹ خالی ہو اس وقت زیتون کا تیل پلانے سے معدہ میں سوزش کا کوئی بھی عنصر باقی نہیں رہتا۔

سعودیہ میں تیل کی کمپنی کے ایک امریکن افسر کو معدہ میں سوزش تھی اور وہ شراب پینے سے بھی باز نہ آتا تھا۔ امریکی ڈاکٹر اس کے علاج سے عاجز آ گئے تھے۔ ایک نجی دعوت میں اس نے اپنی عادت بد اور بیماری کا تذکرہ بڑے مزاحیہ انداز میں کیا۔ دعوت کے بعد ہم نے علاج کی پیش کش کی تو وہ اسے بھی مذاق سمجھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ وہ علاج تو آزمائے گا لیکن فیس کوئی نہ ہوگی۔ وہ ہر رات شراب پیتا تھا۔ اس کے بعد سوتے وقت دودھ کے گلاس میں کبھی خالص زیتون کا تیل اور کبھی اسے شہدہ سے مینھا کر کے تیل ملا کر پینے کا بتایا گیا۔ صبح کے ناشتہ میں جو کا دلیا یا کبھی QIAKER OATS شہدہ ڈال کر استعمال ہوتے رہے۔ دن کو اگر جلن ہوئی تو اس نے GELUSIL کی گولیاں کھائیں یا شہدہ پی لیا۔

یہ سلسلہ ایک سال تک چتا رہا۔ اس دوران اس کی بیماری بتدریج کم ہوتی گئی اسے درد کا شدید دورہ ایک مرتبہ بھی نہ پڑا اور نہ ہی پیٹ سے خون نکلا۔

یہ ایک ایسے مریض کی داستان ہے جس کی دماغی حالت بھی درست نہ تھی۔ کیونکہ وہ شراب جس نے اس کے معدہ میں پہنچے ہی سوزش پیدا کی ہے وہ اسے چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ وہ پیتا رہا اور روتا رہا۔ لیکن اس مبارک علاج کی افادیت اتنی شاندار تھی کہ پرہیز نہ کرنے کے باوجود وہ بہتر ہوتا رہا۔ اس کے بعد ایسے کئی اور مریض دیکھنے میں آئے جو پرہیز بھی نہ کرتے تھے اور علاج بھی باقاعدگی سے نہ کرتے تھے۔ مگر ان کو اس کے باوجود فائدہ رہا۔ کچھ لوگوں کو سستی اور آسمان دواؤں سے تسلی نہیں ہوتی۔

ایک خاتون کو السر کے ساتھ معدہ میں سوزش تھی جس کے علاج کے لئے وہ ہر سال انگلستان جایا کرتیں۔ انہیں مٹھی بھر گولیاں صبح شام کھا کر

کچھ آرام آتا مگر وہ بھی عارضی۔ ان کے ایک عزیز کی سفارش پر ہم نے ان کے علاج کی جسارت کی۔ جس میں جو کا دلایا اور زیتون جیسی ارزاں چیزیں تھیں۔ اس سے شدید تکلیف جاتی رہی۔ مزید الطمینان کے لئے پھر ولایت گئیں۔ پتہ چلا کہ زخم تو ٹھیک ہو گیا ہے مگر سوزش موجود ہے۔

دوسرے باقاعدہ مریضوں میں اکثر کو اتنا ہی علاج کافی رہا۔

کینسر کے علاج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے براہ راست ارشاد میسر نہیں۔ البتہ ابن قیم نے جسم میں کسی جگہ بھی بڑھے ہوئے گوشت کے لئے اشد کو مفید قرار دیا ہے۔ اشد ANTIMONY کا سرمہ ہے۔ اس کا اندرونی استعمال آسانی سے ممکن نہیں۔ اگرچہ بعض تیاریوں کے لئے اس سے نیچے بنے ہیں۔ لیکن معدے کے کینسر میں ان کے استعمال کا ابھی موقع میسر نہیں آسکا۔

چھاتیوں اور پرائیٹ کے کینسر میں ہم نے متعدد مریضوں کو قسط البحری میں کلونچی کی معمولی مقدار دی ہے۔ ندرہ ورقہ میں رسولی کے متعدد مریضوں کو بھی یہی علاج دیا گیا۔ میں سے اکثر کی بیماری پانچ سال سے زیادہ عرصہ پرانی ہو چکی ہے۔ مگر وہ اللہ کے فضل سے زندہ ہیں۔

جرمن سائنس دانوں نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ کلونچی کھانے سے آنتوں کا سرطان ٹھیک ہو جاتا ہے۔

## معدہ اور آنتوں کے السر (زخم)

### PEPTIC ULCERS

انسان کا معدہ خوراک کے ہضم کرنے میں زیادہ اہم کردار نہیں رکھتا۔ سب سے پہلے یہ اندر آنے والی غذا کا شور مٹاتا ہے۔ پھر اس میں موجود نمک کا تیزاب اور Pepsin مل کر شکر کو گلوکوس میں تبدیل کرتے ہیں۔ دوسرے افعال معمولی نوعیت کے ہیں۔ چونکہ یہاں غذا زیادہ طور ہضم نہیں ہوتی اس لئے انجذاب کا عمل بھی برائے نام ہوتا ہے۔ ہضم اور انجذاب کا سارا سلسلہ چھوٹی آنت میں عمل پاتا ہے تیزابی ماحول میں آدھ گھنٹہ گزارنے کے بعد خوراک کو چھوٹی آنت کی طرف روانہ کرنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ چھوٹی آنت کو تیزابیت ناپسندیدہ ہے۔ اس لئے اس کے سب سے پہلے حصہ DUODENUM کی مچلیوں سے سوڈا باکی کارب پیدا ہوتا ہے۔ جو معدہ سے آنے والی غذا کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔

معدہ میں اگرچہ نمک کا تیزاب HYDROCHLORIC ACID موجود رہتا ہے لیکن یہ اس کی دیوار کو آچھ نہیں کھتا۔ قدرت نے ان دیواروں میں تیزاب سے مدافعت کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جو اس صلاحیت کو متاثر کر کے ختم کر دیتا ہے۔ اور تیزاب معدہ کی دیواروں کو کھا جاتا ہے۔ وہاں زخم پیدا ہو جاتے ہیں۔ زخم معدہ میں ہوں تو ان کو GASTRIC ULCER اور اگر چھوٹی آنت کے پہلے حصہ میں ہوں تو ان کو DUODENAL ULCER کہا جاتا ہے۔ دونوں کو مل کر PEPTIC ULCER کا نام دیا جاتا ہے۔

معدہ کا یہ امر مذہب سوسائٹی میں ایک روزمرہ کی بات بن گیا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں جہاں اعداد و شمار میسر ہیں یقین کیا جاتا ہے کہ 10 فیصدی مردوں کو دونوں اندروں میں سے ایک ضرورت ہو جائے گا۔ پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ یہ بنیادی طور پر مردوں کی بیماری ہے اور عورتیں نسبتاً محفوظ رہتی ہیں۔ مردوں اور عورتوں میں معدہ کے امراض کی شرح 4:1 تھی اور آنت کے امراض 2:1۔ لیکن اب صورت حال بدل کر دونوں میں مردوں اور عورتوں کا تناسب 2:1 رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ کاروبار، تفرات، خوراک، بلکہ شراب نوشی اور تباہ کن نوشی میں مغربی ممالک کی عورتیں ہر طرح سے مردوں کی ہم پلہ ہو گئی ہیں اس لئے ان حرکات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں میں بھی یہ برابری شریک ہو گئی ہیں۔

## اسباب

پرانے استادوں کا خیال تھا کہ غذا میں بد اعتدالیاں خاص طور پر چٹ پنی غذا میں اور تیز شرا میں معدہ کی جھلیوں کو ایب کمزور کر دیتی ہیں کہ تیزاب ان کو کھا جاتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ہندوستان کے جنوبی حصے میں کھانسی کا زیادہ شوق امراض کی زیادتی کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ ان کے زیادہ تر امراض پھٹ جاتے ہیں یا معدہ میں آر پار سوراخ کر دیتے ہیں۔

اس بیماری کا اب ایک نیا سبب مقبول ہو رہا ہے۔ جب کوئی شخص ہر وقت سڑنا اور کڑھتا رہتا ہے تو اس عمل میں اس کے معدہ کی دیواروں میں دوران خون میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ خون کی کمی کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت کے کمزور پڑتے ہی وہاں پر موجود تیزاب دیوار کا ایک کونا کھا لیتا ہے۔ یہ دیواریں کبھی اتنی کمزور نہیں ہوتیں کہ تیزاب پوری دیوار یا پوری اندرونی جھلی کو گلا دے۔ ان کی کمزوری سے تیزاب کو کبھی کبھار ایک آدھ کونہ کھا لینے کا موقع ملتا ہے جب کہ باقی حصہ اسی طرح تیزاب کی موجودگی کے باوجود اپنی حیثیت اور تندرستی قائم رکھتا ہے۔

کاروباری حضرات، سرجن، پائلٹ، پریشانی کا کام کرنے والے اور مصیبت کے دن گزارنے والوں کو اکثر امراض ہو جاتے ہیں۔ جوڑوں کے دردوں میں استعمال ہونے والی

اکثر دوائیں اگر درد کو آرام دیتی ہیں تو ہیٹ میں السر پیدا کرتی ہیں۔ اسپرین کا السر سے براہ راست تعلق ثابت ہو چکا ہے۔ کچھ السر ایسے ہیں جو معدہ میں ہونے کے باوجود بدلتوں خاموش یا بغیر تکلیف دیئے پڑے رہتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو اگر اسپرین کھائی پڑے تو اس کے فوراً بعد زخموں سے خون نکلنے لگتا ہے۔ کیونکہ اسپرین میں موجود تیزاب معدہ کی مصلیوں کی قوت مدافعت کو براہ راست ختم کرتے ہیں۔ جوڑوں کے درد کے لئے استعمال ہونے والی جدید ادویہ میں سے اکثر اپنی کیساوی ساخت میں اسپرین سے مختلف ہیں۔ لیکن ان میں موجود کیساوی اجزاء ہر مرتبہ السر بنا دیتے ہیں۔ یہاں پر دو برائیوں میں سے ایک کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سمجھدار مصلح جب بھی جوڑوں کے درد کے لئے دوائی تجویز کرتے ہیں تو ساتھ ہی تیزاب کی شدت کو کم کرنے والی دوائی ضرور دیتے ہیں۔ اس عمل کو اطباء عرب نے بدرقہ یا مصلع کا نام دیا تھا۔

شراب نوشی، تمباکو نوشی اور تفکرات کے علاوہ صدمات بھی السر پیدا کرتے ہیں۔ جیسے کہ خطرناک نوعیت کے حادثات، اپریشن، جل جانے اور دل کے دورہ کے بعد اکثر لوگوں کو السر ہو جاتا ہے۔ اس کی توضیح یہ کی جا سکتی ہے کہ صدمات چوٹ اور دہشت کے دوران جسم میں ایک ہنگامی مرکب HISTAMINE پیدا ہوتا ہے یہ وہی عنصر ہے جو جلد پر حساسیت کا باعث ہوتا ہے۔ یقین کیا جا رہا ہے کہ اس کی موجودگی یا زیادتی معدہ میں السر کا باعث ہوتی ہے۔ اسی مفروضہ پر عمل کرتے ہوئے السر کی جدید دواؤں میں سے CEMITIDINE بنیادی طور پر HISTAMINE کو بیکار کرتی ہے۔ اور یہی اس کی افادیت کا باعث قرار دیا گیا ہے۔

ایسی خوراک جس میں ریشہ نہ ہو جیسے کہ خوب گلا ہوا گوشت، چھنے ہوئے سفید آٹے کی روٹی السر کے غذائی اسباب ہیں۔

اکثر اوقات السر خاندانی بیماری کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ آپس میں خونی رشتہ رکھنے والے متعدد افراد اس میں یک وقت مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ ان میں تکلیف وراثت میں منتقل ہوتی یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے

ہودوہاش کا اسلوب کھانا پینا یا عادات ایک جیسی تھیں۔ اس لئے ان کو السر ہونے کے امکانات دوسروں سے زیادہ رہے۔ جنسی ہارمون اور کورٹی سون کا استعمال سر پیدا کر سکتا ہے۔

### علامات

50 فیصدی مریضوں کو السر معدہ کے اوپر والے منہ کے قریب ہوتا ہے وہ اسباب جو معدہ میں زخم پیدا کرتے ہیں وہ بیک وقت ایک سے زیادہ السر بھی بنا سکتے ہیں لیکن 90 فیصدی مریضوں میں صرف ایک ہی السر ہوتا ہے۔ جب کہ 10-15 فیصدی میں ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔

پیٹ کے وسط میں پسلیوں کے نیچے جلن سے بیماری کی ابتداء کا پتہ چتا ہے۔ تیسے عام انگریزی میں لوگ HERATBURN کہتے ہیں۔ یہ جلن بڑھتے بڑھتے درد کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ درد کے اوقات واضح اور مقرر ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر دو کھانوں کے درمیان محسوس ہوتا ہے۔ مریضوں کو بھوک کا احساس درد سے ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ خالی پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ اکثر مریض کھانا کھانے کے بعد آرام محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹ کے تیزاب کھانے کو ہضم کرنے میں صرف ہو جاتے ہیں اس طرح وہ زخم پر لگ کر تھوڑی دیر کے لئے درد کا باعث نہیں بن سکتے۔

معدہ سے غذا کو مکمل طور پر نکل کر آنتوں میں جانے میں 2 گھنٹے سے زائد عرصہ لگتا ہے معدہ 2-3 گھنٹوں میں خالی ہو جاتا ہے۔ اس لئے اب تیزاب زخم پر لگ کر درد پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے یا مریض کو درد کی تکلیف کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد محسوس ہوتی ہے۔ مریض کو اگر تھوڑے ہو جائے تو تیزاب کی کافی مقدار باہر نکل جاتی ہے۔ اور درد میں کافی دیر کے لئے افادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس تھکرات پریشانیوں و بیشٹ شراب اور اسپرٹن درد میں اضافہ کرتے ہیں۔

السر کا درد ایک مخصوص مقام پر ہوتا ہے۔ اکثر مریض سوال کرنے پر درد کی جگہ انگلی رکھ کر صحیح نشان دی کر سکتے ہیں۔ سوڈا بائی کارب کی تھوڑی سی مقدار بھی اس میں کمی لا سکتی ہے۔ درد اگر معدہ کے السر کی وجہ سے ہو تو یہ زیادہ عرصہ نہیں رہتا۔



اگرچہ لوگ 20 سال تک بھی اس میں مبتلا رہتے ہیں مگر عام طور پر اس سے بہت پہلے یہ پھٹ جاتا ہے یا کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے کبھی کبھی زیادہ مدت چل سکتا ہے۔ اس کا درد پیٹ کے علاوہ گردن سے نیچے کندھوں کے درمیان بھی محسوس ہو سکتا ہے۔

السر میں تشخیص کا سارا واروہ دار درد کی نوعیت، اس کے اوقات اور اس کے کھانے پینے سے تعلق پر ہوتا ہے۔ معدہ کے السر میں مریض کو بھوکے پیٹ درد ہوتا ہے۔ لیکن کھانا کھانے سے آرام آتا ہے۔

کچھ لوگوں کو درد کے بغیر ایک روزنامہ لہانی طور پر پتہ چل ہے کہ قے کے ساتھ خون آ رہا ہے اور ان کے پیٹ میں السر ہو گیا ہے۔ ورنہ عام طور پر سب سے پہلے جلن ہوتی ہے پھر منہ میں کھٹا پانی آ جاتا ہے۔ (WATER BRASH) بھوک کم ہو جاتی ہے کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ جی مٹلانا اور قے ضروری نہیں لیکن قے اگر بار بار آئے اور وہ خاصی مقدار میں ہو تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معدہ کا آنتوں کی طرف سے منہ بند ہے یا اس میں جزوی طور پر رکاوٹ آ گئی ہے۔ بد ہضمی السر کے مریضوں کا خاصہ ہے۔ لیکن اجابت کا نظام بہت کم متاثر ہوتا ہے۔ البتہ کبھی قبض اور کبھی اسہال روزمرہ کی بات بن جاتے ہیں۔ ان تمام امور سے مریض کی غذائی حالت متاثر ہوتی ہے۔ اس کا وزن کم ہونے لگتا ہے اور کمزوری بڑھتی ہے۔

السر یوں بھی گھبراہٹ اور بے سکونی کے مریضوں کو ہوتا ہے اوپر سے جب بد ہضمی اور بھوک کی کمی شامل ہوں تو مریض کا حال مزید خراب ہو جاتا ہے۔

### پیشہ گیریاں

السر کی سب سے بڑی خرابی یا دہشت اس کا پھٹ جانا یا اندر خون بہنا ہے۔ عام طور پر کسی السر سے اپنے آپ جریان خون شروع نہیں ہوتا۔ بلکہ مریض شراب پیتا، اسپرین کھاتا ہے یا جوڑوں کے درد کی دواؤں میں خاص طور پر CORTISONE یا PHENYL BUTAZONE وغیرہ کھاتا ہے تو یہ پھٹ جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے بے ہوشی، کمزوری، چکر خنڈے پسینے آتے ہیں نبض کمزور پڑ جاتی ہے۔

اسی طرح معدہ کی دیواروں میں آر پار سوراخ ہو سکتا ہے۔ جس میں جیت تھنے کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ شدید درد، بخار، شدید قسم کا PERITONITIS ہو جاتا ہے۔

معدہ کا وہ حصہ جو آنتوں کی طرف کھلتا ہے بند ہو سکتا ہے راستہ بند ہونے پر غذا معدہ سے نہ تو آگے جاسکتی ہے اور نہ ہی جسم کی توانائی قائم رہ سکتی ہے۔ جتنی دیر معدہ غذا کو روک سکتا ہے روکے رکھتا ہے پھر تے کی صورت میں ساری غذا ایک دم سے باہر نکل جاتی ہے۔ اس تے سے بڑا سکون ملتا ہے۔ مگر یہ سکون ایک طوفان کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ پانی اور نمک کی فوری کمی واقع ہو جانے سے وہ تمام علامات پیدا ہو جاتی ہیں جو بیضہ اور اسہال میں ہوتی ہیں۔ ساتھ ہی خون کی کمی اور ہسملی کمزوری آن لیتے ہیں۔ معدہ پھیل جاتا ہے۔ ACUTE GASTRIC DILATATION کہتے ہیں۔ اس کی 10 فیصدی اقسام کینسر میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔

یہ تمام پیچیدگیاں خطرناک ہیں۔ ان میں سے ہر ایک جان لے سکتی ہے۔ اگرچہ ان میں بعض کا دواؤں سے علاج ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ طے کرنا کہ کون سے مریض کو بہتری ہو رہی ہے اور کون سے کے حالات خراب ہو رہے ہیں تجربہ کار اور مستند معالج کی صلاحیت پر منحصر ہے۔ موٹی بات یہ ہے کہ ان تمام حالات میں کسی قسم کے علاج کی کوشش کرنے کی بجائے مریض کو ایسے ہسپتال میں داخل کر دیا جائے جہاں پیٹ کے آپریشن کا معقول انتظام موجود ہو۔ ان کیفیات میں کسی قسم کا التوا موت کا باعث ہو سکتا ہے۔

## علاج

ان زخموں کا دواؤں سے اگرچہ علاج کیا جاتا ہے۔ لیکن بعد میں گڑبڑ پیدا ہونے کی وجہ سے ماہرین کی رائے میں ایک عام ڈاکٹر اور سرجن باہمی مشورہ سے مریض کا علاج کریں یا کوئی سرجن صورتحال سے آگاہ رہے تاکہ زخم میں سوراخ پیدا ہونے یا کسی ٹہلی کے پھٹ جانے کے بعد پیٹ میں ہونے والے جریان خون کو روکنے یا مریض کی جان بچانے کے لئے ہنگامی آپریشن کا بندوبست پیسے سے موجود ہو۔

## غذا

ماہرین ابھی تک متفق نہیں کہ مریض کے لئے مناسب غذا کون سی ہونی چاہئے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ مصالحہ دار غذائیں چونکہ بھوک کو بڑھاتی ہیں اس لئے دنیا میں ہر جگہ مصالحوں اور مریضوں سے منع کر دیا جاتا ہے۔ انگریز ڈاکٹر تو صرف اس پر اکتفا کرتے ہیں کہ مریض کو جو ناپسند ہو یا جس سے تکلیف ہوتی ہو۔ اسے کھانا چھوڑ دے۔ تمباکو نوشی کے دوران علاج بے کار ہوتا ہے۔

ہمارے ذاتی مشاہدے میں زیادہ مصالحے یقیناً خراب کرتے ہیں۔ لیکن معتدل مقدار میں گھر کا پکا ہوا معمولی مریضوں والا کھانا نقصان دہ نہیں ہوتا۔ البتہ جب مریض کو شدت کا دورہ پڑا ہو تو اس وقت مریضوں سے پرہیز ضروری ہے۔ ہم نے کھٹائی اور چکنائی کو ہمیشہ تکلیف کو بڑھانے والا پایا۔ کھنی چیزیں خواہ وہ سگھڑا ہی کیوں نہ ہو تیزابیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ اور چکنائی چونکہ مدہ میں ہضم نہیں ہوتی اس لئے تخییر پیدا کر کے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔

طب جدید میں لوگوں کو دودھ پر ضرورت سے زیادہ اعتقاد رہا ہے۔ بعض مریضوں کو علاج کے ابتدائی ایام میں دن میں چار چار مرتبہ دودھ پلایا جاتا رہا ہے۔ دودھ تیزاب کی تیزی کو مار دیتا ہے۔ لیکن بیٹ کے اکثر مریض دودھ ہضم نہیں کر سکتے بلکہ دودھ کی مٹھاس (LACTOSE) جراثیم کی کچھ قسموں کی پرورش میں مددگار ہوتی ہے۔ دودھ پینے سے جلن اور درد میں فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ آرام وقتی ہوتا ہے جب تیزاب پھر سے پیدا ہوتا ہے تو جلن پھر سے نمودار ہو جاتی ہے۔

## علاج بالادویہ

ڈاکٹروں نے مدہ کی تیزابیت کو مارنے کے لئے دواؤں کی ایک طویل فہرست رکھی ہوتی ہے۔ جن کو ANTACIDS کہتے ہیں۔ یہ کیساوی عناصر نمک کے تیزاب کی تیزی کو یکسٹری کے مشہور اصول کے تیزاب کے اثر کو الکی زائل کر دیتی ہے۔ اور الکی کے اثر کو تیزاب NUETRALISE کر دیتا ہے۔ یہی اصول زہر خورانی میں

استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے تیزاب پیا ہو اور اس کا اثر زائل کرنے کے لئے کوئی اٹلی جیسے چرنے کا پانی دیں۔ جس نے کوئی اٹلی جیسے کہ سوڈا کاسٹک وغیرہ پیا ہو تو اسے سرکہ یا لیموں کا پانی دے کر علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگرچہ ایسی خطرناک چیزوں کو استعمال کرنے اور علاج کرنے تک کے عرصہ میں تیزاب یا اٹلی جسم کو جلا کر اکثر اعضاء کو ختم کر چکے ہوتے ہیں۔

کیمسٹری کے اسی اصول کے مطابق معدہ میں تیزاب کی زیادتی کو ختم کرنے کے لئے اٹلی دی جاتی ہے۔ ان میں سے آسٹن اور مقبول سوڈا ہائی کارب ہے۔ یہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ سستا اور قدرے بے ضرر ہے۔ ایک اہم خوبی یہ ہے کہ چھوٹی آنت کا پہلا حصہ خود بھی سوڈا ہائی کارب پیدا کر کے معدہ سے آنے والی تیزابی غذا کی تیزابیت کو زائل کر دیتا ہے۔ سوڈا ہائی کارب کو اگر ابالا جائے تو وہ سوڈیم کاربونیٹ (کپڑے دھونے والا سوڈا) بن جاتا ہے جو کہ ایک زہریلا عنصر ہے۔

اس کے علاوہ CALCIUM-ALUMINIUM-MAGNESIUM

SODIUM POTASSIUM کے متعدد عامیاتی اور غیر نامیاتی مرکبات مختلف صورتوں میں

آتے ہیں جیسے کہ MAG. CARB - MAGNESIUM TRISILICATE

MAG. HYDROXIDE - ALUMINIUM HYDROXIDE وغیرہ۔ چند مشہور

تیزاب مارنے والی روائیں زیادہ مقبول ہیں۔ جن کے نسخے اس طرح ہیں۔

ALUMINIUM HYDROXIDE	MAGNESIUM HYDROXIDE	SIMETHICONE
FILMACID 300 mg	150 mg	125 mg
MYLANTA 400 mg	400 mg	30 mg
MUCCINE 291 mg	98 mg	OXYTHAZAINE
	MAG. TRISILICATE	10 mg
GELUCIL 250 mg	500 mg	
POLYCROL 4.75 mg	700 mg	ACTIVATED

اس کے علاوہ جو ادویہ کثرت سے استعمال ہوتی ہیں ان میں SIMECO - WHYDRATE - ALTACITE - ALUDROX - DIGEX ہیں۔ دافع تیزاب ادویہ میں سے اکثر سیال ہیں جب کہ چند ایک گولیاں بھی ہیں۔ مریض ضرورت کے وقت ان کو چبا کر کھا سکتا ہے۔ بہتر نتائج کے لئے اوپر سے دو گھونٹ پانی پی لینے سے اثر جلد ہوتا ہے۔

### تیزاب کی پیدائش کو روکنے والی ادویہ

جب سے لوگوں کے دل میں یہ خیال سایا ہے کہ تھنوں میں اسر کے پیدا کرنے میں حساسیت یا مسائل کا بھی ہاتھ ہے ماہرین نے ایسی ادویہ کی تحقیق مدقوں سے شروع کر دی ہے جس سے تیزاب کے پیدا ہونے کا عمل ختم ہو جائے۔ اس سلسلے میں CEMITIDINE کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور کنگ ایڈورڈ کالج میں پروفیسر مقصور چیمہ نے اس پر خصوصی تحقیقات کا بیڑہ اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ اس کے 20 mg کی دو گولیاں صبح شام کھانے سے 4-6 ہفتوں میں اسر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب دعوئی طب کی ثقہ کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے یہ واقعہ 2-3 سالوں میں بھی وقوع پذیر ہوتے نہیں دیکھا۔ یہ دوائی TAGAMET کے نام سے ملتی ہے جس کی 200 اور 400 ملی گرام گولیاں ہوتی ہیں۔ پھر اسی کو بنیاد بنا کر کیمیا دانوں نے متعدد نئی ادویہ تیار کیں جن کی اساس اسی کیمیاوی خاندان پر رہی ہے جس میں FAMOTIDINE اس کی گولیاں بازار میں 40mg PEPCIDINE کے نام سے ملتی ہیں ایک گولی 21 روپے کی ہے۔ مقدار اور خوراک ایک گولی ہر شام چھ ہفتے۔ بیماری کی شدت ختم ہونے پر رات کو آدھ گولی کافی ہوتی ہے۔

ٹھیکسو کمپنی نے ZANTAC (RAMITIDINE 150mg) بنائی جس کی گولیاں صبح شام دی جاتی ہیں۔ مرض کی شدت کم ہونے پر ایک گولی رات سوتے وقت دی جاتی ہے۔

حال ہی میں ایک نیا اضافہ ULSANIC (ALUMINUM SUCROSEES SULFATE 1 mg) کی شکل میں ہوا ہے۔ ان کا دھوئی بھی دوسروں کی طرح بیماریوں کو کسی مشکل کے بغیر 4-6 ہفتوں میں دور کر دینے کا ہے۔ ایک گولی صبح، دوپہر، سہ پہر رات (چار روزانہ) دی جاتی ہیں۔

السر کے خلاف اثر رکھنے والی یہ تمام دوائیں پیچیدہ کیمائی مرکبات ہیں جو جسم کے اندر جا کر جگر اور دوسری جسمانی رطوبتوں میں شامل ہو کر اعصاب پر اثر رکھتی ہیں۔ اس لئے ماں کے دودھ میں بھی ان کا اخراج ہو کر دودھ پینے والے بچوں پر ناخوشگوار اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ ہماری ذاتی رائے میں حاملہ اور دودھ پینے والی خواتین ان میں سے کوئی دوائی استعمال نہ کریں۔  
علاج کے دوران تمباکو نوشی سے مکمل اجتناب کیا جائے۔

### تشخیص

جب مریض درد والی جگہ کی پکی نشاندہی کرتے ہوئے اپنی انگلی رکھ کر بتا دے اور درد کو کھانا کھانے سے آرام جائے۔ بھوک ہو تو درد شروع ہو جائے قے سے آرام آجائے تو یہ تمام علامات معده کے السر کا پتہ دیتی ہیں۔

پہلے زمانہ کے لوگ پیٹ میں ریڑ کی ٹالی ڈال کر خالی پیٹ تیزاب نکال کر پھر گندم کا دلیا کھلا کر معده سے رطوبتیں نکال کر ان میں تیزاب کی مقدار اور اس کی ہضم کرنے کی صلاحیت کا جائزہ لیتے تھے۔ GASTRIC ANALYSIS کا یہ عمل تین گھنٹوں پر محیط ہوتا تھا اور جو اطلاعات میسر ہوتی تھیں ان کا مطلب صرف اتنا ہی ہوتا تھا کہ تیزابیت موجود ہے۔ اس ٹیسٹ کا السر کی موجودگی سے کوئی تعلق نہ تھا۔

BARIUM SULPHATE کی ایک معقول مقدار کھلا کر مریض کے متعدد ایکس رے کئے جاتے ہیں۔ پہلا ایکس رے پینے کے عمل کے دوران کیا جاتا ہے۔ دوسرے ایکس رے میں معده دیکھا جاتا ہے۔ آدھ گھنٹہ کے بعد کے ایکس رے سے پتہ چلتا ہے کہ معده کی اپنی شکل و صورت کیا ہے۔ اگر اس میں السر موجود ہے تو اس کے کوئے نظر آئیں گے۔ آدھ گھنٹہ کے بعد غذا معده سے نکل کر آنتوں کو جاتی ہے اس مرحلہ پر لی

مکئی تصویر سے معدہ سے اخراج کا عمل یا خارجی منہ پر رکاوٹ ہو تو واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وقفہ وقفہ سے لی گئی تصویریں آنتوں کی شکل و صورت ان میں غذا کے سفر اور وہاں پر پھیلاؤ یا رکاوٹ کا پتہ دیتی ہیں۔

چونکہ ایکس رے کی شعاعیں آنتوں اور معدہ سے گزر جاتی ہیں اس لئے ان کو شعاعوں کے لئے معدہ رنگین بنانے کے لئے بیروم پلایا جاتا ہے۔ اس عمل کو **BARIUM MEAL X-RAYS** کہتے ہیں۔

حالیٰ میں ٹیلی ویژن کیمرے کے اصول پر ایک چھوٹا سا کیمرہ لٹکایا ہوا ہے۔ مریض جب اس باریک سے کیمرے کو نگل لیتا ہے تو سکرین پر اس کے معدے کا اندرونی منظر براہ راست نظر آنے لگتا ہے۔ معائنہ کرنے والا معدہ اور اس کے ہر حصہ کو پورے اطمینان کے ساتھ دیکھ سکتا ہے پھر یہی کیمرہ چھوٹی آنت کے پہلے حصے تک دیکھ سکتا ہے یوں السر کی زد میں آنے والے تمام مقامات پوری صراحت سے دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس میں یہ بندوبست بھی موجود ہے کہ شبہ والے مقام یا زخم سے کھڑا کات کر مزید خوردبینی معائنہ کے لئے باہر نکال لیا جائے۔ **GASTROSCOPY** کا یہ عمل یقینی اور فیصلہ کن ہے۔ اس سے نہ صرف کہ السر کی تشخیص یقینی ہو جاتی ہے بلکہ کچھ عرصہ بعد مریض کی بہتری یا بدتری کا بھی پتہ چلایا جاسکتا ہے۔

بدقسمتی سے یہ مفید طریقہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ہر ہسپتال میں یہ آلہ موجود ہے۔ لیکن جن کے بس میں یہ ہے وہ اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں اور جب کرتے ہیں تو 1500 روپے فیس معائنہ لے کر کرتے ہیں اور اس فیس کو فیس نہیں ظلم کہا جاسکتا ہے۔

## طب نبوی

جدید کتابوں میں السر کے علاج کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے ان سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس بیماری کا صحیح سبب ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔

کیونکہ نمک کا تیزاب اور PEPSIN ہر جاندار کے معدہ میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن معدہ کی اندرونی دیواروں پر اس تیزاب کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ چند بد قسمت افراد ایسے ہیں جن کا تیزاب ان کی ہجلیوں کو گھانا شروع کر کے وہاں پر زخم پیدا کرتا ہے۔ اگرچہ اس بے راہ روی کی متعدد توجیحات میسر ہیں لیکن کہنے والے خود بھی مطمئن نہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے علاج کے لئے تیزاب کو کیمیائی طور پر بے اثر کر دینا یقیناً مسئلہ کامل نہیں۔ یہ تیزاب خوراک کے ہضم میں ایک اہم کردار رکھتا ہے۔ اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو ہاضمہ کا سارا فعل متاثر ہو جائے گا۔ معدہ کی دیواروں میں موجود غدودیں اس تیزاب کو پیدا کرتی ہیں۔ صرف موجود تیزاب کے ضائع کرنے سے بھی بات ختم نہیں ہوتی کیونکہ تیزاب پیدا کرنا غدودوں کا ایک فعل مسلسل ہے۔

تیزاب کو ختم کرنا ایک مستقل ضرورت بن جاتا ہے۔ اور اس طرح مریض کو دوائیں کھاتے رہنا پڑتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اصل سبب تلاش کر کے معدہ کی ہجلیوں کو پہلے کی طرح تیزاب سے محفوظ کر دیا جائے جو کہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا۔ تیزاب کی پیدائش کو روکنے کے لئے ہارمونز پر اثر رکھنے اور اعصاب کی حسیات کو کند کرنے والی ادویہ سے کچھ فائدہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن یہ فائدہ بڑی عجیب نوعیت کا ہوتا ہے۔ کیونکہ اعصاب پر اثر کرنے والی ادویہ جسم پر دوسرے کئی ناخوشگوار اثرات مرتب کرتی ہیں۔ خواتین میں ان کا استعمال بالخصوص زیادہ خطرات کا باعث ہو سکتا ہے۔

ہمارے یہاں کے لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ بیماریوں کا صحیح اور مکمل علاج صرف ولایت میں ہوتا ہے۔ جس کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ولایت جانے کی سوچتا ہے۔ اگر اتنی توفیق نہ ہو تو پھر اخبارات کے ذریعہ حکومت سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس کے علاج کا انتظام کرے۔

ایک صاحب کو گردے کی کچھ تکلیف تھی۔ انہوں نے اخبار میں اپنی ولایت کی رداغی کے لئے اپیل نکلائی۔ ایک روز وہی صاحب بازار میں



اجھے بھلے گھومتے نظر آ گئے۔

امر ایک تکلیف دینے والی لمبی بیماری ہے۔ جب کسی مریض کو کچھ آرام نہیں آتا تو وہ ولایت جانے کی اس امید پر سوچتا ہے کہ شاید وہاں ایسے رشک سیجا پائے جاتے ہیں کہ دنوں میں شفا یاب ہو جائیں گے۔

ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ معدہ کو اگر سرد کیا جائے تو اس سے امر غائب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ مقروضہ ہی حقیقت پر مبنی نہ تھا مگر انگلستان اور امریکہ میں سینکڑوں اشخاص کے پیڑوں میں ریز کی تالیوں سے ملا ایک بیک داخل کیا گیا جس میں ٹائو جن وغیرہ بھر کر معدہ کو اتنا ٹھنڈا کیا گیا کہ وہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا۔ پھر یہ سیال نکال کر آہستہ آہستہ زیادہ درجہ حرارت کا پانی ڈال کر اس میں دوبارہ گرمائش پیدا کی گئی۔ پہلے تو وہ ٹھنڈے معدہ کو بجھ گیا پھر آدھ ٹھنڈے میں اسے دوبارہ سے گرم پا زندہ کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ وجہ تو معلوم نہیں لیکن جس کسی کے معدہ کو اس سرد و گرم مرحلہ سے گزارا گیا اس کا امر ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔

امر کے انجام کی تصدیق تو ہم سے ممکن نہیں البتہ یہ جانتے ہیں کہ ایک زندہ مریض کا معدہ پتھر کیا گیا تو کتنی مرتبہ وہ واپس اپنی پرانی حالت پر نہ آسکا اور مریض کا معدہ آپریشن کر کے نکالنا پڑا جب کہ ایک مریض کو اس تجربہ میں ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا۔ سنا ہے کہ اب معدہ کو سرد گرم کرنے کا یہ ولایتی علاج بند ہو گیا ہے۔

ان ناخوشگوار حالات، غیر یقینی اور تکلیف دہ علاج کی موجودگی میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس مصیبت سے نجات کی کوئی معقول اور موثر ترکیب تلاش کی جائے۔ اور یہ ہندوستان طب نبوی کے علاوہ کسی اور علم میں موجود نہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت کی بیماریوں میں قلبیہ کی بے پناہ تفریق فرمائی ہے۔ جو کا دیا لے کر اس کو پیمے پانی میں پکایا جائے۔ پھر چند چمچے دودھ ملا کر اتار لیں۔ اس میں کھانڈ کی بجائے شہد ملایا جائے۔ حضور کا اپنا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ مریض کو دن بھر میں کئی بار گرم گرم دیا کھلاتے تھے۔ ہم نے محسوس کیا ہے کہ دیا صبح نہار منہ یا ناشتہ میں دیا تو اللہ کے فضل سے مطلوبہ نتائج حاصل ہوتے رہے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تعریف فرمائی انہوں نے اس کو زیادہ تر چھاتی کے مسائل میں استعمال فرمایا۔ لیکن ہندوستان میں ابتدائی ایام میں آنے والے ڈاکٹروں نے اسے اسہال اور پچیش میں بہت مفید پایا۔

بھارتی وید بھی کا شہرت استعمال کرتے ہیں۔ یونانی اطباء اس کے پھل کو خشک کر کے مریض کو روزانہ کھلاتے ہیں۔ ابن القیم نے ایک جگہ بھی کا مرہ نما شہرت بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ ان کے نسخہ کے مطابق بھی کا پھل لے کر اسے دھو کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لئے گئے۔ پھر ان کو تھوڑے سے پانی میں خوب پکا کر گھلایا گیا۔ جب یہ گل گئے تو چینی کی بجائے شہد ڈال کر مرہ کی مانند تار بندھنے تک پکایا گیا۔ بھی کا یہ مرہ پیٹ کے سر کے بعض مریضوں کو چند قتلے اور دو چار چمچ شیرہ کی شکل میں صبح نہار منہ اور عصر کے وقت کھلایا گیا۔ اکثر مریضوں کو اس کے علاوہ کسی اور دوائی کی ضرورت باقی نہ رہی۔ لیکن شقایابی ہر حال میں سو فیصدی رہی۔

بھارتی ماہر علم الادویہ ڈاکٹر گھوش نے اسے تل اور تیل پھل کے نام سے بیان کرتے ہوئے چیت کی ہر سوزش میں اکسیر قرار دیا ہے۔

ہمارے ایک مریض کو جب دوسری دواؤں سے فائدہ ہوتا نظر نہ آیا تو بھی کے خشک پھل کا سفوف شہد میں ملا کر دیا گیا۔ ان کو فوری سکون ہو گیا۔

زیتون کا تیل تیزابیت کو مارتا اور مھلیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بلکہ بعض عرب اطباء نے انہی اوصاف کی بناء پر اسے ”حافظہ الامین“ کا لقب بھی دیا ہے۔ یہ چیزوں کو گلنے نہیں دیتا۔ ڈیہ میں بند سارڈین مھلیاں پکانے کے بعد زیتون کے تیل میں ڈال کر بیک کی جاتی ہیں۔ نرم گوشت ہونے کے باوجود یہ دو تین سال تک نہ تو خراب ہوتی ہیں اور نہ ہی بدبو چھوڑتی ہیں۔ جاپان کے بعض ڈاکٹر معدہ اور انتڑیوں کے سرطان کے مریضوں کو خشک انجیر کھلاتے اور زیتون کا تیل پلاتے ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس لاعلاج بیماری میں زیتون کے تیل کے حیات آفرین اثرات دیکھے گئے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید نے اسے افادت اور اہمیت کا ایک لاجواب سرٹیفکیٹ مرحمت فرمایا ہے۔

یوفد من شجرة مبارک من زیتونہ (النور: 35)

(اسے زیتون کے مبارک درخت سے توتائی حاصل ہوتی ہے)  
سورۃ النحل میں اچھے درختوں کے ذکر میں زیتون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ  
(ان میں اچھی اور شاندار عفات جمع کر دی گئی ہیں تاکہ لوگ  
سمجھدار لوگ) ان سے فائدہ اٹھائیں)

سورۃ المؤمنین میں صحرائے سینا میں پیدا ہونے والے درخت زیتون سے حاصل  
ہونے والے تیل کو خوراک کا بہترین جزو قرار دیا گیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کردہ دواؤں کو ہمیشہ خالی پیٹ دینا چاہئے۔ انہوں  
نے کھجور اور بکی کے بارے میں نمار منہ کھانے کی تائید فرمائی۔ جب کہ وہ شہد کا  
مشروب صبح کی نماز کے ساتھ یا عصر کی نماز کے بعد نوش فرمایا کرتے تھے۔

حضور اکرمؐ کی عطا کردہ اکثر ادویہ بنیادی طور پر انسانی غذا کا حصہ ہیں۔ اگر ان کو  
عام خوراک کی صورت میں کھایا جائے تو وہ غذا ہیں۔ خالی پیٹ کھائیں تو وہ دوا ہیں۔  
جیسے کہ اگر زیتون کے تیل میں سالن پکا لیا جائے تو تیل آنتوں میں ضرور گیا۔ مگر  
صورت یہ ہوئی کہ روٹی 'سالن' پانی کی مقدار جمع کر کے اس میں دو اونس تیل کا  
حساب کریں تو کل حجم کے چالیسویں حصہ سے زیادہ نہ ہو گا۔ اس مرکب مفلوبہ میں یہ  
چالیسواں حصہ آنتوں پر کوئی خاص اثر نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے برعکس اگر خالی پیٹ  
تیل یا جائے تو یہ معدہ کے زخموں پر دوا کی طرح لگے گا۔ یہ تیزابیت کو زائل کرے  
گا پھر آنتوں میں جائے گا تو آنتوں کے زخم مندمل کرے گا۔ جب کہ دوسری چیزوں  
میں ملنے کے بعد اس سے یہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔

کچھ مریضوں پر طویل مشاہدات کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی مریض  
کو اگر کسی قسم کی کوئی دوائی نہ بھی جائے اور وہ صرف نمار منہ اور رات سوتے وقت  
2 ہوسے چمچے زیتون کا تیل پیتا رہے تو اس مریض میں بلکہ آنتوں کی دق اور COLITIS  
ULCERATIVE ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان تمام تحائف نبویہ کو سامنے رکھتے ہوئے  
ہم نے اگر کسی ایک عام مریض کے لئے یوں نسخہ لکھا

- 1- نمار منہ پڑا چھ شہد اور عصر کے وقت 2 چھ شہد ابلے پانی میں۔
- 2- ناشتہ میں جو کا دلیا شہد ڈال کر  
(یہ دلیا پہلے پانی میں پکایا جائے پھر دودھ ڈال کر اتار لیں اور کھانڈ کی جگہ شہد ڈالا جائے)

- 3- 11 بجے دن اور رات سوتے وقت 2 بڑے چھ زیتون کا تیل  
(کیفیت بہتر ہونے پر ایک مرتبہ دو چھ دینا بھی کافی ہوتا ہے۔ تیل اٹلی کا اگر نہ ملے تو  
ترکی اور یونان کا بھی ٹھیک ہے۔ مگر بہن کا بہر حال نہ ہو)

4- کلونچی	60 گرام
برگ کاسنی	15 گرام
برگ مندلی	10 گرام
تھ شیریں	10 گرام
ملہ (بٹنی کے بیج)	5 گرام

ان تمام چیزوں کو ملا کر پیس کر اس مرکب کا ایک چھوٹا بیج صبح، شام کھانے کے بعد دیا جاتا ہے۔

اس نسخہ میں کلونچی پیسہ کے امراض میں قیمتی اور موثر دوائی ہونے کے علاوہ  
حضرت ابو ہریرہؓ نے یوں بیان فرمایا ہے۔

انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول في الحبث  
السوداء شفاء من كل داء الا السام والاسام الموت والحبث  
السوداء الشونيز

(بخاری، مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد)

(انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ان کالے  
دانوں میں بھی بیماریوں سے شفا ہے۔ سوائے سام کے۔ جو کہ موت ہے۔  
اور یہ کالے دانے اصل میں شونیز ہیں)

یہ بات اس ایک روایت میں نہیں بلکہ اسی مضمون اور اسی موضوع پر حضرت

۱۔ ائمہ: حضرت سالم بن عبداللہؓ، حضرت بریدؓ سے ابن الجوزی، ترمذی، مسلم، مسند احمد، بخاری، ابن ماجہ نے اسے مختلف ذرائع سے نقل کیا ہے کہ بات میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ابن ابی عقیق نے اسے زینون ملا کر تاک کی بیماریوں میں مفید قرار دیا۔ امام زہبیؒ کہتے ہیں کہ جمعہ کے کسی حصے میں کسی بھی وجہ سے سہو پڑ جائے وہ کلو نجی سے کھل جاتا ہے۔

جسم کی قوت مدافعت بڑھانے اور AIDS کے علاج میں کلو نجی کو مفید پایا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاسنی کو اہمیت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

عليكم بالسنداء فانما من يوم الا وهو يقطر عليه من قطر الجنة

(تمہارے لئے کاسنی موجود ہے۔ یہ ایک ایسا پودا ہے جس پر ہر روز جنت کے پانی کے قطرے گرتے ہیں)

اس حدیث کے مضمون کو متعدد ذرائع سے تائید حاصل ہے۔ جس پودے پر جنت کے پانی کے قطرے روزانہ گرائے جاتے ہیں اس کا شفا بار ہونا ایک لازمی حقیقت ہے۔ قیمتی اور مندی کے بارے میں بھی تعریف کے درجنوں ارشادات نبویؐ موجود ہیں۔

ہمارے اس نسخہ کے ہر حصہ میں ہر جزو کو فردا "فردا" تائید رسالت حاصل ہے اور اس کا مفید ہونا ایک لازمی حقیقت ہے۔ اس میں کاسنی کو یہ اضافی فضیلت حاصل ہے کہ وہ منہ یا پیٹ میں جس جگہ سے بھی خون بہہ رہا ہو اس کو بند کرتی اور زخموں کو مندیں کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حان رہے تو دنیا کی کسی بھی طب کا کوئی نسخہ یا علاج نہ تو اس سے زیادہ موثر ہو سکتا ہے اور نہ اس سے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ جب کہ اس ذات پاک کی عنایت سے ہمیں کبھی ناکامی نہیں ہوتی۔

## معدہ کا کینسر

### CANCER STOMACH

معدہ کا سرطان یا کینسر نظام انہضام کا سب سے زیادہ ہونے والا کینسر ہے۔ اس بیماری کو اپنے لئے زیادہ طور معدہ ہی پسند ہے اگرچہ کینسر جسم کے کسی بھی حصہ میں ہو سکتا ہے۔ لیکن معدہ کا کینسر اپنی جغرافیائی تقسیم کی وجہ سے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ یہ جاپان میں ہوتا ہے اور اس کے برعکس امریکہ میں برائے نام ہے یا بالکل نہیں ہوتا۔ حیرت کی بات یہ کہ وہ جاپانی جو اپنا ملک چھوڑ کر امریکہ میں بس گئے ہیں ان میں یا ان کی اولاد میں بھی اس کی شرح امریکیوں کی طرح برائے نام ہو جاتی ہے۔ اگر معاملہ وراثت کا ہے تو ان کو دنیا کے کسی بھی حصے میں متاثر ہو جانا چاہئے تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق وہاں کی خوراک کے اجزاء یا سبب ہوا ہے۔ جن میں امریکی ماحول سے تبدیلی آگئی۔

اب یہ بات پایہ ثبوت تک آگئی ہے کہ بعض کیمیائی عناصر جب کھائے یا لگائے جائیں تو ان کا ذوب استعمال کینسر پیدا کر سکتا ہے۔ جیسے کہ تارکون اور اس سے حاصل والے کیمیائی مرکبات اور رنگ۔ معدہ کے کینسر کے بارے میں تازہ ترین انکشاف یہ ہوا ہے کہ ذبوں میں یا پیچ بستہ مخزن میں غذا کو محفوظ کرنے کے لئے قلمی شورہ یا اس سے حاصل ہونے والے NITRATES استعمال ہوتے ہیں۔ معدہ میں جا کر یہ ایک ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں جن کو جانوروں کے جسم میں تجرباتی طور پر کینسر کو پیدا کرتے دیکھا گیا ہے۔

خون کی کمی کی بدترین قسم PERNICIOUS ANAEMIA کے مریضوں کو

اس کینسر کا اندیشہ دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ معدہ میں مزمن سوزش کی وجہ سے جب ساخت متاثر ہوتی ہے یہ عمل کینسر کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ یہ کیفیت عام طور پر 55-65 سال کی عمر کے درمیان کے مردوں کو ہوتی ہے۔ عورتیں نسبتاً محفوظ ہیں۔ جن کے خون کا گروپ A ہو ان کے متاثر ہونے کا امکان زیادہ ہے۔

### علامات

کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ اور جنن خاص طور پر مرغی غذا کے بعد مٹکی اور تے۔ بعض کھانوں خاص طور پر گوشت سے نفرت، تے یا پانڈہ میں خون کی "میزش" چھاتی کے سامنے کی طرف بوجھ یا ٹھنسن، شک خوراک کو نگھنے کے دوران کھانسی، اسہال، پیٹ میں گولہ، وزن اور طاقت میں کمی، خون کی کمی کے ساتھ چرے پر زردی اور مروٹی چھائی رہتی ہے۔

بیماری جب بڑھتی ہے تو جگر اور آس پاس کی چیزوں کو پیت میں لیتی ہے۔ اس وقت پیٹ میں پانی پڑنے لگتا ہے۔ چرے اور جسم پر برقان ظاہر ہوتا ہے۔ بار بار سانس چڑھتی اور دس کا دایاں حصہ پھیل جاتا ہے۔

بڑی عمر کے کسی مریض کو اگر مسلسل بد بعضی رہتی ہو تو اس کے بارے میں مزید تحقیقات کرنا زیادہ اچھی بات ہے بہ نسبت اس کے کہ کچھ عرصہ بعد یہ معلوم ہو کہ کینسر اتنا پھیل چکا ہے کہ اب علاج ممکن نہیں رہا۔

### تشخیص

اس کی اکثر ابتدائی علامات اتنی معمول ہوتی ہیں کہ مریض ان کے لئے کسی تجربہ کار علاج کے پاس جانا ضروری نہیں سمجھتا۔

BARIUM XRAY کے ذریعہ اکثر کینسر دیکھے جاسکتے ہیں۔

GASTROSCOPY ٹی وی وین کیمرہ کے اس آلہ کو مریض نگل لیتا ہے اور یہ معدہ کے ہر حصہ کو اچھی طرح دکھا دیتا ہے۔ اس طرح ایک تجربہ کار ماہر بھلیوں میں

ہونے والی تبدیلیوں سے کینسر کی تشخیص کر سکتا ہے۔ ضرورت پڑنے یا شبہ کی صورت میں اس میں ایسا بندوبست موجود ہے کہ مشتبہ حصہ کا ٹکڑا کاٹ کر باہر نکال کر اس کا خوردبینی معائنہ کروا لیا جائے۔ جس سے تشخیص یقینی ہو جاتی ہے۔

GASTROSCOPE کے ذریعہ معدہ کے معائنہ کے بعد ایک مریض کے جسم سے ایک ٹکڑا نکال کر BIOSPY کے لئے پروفیسر غلام رسول قریشی کے پاس بھیجا گیا۔ انہوں نے ازراہ عنایت اپنے مشاہدہ کی رپورٹ کی نقل ہمیں بھی مرحمت فرمائی وہ یہ ہے:

The Specime shows thickened walls. The rugosal pattern is prominent.

There is an ulcer with raised margins, which are rolled.

The base of the ulcer is shaggy.

## HISTOLOGY

Malignant Epithelial Cells are present. These cells show signet appearance. The cells are found invading muscles.

This is a case of ADENO CARCINOMA STOMACH.

اس رپورٹ کے مطابق یہ ADENO CARCINOMA ہے۔ جب کہ معدہ میں ہونے والے کینسر متعدد اقسام کے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ULCERATIVE -POLYPOID-INFILTRATING جب کہ بعض اوقات POLYPOID کے ساتھ ہی السر بھی موجود ہوتا ہے۔ پروفیسر قریشی نے جس مریض کو دیکھا وہ مرکب قسم کا تھا مگر اس کے السر کی ہیئت کینسر کی ہی تھی۔ پانخانہ میں کینسر کے خٹکے بھی دیکھنے میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانخانہ میں نیم ہضم شدہ سیاہ خون موجود ہوتا ہو تو اس سے کینسر کی تصدیق ہو جاتی ہے۔



کینسر کے علاج میں انقلابی تبدیلیوں کے باوجود معدہ کے کینسر کے علاج میں بچنے چالیس سالوں میں کوئی قابل ذکر کمال نہیں ہو سکا۔ اس کا بہترین علاج آپریشن ہے جب کہ 33 فیصدی مریض ایسے ہیں جن کا پیٹ کھولنے کے بعد آپریشن کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے جب کہ 67 فیصدی کا آپریشن ضرور ہوتا ہے لیکن متاثرہ حصہ کٹ کر نکالا نہیں جاسکتا۔ جن کا آپریشن کامیاب ہوا اور معدہ نکال بھی دیا گیا ان میں سے صرف 20 فیصدی پانچ سال کے بعد زندہ پائے گئے۔ یعنی کامیاب آپریشن کے باوجود 80 فیصدی مریض ایک دو سال میں مر جاتے ہیں۔

کینسر کے خلاف اثر رکھنے والی دواؤں سے علاج میں کچھ امید پیدا ہوئی ہے۔ لیکن ان سے کہاں تک کامیابی ہوئی اس کا بیان ابھی ممکن نہیں۔ اس بیماری کا جلد پتہ چلا لینا اور جلد از جلد آپریشن کر دینے سے ہی مریض کی جان بچانے کا کوئی امکان موجود ہے۔ ورنہ طب جدید اس کے علاج میں دوسرے مقامات پر ہونے والے کینسر کی طرح ابھی تک معذور ہے۔

## طب نبوی

آنٹوں کے سرطان کے سلسلہ میں اس کا جو علاج مذکور ہے معمولی تبدیلی کے ساتھ معدہ کے سرطان میں بھی مفید رہتا ہے مریض کو ناشتہ میں جو کا دلیا شدہ ڈال کر ضرور دیا جائے۔ اگر خون آ رہا ہے تو لعاب بھی دانہ اور شدہ کے علاوہ نسخہ میں مندی کے پتے بھی شامل کئے جائیں۔ زخموں کو بھرنے میں مندی کے پتے افادیت میں لاجواب ہیں۔ پاخانہ میں سیاہ خون OCCULT BLOOD کی موجودگی بھی مندی کی طلبکار ہے۔ ہر خوراک میں نصف گرام مندی کے پتے کافی رہتے ہیں۔ اطباء قدیم مندی کا جو شاندار تجویز کرتے رہے ہیں۔

کینسر خواہ کسی جگہ ہو قسط شیریں اور کلونچی اس کا بہترین علاج ہیں۔ چونکہ یہاں خراش اور متلی زیادہ ہوتی ہے اس لئے قسط کی زیادہ مقدار نہ دی جائے۔

## التهاب معدہ و امعاء GASTRO-ENTERITIS

گرم علاقوں میں موسم گرما میں آنتوں میں سوزش ہو جانا ایک روزمرہ کی بات ہے اور کبھی کبھار تو اچھی خاصی تعداد اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں اس کیفیت کا اظہار تھوڑے اور اسہال یا اس کے ساتھ بخار کی صورت میں ہوتا ہے۔ 'پچش' اسہال، بیضہ حتیٰ کہ تپ محرقہ بھی آنتوں کی سوزش کے مختلف رنگ ہیں۔ لاہور میں ہر سال اپریل سے شروع ہو کر اکتوبر تک روزانہ درجنوں کے حساب سے لوگ اسہال اور آنتوں کی سوزش کی مختلف شکلوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جس کا عمومی سبب کھیاں قرار دیا جاتا ہے۔ بڑے شہروں میں جہاں پینے کا پانی ٹالیوں کے ذریعہ آتا ہے اور تھیں کیا جاتا ہے کہ شہریوں کو یہ پانی کرنے سے پہلے اس پانی میں جراثیم مارنے والی دوائیں شامل کی جاتی ہیں اس لئے یہ پانی عام طور پر بیماریاں پیدا کرنے کا باعث نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے برعکس ہینڈ پمپ اور کنوئیں یا تالاب کا پانی پینے کی بیماریوں کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اب یہ امر مسلّم ہے کہ آلودہ پانی پینے سے پیٹ کی عام سوزشوں کے علاوہ پیٹ میں کیڑے اور برقان ہو سکتے ہیں لیکن جب یہ بیماریاں پانی کی وجہ سے ہوں تو ایسے پانی کو پینے والے سینکڑوں افراد بیک وقت مبتلا ہوتے اور وباء کی صورت بن جاتی ہے۔

راوی، روڈ لاہور پر گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کے پاس گوردوت بھون کی آبادی میں ایک مرتبہ آنتوں کی سوزش وبائی صورت میں پھیل گئی۔ اس

علاقہ میں کھیلوں کو ختم کرنے کی اتنی شاندار کوشش کی گئی کہ گز کے ڈھیلے کو میز پر رکھ کر دیکھا گیا۔ ایک ٹھنڈے میں ایک بھی کبھی اس پر نہ آئی۔ لیکن لوگ بیمار ہوتے گئے تین دن میں 45 افراد ہسپتال میں داخل ہوئے۔ مزید تحقیقات پر معلوم ہوا کہ آبادی کے لوگ درمیان میں واقع کنوئیں کا پانی پیتے ہیں۔ اس کنوئیں کو بند کر کے وہاں پر پینے کے لئے صاف پانی کا بندوبست کیا گیا تو بیماری ختم ہو گئی۔

1945ء میں ہروداد میں ہندوؤں نے کسمہ کا میلہ منایا۔ یاترا کے بعد واپس آنے والے اپنے ساتھ گنگا کا پانی "گنگا جی" کنستروں میں لے کر آئے۔ جس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں ہیضہ پھیل گیا۔ گورنر پنجاب نے سارے صوبہ میں امرود اور ناشپاتی کی فروخت پر پابندی لگا دی۔ پھلوں کے باغ تباہ ہو گئے لیکن ہیضہ گنگا کے پانی سے پھیلتا رہا۔

1950ء میں لنگے منڈی لاہور سے کشمیری بازار کو جانے والے پانی کے تنوں میں کسی ذریعہ سے غلاحت کے ساتھ تپ محرقہ کے جراثیم داخل ہو گئے۔ جس کے نتیجہ میں چوک مرجن سنگھ سے کشمیری بازار تک ایک قطار میں ہزاروں لوگ تپ محرقہ کا شکار ہو گئے۔

دعوات میں لوگ ایسے جوہڑوں کا پانی پیتے ہیں جن میں جانور نماتے ہیں۔ گاؤں کی غلاحت شامل ہوتی ہے۔ عورتیں کپڑے دھوتی ہیں اور ان کو باہر سے دیکھنے پر بھی جھاگ اور بلبلے نظر آتے ہیں۔ بچہ کے رنگ کا یہ پانی ہمیشہ ہیٹ کی بیماریوں کا باعث ہوتا ہے۔ دریائے گنگا کی پوری گزرگاہ اور مشرقی پاکستان میں لوگ گھروں کے ساتھ جتنے ہوئے برساتی اور سیلابی پانی کے جوہڑوں میں مچھلیاں پالتے ہیں اور اسی پانی کو پیتے ہیں۔ اس لئے وہاں سارا سال ہیضہ پھیلا رہتا ہے۔

1960ء میں عالمی ادارہ صحت جنوب مشرقی ایشیاء میں ہیضہ کے خلاف تحقیقاتی مرکز قائم کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے بھرپور کوشش کی اور اس ادارہ میں اپنے ذاتی تعلقات کو کام میں لاتے ہوئے چاہا کہ یہ مرکز لاہور میں بنے۔ جب یہ طے ہو گیا کہ مرکز

پاکستان میں ہو گا تو اس وقت کی حکومت نے یہ مرکز لاہور کی بجائے ڈھاکہ میں بنوانا پسند کیا۔ حالات نے اسے ہمارے بس سے باہر کر دیا۔ اسی مرکز میں پہلا اہم کام یہ انجام پایا کہ نیکہ لگانے سے ہیضہ سے بچاؤ نہیں ہوتا۔

آنتوں کی ان سوزشوں کے پھیلاؤ کا دوسرا اہم ذریعہ کھیاں ہیں۔ اسطوائی ملکوں میں گرمی کے موسم میں جب ہوا میں نمی زیادہ ہو تو غلاعت کے ذمہروں پر کھپیوں کی افزائش کے لئے حالات سازگار ہوتے ہیں۔ ان کی پیدائش مندگی میں ہوتی ہے اور یہی ان کی غذا یا ممکن رہتا ہے۔ کبھی جب فضلے، مریض کے زخموں یا کسی کی تے سے اٹھ کر مٹنے کے بیٹے یا مٹھائی کے قحل پر بیٹھتی ہے تو اپنے پروں اور پیروں سے چپکے ہوئے جراثیم وہاں چھوڑ جاتی ہے اور اس طرح بیماروں کے اجسام سے خارج ہونے والے جراثیم تندرست افراد کی خوراک میں شامل ہو کر بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں۔

### آنتوں کی بیماریوں کے اسباب

جراثیم کے جسم میں داخل ہونے کے بعد بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ماہرین علم الجراثیم اور وبائیات نے لاکھوں مریضوں پر کئے گئے مشاہدات کے بعد معلوم کیا ہے کہ ہیضہ اور آنتوں میں واقع ہونے والی سوزشوں کے جراثیم متعدد اقسام کے ہوتے ہیں۔ اور ہر قسم سے پیدا ہونے والی علامات دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں۔ تحقیقات پر جراثیم کی کچھ قسمیں ایسی معلوم ہوئی ہیں جو یہ بیماریاں عام طور پر پیدا کرتی ہیں ان قسموں کے عمومی نام SCHIGELLA - ESCHERECHIA - PROTEUS SALMONELLA - KLEBSIELLA جراثیم ہیں۔

ان جراثیم کو لیبارٹری میں دودھ سے حاصل ہونے والی مٹھاس یعنی LACTOSE کے ساتھ ملا کر تھوڑی دیر رکھا جاتا ہے۔ اگر اس میں سرائند اور میس پیدا کر دیں تو اس سے مراد لی جاتی ہے کہ جسم انسانی میں جا کر بھی بیماری پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جسم خصوصی طور پر دفاعی انتظامات کرتا ہے جیسا کہ تپ عرقہ کی صورت میں خون کے اندر ایسے جوہر پیدا ہو جاتے ہیں جو جراثیم کو ختم کرتے

ہیں۔ اس لئے تپ محرقہ کے مریض کے خون کا اگر WIDAL TEST کیا جائے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کو چھنے والا بخار کونسا ہے؟

عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ جراثیم کش ادویہ کے ذریعہ جراثیم کو ہلاک کیا جاسکتا ہے لیکن آنتوں میں ہونے والی بعض بیماریوں کی صورت میں یہ مفروضہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ کیونکہ PSEUDOMONAS ACRUGINOSA کی نوعیت کے جراثیم ایسے ذمیت ہیں کہ کسی بھی جراثیم کش دوا کی کی بوتل کے اندر اپنی افزائش کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہسپتالوں میں علاج کے دوران مریضوں کو نئی بیماریوں کا شکار ہونا پڑتا ہے اور ان بیماریوں پر عام جراثیم کش ادویہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لئے ہم مختلف جراثیم سے پیدا ہونے والی سوزشوں کو اسباب کی مناسبت سے علیحدہ علیحدہ بیان کرنا پسند کر رہے ہیں۔

## SALMONELLA INFECTIONS

اس خاندان کے جراثیم سے پیدا ہونے والی اہم ترین بیماری تپ محرقہ ہے۔ جو کہ ابتدائی طور پر آنتوں کی سوزش ہے مگر اس کے اثرات تمام جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس سوزش سے آنتوں میں زخم ہوتے ہیں اور یہ آنت میں آہوار سوراخ ڈال کر موت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی عنوان تلے FOOD POISONING بھی آجاتی ہے۔ جو بند ذہنوں کی غذا اور جراثیم کی زہروں سے پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کا کوئی بھی علاج اب تک معلوم نہیں ہو سکا لیکن شرح اموات کم ہے۔ انسانوں کے علاوہ یہ بیماریاں جانوروں میں بھی ہوتی ہیں جن میں خاص طور پر سوروں میں HOG CHOLERA گھریلو جانور، مویشی، مرغیاں، رینگنے والے جانور حتیٰ کہ کچھ ابھی متاثر ہو سکتا ہے۔ 1970ء میں جنوبی امریکہ سے آنے والے کتوں اور مرغیوں کی خوراک میں یہ جراثیم داخل ہو گئے اور امریکہ کی مرغیوں میں یہ وبا پھوٹ پڑی۔ اسی طرح 1971ء میں برطانیہ میں ترکی پرندوں میں یہ وبا باہر سے آنے والی غذا کے ذریعہ پھیل گئی تھی۔ جس کے نتیجہ میں یہ کھانے والوں میں پھیل گئی۔

جراثیم کی اکثر قسمیں پکانے سے مر جاتی ہیں۔ خاص طور پر پاکستانی انداز میں پکایا

جانے والا کھانا چونکہ ڈھکنے والے برتن میں دیر تک پکنا رہتا ہے اس لئے اکثر جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن فریج میں جب پکا ہوا کھانا کچے گوشت کے قریب رکھا ہوا ہو تو یہ گوشت اگر آلودہ ہو تو اس کے جراثیم کچے ہوئے کھانے میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ جن مقامات پر اجتماعی کھانا پکنا ہے وہاں پر ایسی وباؤں کے پھیلنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔

اردو بازار لاہور میں ایک شادی پر خاندان ہی کے چند اصحاب مدعو تھے۔ ولیمہ کے کھانے کے بعد دولہا اور دلہن سمیت تمام شرکاء آہستہ آہستہ سوزش کا شکار ہو گئے اور حالت اتنی خراب تھی کہ ان سب کو کچھ دنوں ہسپتال میں رہنا پڑا۔

یہ جراثیم سخت جانی کے باوجود پیٹ کے تیزاب میں جا کر مر جاتے ہیں۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ پیٹھ کی دبا کے دنوں میں خالی پیٹ گھر سے نہ نکلیں اور کھانے کے ساتھ سرکہ استعمال کریں۔ کیونکہ سرکہ کا تیزاب ان کو مار دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی باعث سرکہ کو اہمیت عطا فرمائی۔ حضرت جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا۔

نعم الا دَامَ الْخَل (مسلم، ابن ماجہ)

(سرکہ بہترین سالن ہے)

یہی روایت حضرت عائشہؓ سے ابن ماجہ نے بیان کی ہے۔

گھروں میں اس کی موجودگی کی ضرورت کا اظہار حضرت ام ہانیؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں۔

مَا أَقْرَبَتْ مِنْ أَدَمَ لِيهِ خَل (ترمذی)

(جس گھر میں سرکہ کھلایا جاتا ہو وہ لوگ کبھی غریب نہیں ہوتے)

اس کا مطلب ظاہر ہے کہ سرکہ کھانے سے تندرستی قائم رہتی ہے۔

علامات

مریض کے جسم میں جراثیم کی جتنی مقدار داخل ہو علامات کی شدت ان کی

مناسبت سے ہوتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جراثیم کی مقدار اتنی کم ہو کہ علامات تصور پذیر نہ ہوں یا جسم کی اپنی قوت مدافعت ان کو ہلاک کر دے۔ تپ محرکہ سے بچاؤ کے ٹیکہ کی کسی زمانے میں بڑی شہرت رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہماری ذاتی نگرانی میں قابل اعتماد اور اچھی ویکسین کے ٹیکے لگے تھے۔ انہی کے تپ محرکہ کا علاج بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ جراثیم کے جسم میں داخل ہونے کے 48 - 6 گھنٹوں میں علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ جن میں اہم ترین 'مٹی' تے، 'اسہال'، 'سبے قراری'، 'سر درد'، 'بخار'، 'بلند پریش میں کمی'، 'گھبراہٹ'، 'پیشاب میں رکاوٹ' اور 'جسم میں اینٹھن' اور درد ہیں۔ 'خونی اسہال'، 'جوڑوں میں درد' اور 'سوجن' بعد میں 'عمر دے متورم' ہو جاتے ہیں۔ پتے میں سوزش ہو کر عمر بھر کے لئے پتے کی بیماری 'دل کی سوزش' (ENDOCARDITIS) اور نمونیہ بھی ہو سکتے ہیں۔

علاج اگر مکمل نہ ہو تو تندرست ہونے کے باوجود جسم سے جراثیم 6-8 ہفتوں تک خارج ہوتے رہتے ہیں۔ اس کیفیت کو CARRIERS کہتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ خود بیمار نہیں ہوتے لیکن دوسروں کو کرتے رہتے ہیں۔

امریکہ کے ایک چھوٹے شہر میں نو عمر بچوں میں تپ محرکہ کی وبا پھوٹ پڑی۔ تحقیقات پر معلوم ہوا کہ یہ بچے آئس کریم شوق سے کھاتے تھے۔ پھر پتہ چلا کہ ان بچوں نے جس دوکان سے آئس کریم لی اس کا ایک کاریگر تپ محرکہ کا CARRIER تھا۔ اس کے جسم سے تپ محرکہ کے جراثیم خارج ہوتے رہتے تھے جو اس کے ہاتھوں کو لگ کر آئس کریم میں داخل ہو کر دوسروں کو بیمار کرتے تھے۔

اس مصیبت کا سب سے مکمل اور جامع حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔

○ رفع حاجت اور طہارت کھانے پینے کے مقامات اور پینے والے پانی کے ذخیروں سے دور ہونی چاہئیں۔

○ طہارت کے بعد ہاتھوں کو پھر سے اچھی طرح دھویا جائے اور ناخن کاٹ کر رکھے جائیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے ماہر ہیں جنہوں نے رفع حاجت کے بعد جسم کو معفا پانی سے اچھی طرح صاف کرنے کی تلقین فرمائی اور یہ نہایت مفید عادت مسلمانوں کا طرہ امتیاز ہے۔ چنسی بیماریوں کی روک تھام کے سلسلہ میں اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کاسلی آلات کو دھونے سے ان میں سوزش ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پانی سے دھونا بواسیر کے پتے ہوئے خون کو بند کرنے میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ جب کہ اقوام مغرب میں طہارت میں پانی کی بجائے کانڈ کے استعمال سے ہیٹ کی بیماریاں ایک سے دوسروں کو لگتی ہیں۔ کیونکہ کانڈ سے صاف کرنے کے دوران ہاتھوں کو نجاست کا لٹنا ایک لازمی نتیجہ ہے اور ایسا شخص جب کھانے پینے کی کسی چیز کو ہاتھ لگائے گا تو اپنے جراثیم دوسروں کو تقسیم کرتا رہے گا اور لمبے ناخن بھی اس سلسلہ میں دوسروں کے لئے خطرے کا باعث ہیں۔ روزمرہ کے کام کاج کے دوران میل اور غلاحت ناخنوں میں چھن جاتے ہیں۔ ظہور اسلام سے قبل ہی نہیں بلکہ اٹھارویں صدی تک مشرقی ممالک میں ناخن کاٹنے یا ان کو صاف کرنے کا کوئی رواج نہ تھا۔ راہبوں کے ناخن بڑھتے بڑھتے پنجل کے پنجل کی طرح ہو جاتے تھے وہ ایسے غلیظ مظاہروں پر فخر کرتے تھے۔ آج بھی دیہاتی امراض سے بچاؤ کی کتابوں اور مشاہدات میں ناخنوں کا ذکر شاندار درجی ملتا ہے۔ حالانکہ رفع حاجت کے بعد غلاحت بڑھے ہوئے ناخنوں میں داخل ہو کر خطرے کا مستحق اندیشہ بنی رہتی ہے۔

### علاج

بیماریوں کی روک تھام کے اسلامی نظام کو سامنے رکھیں تو ان میں سے کوئی بھی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی۔



## جدید علاج

اس نوعیت کی تمام بیماریوں میں زیادہ تر علاج علامات کو دور کرنے سے کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اسہال اور تھکے سے جسم سے شکایات اور پانی کی اخراج کی کمی کو دور کرنے کے لئے ORS کا محلول بنا کر مریض کو مسلسل پلایا جائے۔ امراض شکم کے اکثر ماہرین اب صرف اسی محلول پر گزارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مشہور مغرب ان آسان اجزاء پر مشتمل ہے۔

SODIUM CHLORIDE 3.5 mg

TRISODIUM CITRATE 2.9 gm

POTASSIUM CHLORIDE 1.5 gm

GLUCOSE 20.0 gm

اس نسخہ میں اب تک TRISODIUM CITRATE کی جگہ سوڈا پانی کا رب والا جاتا تھا۔ جسے گرم کیا جائے تو وہ زہریلا بن جاتا تھا۔

ORS کے ایک پکٹ کو ایک سیر (لیٹر) پانی میں حل کر کے مریض کو ایک ایک چمچ کر کے سارا دن پلاتے رہتے ہیں۔ ہر اجابت یا تھکے کے بعد اتنی ہی مقدار میں پانی آہستہ آہستہ جسم میں داخل کیا جانا چاہئے۔

جدید جراثیم کش ادویہ میں SEPTRAN- TETRACYCLIN کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا دوا مفید ہوتا ہے۔

تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ ان میں سے اکثر ادویہ بے کار ثابت ہوئی ہیں۔ تپ عرقہ میں CHLORAMPHENICOL اور کسی حد تک ایچ پی سلین کے علاوہ کوئی دوائی موثر نہیں ہوتی۔ لیکن اول الذکر کا زیادہ دنوں تک دینا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس کا طویل استعمال جسم میں خون کی پیدائش کو روک سکتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کا علاج ابھی تک ممکن نہیں۔ جراثیم کی سخت کوشی کا تقاضا یہ ہے کہ علامات ختم ہونے کے بعد بھی دو ہفتہ تک دوائی دی جائے۔ عام طور

پر کلوروماکسین کے 250mg کے دو کیپسول 'صبح' 'دوپر' شام کھانے کے بعد دیئے جاتے ہیں۔ پانچ دن کے بعد دوا کی مقدار کم کرنا دستور ہے۔ ایسی سلین کی اسی مقدار کو زیادہ دن تک دیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یقینی ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ہسپتال سے بنتی ہے۔ اس لئے اکثر لوگوں کو اس سے حساسیت بلکہ دمہ تک ہو سکتا ہے۔ اس خاندان کے جراثیم سے پیدا ہونے والی سوزشوں کے جدید علاج میں عام طور پر علامات توجہ دی جاتی ہے جیسے کہ پانی کی کمی کو ORS سے دور کیا جائے اور اگر منہ کے راستے قے کی شدت کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو ورید میں ڈرپ کے ذریعہ دیئے۔

حال ہی میں ایک محفوظ اور موثر دوائی CIPROFLAXIN ایجاد ہوئی ہے اس کے 500mg صبح شام بڑے کافی رہتے ہیں۔

### ڈرپ INTRAVENOUS DRIP

آج کل رواج ہو گیا ہے کہ جسمانی کمزوری اور معمولی بیماریوں کے لئے دریدی ڈرپ لگاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے مطب میں جانے کا اتفاق ہوا۔ ان کے پیچھے کمرے میں پانچ چار بیٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ جن میں سے ہر ایک پر ایک ایک مریض پڑا تھا۔ ان سب کی وریدوں کے ساتھ ٹانیاں لگی تھیں اور گلوکوس کا محلول ان کے اجسام میں داخل ہو رہا تھا۔ بتایا گیا کہ اس گلوکوس میں وٹامن کے سرخ نیلے بھی شامل کر دیئے گئے ہیں۔

کسی چلتے پھرتے شخص کو گلوکوس لگانا دنیا کا سب سے خطرناک کام ہے۔ ڈرپ کسی بھی بیماری کا علاج نہیں۔ ایک دوسرے کی کٹودہ سوئیاں داخل کرنے سے دیگر حادثات کے علاوہ ورید میں وٹامن کی غیر مطلوبہ مقدار داخل کرنا مزید خطرناک عمل ہے۔ ڈرپ لگوانے والوں کو ہنڈ پریشر اور فزیو میٹریکس کی بیماری ہونے کے علاوہ اور دوسرے خطرناک عوارض ہو سکتے ہیں

## SCHIGELLA INFECTIONS

1897ء میں جاپانی ڈاکٹر کیوشی نے محسوس کیا کہ بچپن کے جراثیم صرف ایک شکل کے نہیں ہوتے بلکہ ان کی متعدد اقسام ہیں اس وجہ سے جراثیم کا یہ خاندان اسی کے نام سے موسوم ہے۔ امریکہ کی جنگ غلامی کے دوران 18 لاکھ فوجیوں کو بچپن ہوئی جن میں سے 44000 مر گئے۔ خیال کیا جاتا رہا ہے کہ جدید ادویہ کی وجہ سے بچپن کی بیماری ختم ہو جائے گی یا اس کا جلد علاج ممکن ہو جائے گا۔ لیکن یہ خیال غلط برآمد ہوا ہے کیونکہ عالمی اعداد و شمار کے مطابق اس کی شرح اموات اب تک بھی 25% ہے۔ جب کہ 1960ء کے بعد میکسیکو، بھارت، بنگلہ دیش اور جنوبی امریکہ کے دوسرے ممالک میں لاکھوں افراد اس کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ اور ان میں مرنے والوں کی تعداد 5% فیصدی سے بڑھ گئی تھی۔

پیٹ کی اکثر سوزشوں اور تپ عرقہ میں CHLOROMYCETIN کی افادیت کا بڑا شہرہ ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس خاندان کے جراثیم سے پیدا ہونے والی سوزشوں میں یہ دوائی اکثر بے فائدہ پائی گئی۔

ایک دوست کو کھانے پینے کی چیزوں کے انتخاب کی اچھی سمجھ ہے۔ مگر اس کے باوجود ایک روز اس کو بچپن کی تکلیف ہو گئی۔ ابتداء میں ERYTHROCIN دی گئی۔ پھر کیولین کے مرکب کا اضافہ کیا گیا۔ دو دن میں جب دستوں میں کمی نہ آئی اور ان میں کمزوری بڑھتی گئی تو FLAGYL شامل کی گئی۔ دواؤں کی اچھی خاص تعداد کے باوجود مکمل صحت یابی میں ہفتہ لگ گیا۔

### علامات

بیماری کی ابتدا کسی بچپن کی تکلیف کے بغیر اس سال سے ہوتی ہے۔ پہلے پتی ابلتیں شروع ہوتی ہیں۔ بعض مریضوں کو ابتدا میں بوجھ محسوس ہوتا ہے جس کے ایک دن بعد اس سال شروع ہو جاتے ہیں۔ پیٹ میں درد، توجھ اور اینٹھن کے ساتھ جسم میں

تھکن، طبیعت میں بیزاری، بیماری کے ساتھ قویج میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پھر دستوں میں خون شامل ہو جاتا ہے۔ اجابت میں دیگر اشیاء کے علاوہ پسندار مادہ (MUCOS) کافی مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ جن کو بواسیر کی شکایت پہلے سے ہو ان کے سے پھول جاتے ہیں اور دہان پر بھی تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو چیخ کے حملہ کے دوران بلکہ اسی کی وجہ سے اپنڈیکس کا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔

ایک خاتون کو رات کی ابتدا میں چیخ ہوئی۔ ان کے ایک عزیز متعدی امراض کے مشہور ماہر اور پیسہ وغیرہ کے علاج میں کافی سے زیادہ دسترس رکھتے تھے۔ انہوں نے معمولی سا علاج تجویز کیا اور خیال تھا کہ اتنا ہی کافی ہو گا۔ مگر دو گھنٹے کے بعد ان کو اتنا شدید درد ہوا کہ پیٹ درد کی عام گولیاں بے کار ثابت ہوئیں۔ آخر کار ان کی درید میں ایک نیم نشہ آور دوائی داخل کرنی پڑی جس سے درد کم ہوا۔ اس دوران دیگر علاج سے بیماری ٹھیک ہو گئی۔

تفہ اور اسہال کی وجہ سے پیشاب میں کمی آ جاتی ہے۔ یا بند بھی ہو سکتا ہے بلڈ پریشر گر جاتا ہے۔ جس سے کمزوری اتنا کو پہنچ جاتی ہے۔ بیماری کے نامکمل علاج کی صورت میں جوڑوں کا درد، دل کی تکلیف یا REITER'S DISEASE ہو جاتے ہیں۔ جس میں جوڑوں کے درد کے ساتھ منہ اور آنکھوں میں سوزش یا جلد پر ایگزیمہ کی شکل کے داغ پڑ جاتے ہیں کچھ مریض پیشاب کی نالی میں سوزش کی شکایت بھی کرتے ہیں۔

معدہ اور امعاء میں سوزش پیدا کرنے والے جراثیم کی دوسری قسموں کی مانند اس کے جراثیم بھی منہ کے راستے ہی جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ خوراک جب جراثیم آلود ہو جائے یا پینے والا پانی آلود ہو تو شائیکہ خاندان کے جراثیم پیٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کو حال ہی میں پیر کھانے سے چیخ ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے تیار کرنے والے کے اپنے ہاتھ جراثیم آلود تھے یا اس نے ایسی جگہ پر پیر بنایا جہاں اس پر کھیاں بیٹھتی رہیں۔

اس لئے اب ماہرین یہ سفارش کرتے ہیں کہ دودھ، دہی اور پنیر کی وہی شکل استعمال کی جائے جو PASTUERISED ہو۔ کسی عام آدمی کے لئے یہ عمل اپنے آپ سرانجام دینا تو ممکن نہیں البتہ بازار میں ملنے والی وہ چیزیں جو ٹھافوں میں بند ہو کر آتی ہیں اور ان میں سے بعض پر PASTEURISED لکھا جاتا ہے صرف ان ہی کو استعمال کیا جائے مگر ان میں مشکل یہ ہے کہ وہ گراں ہوتی ہیں اور ان کا ذائقہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتا۔ مثلاً وہی کا عام بھلاؤ 10-9 روپے فی کلو ہے۔ جب کہ اُن کا 400 گرام وہی 1 روپے میں ملتا ہے۔ دو گنے سے زیادہ قیمت ادا کرنے کو کوئی بھی خوشی سے تیار نہیں ہوتا۔ مٹھائی اور گنے کا رس خطرناک چیزیں ہیں۔

بچپش کے علاج میں ان امور کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔

○ آنتوں کے اندر ہونے والی جلن اور سوزش کے لئے ایسی دوائی استعمال کی جائے جو ان کو سکون مہیا کرے۔

○ بیماری پیدا کرنے والے جراثیم کی شناخت تسان کام نہیں۔ اس لئے ایسی جراثیم کش دوائیں استعمال کی جائیں جن کا اثر متعدد اقسام پر ہو۔

○ دستوں کی کثرت کو روکنے کے لئے LOMOTIL کی بجائے ATAPULGITE کے مرکبات دینا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ لیکن یہ فوری اثر نہیں کرتے۔

○ قے کو روکنے کی ادویہ دینی مفید ہوتی ہیں جیسے کہ TORECAN -

- DRAMAMINE - NIVADOXIN - AVOMINE MECLOZINE

STEMETIL - MAXOLON - MARZINE

○ پیٹ درد، مروڑ کے لئے ابتداً عام ملنے والی گولیوں سے کی جائے اگر ان کے ساتھ ساتھ جراثیم کو ہلاک کر دیا جائے تو درد جاتا رہتا ہے۔

(> بیماری کے ابتدائی مرحلہ میں غذا بالکل نہ دی جائے۔ خاص طور پر روٹی اور گشت سے مروڑ میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے دن صرف سیال چیزیں دی جائیں۔

جدید میں KAOLIN ایک ایسی منفرد دوائی ہے جسے پیٹ کی ہر سوزش میں

اعٹاکو اور اطمینان کے ساتھ دیا جاسکتا ہے۔ لاہور میں متعدد امراض کے شفاخانہ میں جہاں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ایسے مریضوں کا علاج ہوتا ہے وہاں پر مریض کو یہ اس وقت تک اسے گھول کر پلاتے رہتے ہیں جب تک کہ دستوں میں بھی چاک کی سفیدی نظر نہ آنے لگے۔

طب قدیم میں اسہول ایک ثایاب دوائی ہے۔ اسے تھوڑی مقدار میں ہر تین گھنٹے بعد دینا مفید رہتا ہے۔

لعاب بھی دانہ

طب نبوی میں ان تمام مسائل کی ایک لاجواب تریاق ہی دانہ کی شکل میں موجود ہے۔

چھوٹا چچہ بھی دانہ ایک پاؤ پانی میں کچھ دیر بیٹھا رہے۔ پھر اسے اچھی طرح پھینٹ کر اس کی لیس نکال لیں۔ چھان کر بیچ پھینک دیں۔ اس پانی میں دو بڑے چچے شہد ملا کر مریض کو ہر گھنٹہ کے بعد ایک دو گھونٹ پلائیں۔

ایک دو ساندہ بچی کو ذی اسہال جاری تھے۔ تمام جراثیم کش ادویہ دی گئیں مگر چار روز میں بھی لغات نہ ہوا۔ ہزاری دانست میں ادویہ کی مقدار اتنی صحیح اور کافی تھی کہ جراثیم کی ہر قسم ختم ہو جانی چاہتے تھے لیکن خون بدستور آتا رہا۔ آخر کار شہد ملا کر لعاب بھی دانہ دیا گیا۔ جس سے دو روز میں شفا ہو گئی۔

جدید ادویہ میں جمن اور اسہال کے لئے مثلاً DIARHOL - KAOSTOP

KAOPLECTATE STREPTOMAGMA FURADIL KALTIN کا

بڑا چچہ دن میں 4-5 مرتبہ دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ دو بڑے چچے پانی میں گھول کر اسی کو بار بار دیتے ہیں۔ پہلے انہی مرکبات میں جراثیم کش ادویہ بھی ملی آتی تھیں۔ مگر حکومت نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر جراثیم کش ادویہ کو نسخہ سے نکلوا دیا ہے۔ جس کا بوجھ مریضوں پر پڑ گیا ہے۔ کیونکہ ان کو دو یا تین دوائیں خریدنی پڑ رہی ہیں۔

اس خاندان کے جراثیم پر جو ادویہ موثر ہیں ان میں NALIDIXIC ACID

- TETRACYCLIN - AMPICILLIN - AMPICLOX - NEGRAM

SEPTRAN - STREPTOMYCIN زیادہ مشہور ہیں۔ عام حالات میں سٹریپٹوماکسی سین کا ٹیکہ لگتا ہے۔ مگر اس بیماری میں اگر ایک گرام سٹریپٹوماکسی سین کو کیولین کے محلول میں ملا کر مریض کو پلایا جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ حال ہی میں ایک نئی دوائی CIPROFLAXIN ایجاد ہوئی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی والوں کا کہنا ہے کہ یہ کسی بھی دوائی سے 100 گنا زیادہ مفید ہے۔

### قیام پاکستان پر آنتوں کی تاریخی وباء

دنیا کی تاریخ میں آنتوں کی سوزش کی سب سے بڑی وبا اس وقت پڑی جب اگست 1947ء میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ہندو فرقہ پرستوں نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں مسلح سکھوں کو مسلمان آبادیوں کے قتل و غارت پر مامور کیا۔ اگر مسلمان ان کا مقابلہ کرتے تو بھارتی فوج ان کی امداد پر آ جاتی اور اس طرح پورے مشرقی پنجاب میں دہلی تک مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ مگر اور کھیت جلا دیئے گئے۔ ان کی بچیاں اغوا ہوئیں اور ان کے لئے زندہ رہنے کی ایک صورت تھی کہ وہ اپنے گھر اور اٹائے چھوڑ کر پاکستان چلے جائیں ورنہ اپنا مذہب چھوڑ کر ہندو ہو جائیں۔

فیروزپور، جالندھر، گورداسپور اور امرتسر مسلم اکثریت کے علاقے تھے۔ ہوشیارپور میں بھی مسلمان اقلیت میں نہ تھے۔ مگر اس کے باوجود ان کے پاس ہجرت کے علاوہ زندہ رہنے کی کوئی ترکیب نہ چھوڑی گئی۔ ہر طرف سے لاکھوں کے قافلے پاکستان کی طرف پیدل چلتے ہوئے آتے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس تن کے کپڑوں کے علاوہ اور کوئی اثاثہ نہ چھوڑا گیا بلکہ اکثر کو برہنہ کر کے گھروں سے نکالا گیا۔ یہ نہ تو کسی سواری پر آ سکتے تھے اور نہ ہی ان کے پاس راستہ میں کھانا خریدنے کے دام تھے۔ اگر کسی کے پاس تھے تو ان سے چھین لئے گئے یا راستہ میں ان پر بیچنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ ہر طرف سے لاکھوں لئے پئے، مظلوم الخال، مجروح اور بے گھر افراد پاکستان کی سمت چلے آ رہے تھے۔ پنجاب میں شکر گڑھ، سیالکوٹ، واہگہ اور قصور کے راستہ و زانہ لاکھوں افراد پیدل، بسوں اور ریل گاڑیوں پر پاکستان میں داخل ہو رہے تھے۔

فائدہ کشی کی بدولت ان میں بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہ تھی اور یہ وہ وقت تھا کہ پاکستان کے پاس نہ تو روپیہ تھا اور نہ ہی علاج کرنے کو ڈاکٹر بلکہ ان کو دینے کے لئے دوائیں بھی نہ تھیں۔

### وباء کے اسباب

اگست کے آخری دنوں میں شدید بارشیں ہوئیں۔ دریاؤں میں سیلاب آگیا اور بھارتی پنجاب میں ستلج، بیاس، راوی اور چناب کا پورا درمیانی علاقہ زیر آب آگیا۔ سرسوں پر چار چار فٹ پانی کھڑا تھا۔ قافلوں نے جن کھلے میدانوں میں پرواؤں والے تھے وہاں پر بھی پانی کھڑا تھا اور یہ تباہ حال مہاجر گندے پانیوں میں بیٹھے لینے یا چلنے رہے۔ انہوں نے اسی پانی کو پیا اور اسی میں رفع حاجت کی۔ جراثیم تلودہ غلیظ پانی پینے سے ان کو وہ تمام بیماریاں لاحق ہو گئیں جو ہو سکتی تھیں۔ پیٹ میں کیزوں سے لے کر ہیضہ، تکپش، اسال سے تپ محرقہ میں سے کوئی نہ کوئی بیماری ہر شخص کو تھی۔ کسی بھی قافلے کے سارے افراد تندرست ہوں یہ ممکن نہ تھا۔

### واہگہ

اطلاع آئی کہ ایک لاکھ تباہ حال مساجروں کا ایک قافلہ امرتسر سے چل کر پاکستان آ رہا ہے۔ اس قافلہ کے لئے جو میڈیکل ٹیم تشکیل دی گئی اس کے سربراہ پروفیسر محمد حفیظ طوسیٰ اور سینڈ ایئر کا ایک اوسط طالب علم خالد غزنوی تھا۔ علم کی نایابی کے باعث اس ٹیم کے ساتھ نہ کوئی کمپونڈر تھا اور نہ نرس بلکہ خالد غزنوی ڈاکٹر سے لے کر چچا اسی تک سب کچھ تھا۔ دو افراد کا یہ طبی وفد ایک لاری پر واہگہ پہنچا۔ معلوم ہوا کہ ادویہ کی ضمن میں KAOLIN · SULPHAGUANIDINE کے علاوہ اور کوئی دوائی نہ تھی۔ کچھ آلات جراحی اور پٹیاں تھیں اور بالی خدا کا نام۔

سہ پہر کے وقت یہ قافلہ پاکستان میں داخل ہوا تو سڑک پر اور اس کے اطراف میں ہر طرف تپ اور دست پڑے تھے۔ گاؤں سے دہلیں منگوا کر کیولین گھولی گئی اور لوگوں کو جگ بھر بھر کر دینے لگے۔ سلفا گوانائیڈین زیادہ خراب مریضوں کے لئے تھی۔



پانی کی کمی کے مریضوں کے لئے پمپ کا پانی اہل کراس میں پمپساری کی دکان کا نمک گھون کر پیٹ کی جلد کے نیچے بغیر ابلی سرنج کے ذریعہ داخل کیا جاتا تھا۔ ڈاکٹر طوسی صاحب مریض دیکھتے 'آپریشن کرتے خالد غزنوی دوائیں تیار کرنے کے ساتھ ان کو تقسیم کرتا' گندے اوزاروں کے ساتھ پیٹ میں ٹیکے لگاتا اور جو حد درست تھے ان کو بیضہ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جاتا۔

پہلے دن 2400 افراد ہلاک ہوئے۔ اب یہ خدا جانتا ہے کہ ان میں کتنے بیماری سے مرے اور کتنے گندے اوزاروں یا غیر مصفا پانی کی وجہ سے۔ لیکن اس کے علاوہ نہ اور کچھ تھا اور نہ کیا جا سکتا تھا۔ اس میڈیکل ٹیم کا اپنا یہ حال تھا کہ پہلے دن رات کے لئے کسی نے روٹی اور اچار دے دیا۔ اگلے دن ایسا بھی نہ ہوا۔ یہ دونوں رضا کار تین دن تک کھائے اور نیند کے بغیر ایک لاکھ مریضوں کا علاج کرتے اور اکثر اوقات اپنی قوم کی تباہی پر ساتھ میں روتے بھی رہے۔ تیسرے دن فائدہ کشی کی وجہ سے خالد غزنوی بھاگ گیا۔ مگر طوسی صاحب ڈنٹے رہے۔

اسی طرح وہاں قافلے آتے اور بیضہ 'اسال یا پانی کی کمی سے مرتے رہے۔ زخموں سے مرنے والوں کی تعداد ان کے علاوہ تھی۔ بریلی سڑک پر تھانہ داس کے سامنے اور پیچھے کی تمام زمین دو دو میل تک ان بے نام و نشان مرنے والوں کی گتات قبروں سے بھری پڑی ہے۔

### والٹن کیمپ

ریل سے آنے والے مہاجر والٹن کیمپ اتارے جاتے تھے۔ مگر وہ ریل کہاں تھی۔ ماں گاڑی کے ڈبوں میں اوپر نیچے روٹی کی گانٹھوں کی مانند انسان ٹھونسنے ہوتے تھے۔ وہاں پر ایک علاقہ کے گرد بار لگا کر اور زمین پر چونہ ڈال کر ہسپتال کا نام دے دیا گیا۔ ڈاکٹر سید صدیق حسین اس کے انچارج تھے۔ ان کے پاس مختصر سا عملہ بھی تھا اور ریڈ کراس سے کچھ دوائیں ملتی تھیں۔ مریض میدان میں الٹیاں کرتے اور اپنی غلاظتوں سے آلودہ پڑے ہوئے تھے۔

ڈاکٹر سید صدیق حسین کی سلیقہ مندی 'رضہ کاروں کی امداد اور ادویہ کی موجودگی

کی وجہ سے ان کے یہاں مرنے والوں کی روزانہ تعداد 200-100 افراد تک رہی۔

### قصور

مہاجرین کا سب سے بڑا ریلا قصور کے راستے داخل ہوا۔ وہاں کے زمانہ ہسپتال کی انچارج مسز لطیف زیدی اور یکمپ کمانڈر خان طارق اسماعیل خان نے مہاجروں کے مسائل کے حل کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ قصور کے راستے آنے والوں کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہاں پر میاں اے ایم سعید جیسے مخلص اور با اصول شخص علاقہ مجسٹریٹ تھے۔ انہوں نے قافلہ کو روٹی، آرام اور دوائیں نہیا کیں۔ دکانیں کھول دی گئیں اور ڈاکٹروں سے کہا کہ جو جو چاہے لے جاؤ مگر لوگوں کی جان بچاؤ۔

میڈیکل کالج سے علم طب کے جید استاد ڈاکٹر محمد اسلم پیرزادہ، ڈاکٹر عبدالحمید ملک اور اسی کالج کے چند طالب علم وباء کے خلاف ڈٹ گئے۔ علاقہ مجسٹریٹ اور خان طارق اسماعیل گھروں سے روٹیاں جمع کرتے اور ڈاکٹروں کو کام پر لگے رہنے کا حوصلہ دیتے رہے مسجدوں کی چٹائیوں پر میدانوں میں سو کر اور چندے کی خوراک پر زندہ رہتے ہوئے پاکستانی ڈاکٹروں نے وباء کے خلاف انسانی جدوجہد کی ایک شاندار تاریخ اپنے خون پسینے سے رقم کی ہے۔ جس شہر میں ہیضہ اور اسہال کے ہزارہا مریض ہر وقت موجود ہوں وہاں یہ کیسے ممکن تھا کہ بیماری شہر میں داخل نہ ہو اور مہاجروں تک محدود رہے۔ پروفیسر اسلم پیرزادہ نے علم طب میں مہارت کی ایک نئی داستان رقم کی۔ سینالکھٹ پر حملہ کرنے والی بھارتی فوج کا انجام جہانگیر خان نے بڑے دلچسپ عنوان سے مرتب کیا ہے۔

### "INDIAN ARMY MEETS MEN OF STEEL"

اس طرح وباء کا مقابلہ بھی جب انسانوں کے جذبہ ایمانی سے ہوا تو پھر پھیل نہ سکا۔ 1947ء کی یہ وباء اس سے حاصل ہونے والے تجربات اور شرح اموات بیماریوں کے خلاف انسانوں کی ہمدردی کی ایک عظیم داستان ہے۔ یہی مشاہدات لاہور میں ہیضہ کی ایک وباء کے سلسلہ میں کام آئے، میاں سعید لاہور کارپوریشن کے میئر تھے اور ہم وباء کو ختم کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ میاں سعید نے مجھے کہا کہ

جس کسی چیز کی ضرورت ہو لو۔ میں انکار نہ کروں گا۔ لیکن بیماری ختم ہونی چاہئے۔ انہوں نے مجھے وہ چیزیں مریا کیں جو میں نے مانگی بھی نہ تھیں۔ مگر وہ خود ہر شام ہسپتال میں جا کر بیماروں کو گھنٹے تھے۔ ان کی اس دلچسپی نے عمل کو ہمہ وقت تیار رکھا اور دباؤ ختم کر دی گئی۔

اندازہ ہے کہ 1947ء میں 2 لاکھ افراد آنتوں کی سوزشوں سے ہلاک ہوئے۔

## پیش

### DYSENTERIES

پیش کو دو قسموں میں بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم جراثیم سے ہوتی ہے۔ جسے جراثیمی پیش یا ACUTE DYSENTRY کہتے ہیں۔ جب کہ دوسری قسم کو ایبائی پیش یا پرانی پیش AMOEBIC DYSENTRY کہتے ہیں۔ جراثیم کی سوجھدی کے علاوہ ان کی علامات ابتداء ہی سے مختلف ہوتی ہیں۔

### جراثیمی پیش

1897ء میں شینگ کی دریافت کے بعد لوگوں نے پیش کے جراثیم پر کافی محنت کی ہے۔ اور اب تک 42 اقسام کے ایسے جراثیم معلوم ہو چکے ہیں۔ جو پیش کا باعث بنتے ہیں۔ ان کے علاوہ بچوں میں ایک قسم ESCHERICHIA COLI بھی پائی گئی ہے جس میں جھلا ہونے والے پاخانہ میں تندرست ہونے کے دس ہفتے بعد تک جراثیم خارج ہوتے رہتے ہیں۔ مریض کی جسمانی نجاستوں پر کھیاں پینڈ کر جراثیم کو تندرست افراد کی خوراک تک لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ صہارت کے دوران ہاتھوں کو لگے ہوئے جراثیم دوسروں تک جا کر بیماری پیدا کرتے ہیں۔ اس لئے پیش سے شفا یاب ہونے والوں کو بعد میں بھی جراثیم کش دوا دینا ضروری رہتا ہے۔ خاص طور پر اس لئے کہ بعض دوائیں مریض کی علامات کو آسانی سے دور کر سکتی

ہیں۔ جیسے کہ وہی میں اسٹول ملا کر دینے سے بیماری کا زور ایک دو دن میں ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ایسے افراد دوسروں کے لئے مستقل خطرہ کا باعث بنے رہتے ہیں۔ کیونکہ اسٹول سے علامات میں کمی آ جاتی ہے جراثیم نہیں مرتے۔

### علامات

جراثیمی پیش سب کو یکساں شکل میں نہیں ہوتی۔ مختلف مریضوں میں اس کی علامات ان اقسام میں ہو سکتی ہیں۔

معمولی سے زیادہ 10-12 دست بخار یا تو باکل نہیں ہوتا اور اگر ہو تو بہت کم۔ موڑ اگر ہو تو برائے نام شدید قسم

فوری طور پر شروع ہوتی ہے۔ بخار گھبراہٹ اور بے قراری، میلی زبان، شدت کی پیاس، بھوک اڑ جاتی ہے۔ جسمانی وماغی تھکان کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔

### مرکب قسم

دست ایک دن رہتے ہیں اور ان کے ساتھ جسم میں چھوٹا بخار، سرور، تپ اور اسہال کے ساتھ حد سے زیادہ گھبراہٹ اور بے قراری، پیٹ اندر دھنس جاتا ہے۔ ہاتھ لگانے سے درد ہوتا ہے۔ اجابت تپلی سخت بدبودار اور میلی رنگت والی، بڈ پریشر کا گرنا اور دل کی کمزوری موت کا باعث بنتے ہیں۔ موڑ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔

### پیضہ نما پیش

درجہ حرارت اعتدال سے کافی کم، نقابت زیادہ، بڈ پریشر کم، ہر لمحہ کم ہوتا جاتا

ہے۔ سفیدی مائل پتے دست بار بار آتے ہیں۔ جن میں خون اور لیس دار  
MUCOS شامل ہوتے ہیں۔

بار بار ہونے والی پچیش

حمل نہ تو فوری ہوتا ہے اور نہ ہی شدید مگر کمزوری اور اس کے ساتھ تھوڑا  
بخار یا کبھی درجہ حرارت اعتدال سے بھی گر جاتا ہے۔ اگرچہ دو چار دنوں میں بیماری  
کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ مگر اسہال بدستور رہتے ہیں۔

مزمن پچیش

کھانے پینے میں معمولی بداعتدالی سے بار بار پچیش اور اسہال ہوتے ہیں۔ اجابت  
کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی۔ پاخانہ ہمیشہ پتلا رہتا ہے۔ جس میں پیس اور پیپ کی مقول  
مقدار شامل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خون بھی شامل ہو جاتا ہے۔

عمومی علامات

پچیش کی ہر قسم میں درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے سردرد اور بوجھ لاری ہیں۔  
متلی، بھوک کی کمی، طبیعت میں بوجھ کے ساتھ یعنی زبان پیاس بڑھ جاتی ہے۔ منہ  
خشک، ہونٹوں پر پھپھیاں جی ہوئیں، آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں۔ کمزوری بڑھنے  
کے ساتھ جسم دبلا ہونے لگتا ہے۔ زرد اور بے نور چہرے کے ساتھ ساری جلد خشک  
اور نیم مردہ سی نظر آتی ہے۔ قے اور اسہال اگر جاری رہیں تو جسم سے نمکیات کے  
انخراج اور جلد پریشر کی کمی پیشاب کی بندش یا دوران خون کے بحران سے موت کا  
باعث بنتے ہیں۔

پیٹ میں بل پڑتے ہیں۔ بار بار مروڑ اٹھتے ہیں۔ قونج کی اس کیفیت میں اجابت کی  
خواہش ہوتی ہے۔ مگر اطمینان کا باعث نہیں ہوتی۔ درد بہت بہت بڑھتا ہے اور  
بعض اوقات مریض ترپنے لگتا ہے۔

مرض کی ابتدا میں روزانہ 4-5 دست آتے ہیں۔ سقے بھی ہو سکتی ہے۔ دستوں کا رنگ زردی مائل بھورا ہوتا ہے مگر دوسرے دن سے رنگت میں خون کی سرخی اور لیس کی آمیزش نظر آنے لگتی ہے۔ بعض اوقات اجابت صرف لیس اور خون کی معمولی مقدار پر مشتمل ہوتی ہے۔ پھر خون کی مقدار بڑھنے لگتی ہے جو چند سرخ دھاریوں سے شروع ہو کر لوتھوڑوں تک چلی جاتی ہے۔ اجابت کے دوران بواسیر کی طرح کا درد اور ضمن محسوس ہوتے ہیں۔

### چھپیدگیاں

جسم سے پانی اور نمکیات کے اخراج کی وجہ سے پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ خون گاڑھا ہونے کے باعث اس کی گردش کی رفتار متاثر ہوتی ہے۔ آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں اور ان کے گرد سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں زبان اور ہونٹ خشک ہونے سے حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ بلند پریشر اور پانی کی کمی سے گردوں میں خرابی، دل کی کمزوری، بوڑوں میں درد آنکھوں میں سوزش، نمونیہ اور اعصابی دردیں ہو سکتے ہیں۔

آنکھوں میں زخموں سے خون آنے کی وجہ سے کبھی کبھار وہاں سورخ ہو سکتا ہے۔ جسم کی وجہ سے مصلیوں کی سوزش، خون کا زہر یا باعث موت بن سکتے ہیں۔ مزمن پیچش سے جسمانی خرابیت، اختلاج، آنکھوں میں درد، نڈائی کی بیزاری اور بھوک کی کمی پیدا ہوتی ہے۔

### علاج

جدید علاج میں درد کے لئے گرم پانی کی بوتل دیتے ہیں۔ اگر اس سے اتفاق نہ ہو تو BUSCOPAN یا IDARAC کی گولی ہر چار گھنٹے بعد دی جا سکتی ہے۔ عام حالات میں مرض کی شدت چار گھنٹے میں ختم ہو جانی چاہئے۔

پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لئے ORS کا محلول تیار کر کے اسے بار بار پلایا جائے۔ اندازہ کر لیا جائے کہ جسم سے پانی کی کتنی مقدار خارج ہو رہی ہے۔ اسی

مناسبت سے پانی دیا جائے۔ یہ یاد رہے کہ پانی کی مقدار ایک وقت میں ایک چمچ سے زیادہ نہ ہو کم مقدار میں پانی زیادہ اچھی طرح جذب ہوتا ہے۔

پانی کی زیادہ کمی اور پیشاب کی بندش کے لئے لوگ ورید کے راستہ نمک اور گلوکوس کا ملا ہوا آپ مقلد داخل کرتے ہیں۔ لاہور کارپوریشن کے شفاخانہ امراض متعدی میں ہر ساں ہیضہ، چیچش، اسہال کے ہزاروں مریض داخل ہوتے ہیں۔ جنہی پر ہم نے دیکھا ہے کہ ورید میں داخل ہونے والے پانی کی مقدار اور اس میں نمک کا تناسب مریض کی زندگی بچانے میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس ہسپتال میں حاجی غلام صادق مرحوم چالیس سال ڈیپنسر رہے اور ڈاکٹر طاہر زیدی تین سال معالج رہے۔ یہ لوگ ہر مریض کی حالت اور ضرورت کے مطابق ورید میں دیئے جانے والے پانی کی مقدار اور نوعیت کا فیصلہ کرتے تھے۔ ڈاکٹر زیدی سناتے ہیں۔

اسہال کی وجہ سے پانی کی کمی کا شکار ایک صاحب داخل ہوئے۔ ان کو ایک بوتل معتدل نمک کا پانی دیا گیا۔ ان کو ہماری صلاحیت پر یقین نہ تھا۔ وہ باہر سے ایک مشہور پروفیسر صاحب کو اضافی مشورہ کے لئے لائے۔ ان پروفیسر صاحب نے ہدایت کی کہ مریض کو نمک کا 2% فیصد پانی دیا جائے۔ حاجی غلام صادق کے مشورہ پر ڈاکٹر زیدی نے لواحقین کو بتایا کہ ہم مطلوبہ مقدار میں نمک دینے پر تیار ہیں۔ انجام کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ پروفیسر صاحب کی تحریری ہدایت پر ورثہ کی تحریر کے بعد 2% نمک دے دیا گیا۔ مریض دو گھنٹے بعد مر گیا۔

ہم نے بھی کچھ عرصہ اس ہسپتال کی سربراہی کی ہے اور ہمارا تجربہ بلکہ اس کا تجربہ یہ ہے کہ ورید کا راستہ مجبوری کے بغیر اختیار نہ کیا جائے۔ اگر منہ کے راستے گنجائش موجود ہو تو اس خطرناک ترکیب سے اجتناب کیا جائے اور یہ بھی اسی شکل میں ہو کہ فیصلہ کرنے والے کو ورید میں دئے جانے والے محلول کی قسموں اور جسمانی اثرات کا طویل تجربہ اور واقفیت حاصل ہو۔

سنتوں کی سوزش کو دور کرنے کے لئے KAOLIN کا محلول مفید ترین چیز ہے۔

اسے پانی میں گھوں کر چبچ کر کے تندرستی تک مسلسل دیتے رہنا ایک اچھا طریقہ ہے۔ اگر بازاری ادویہ دینی ہوں تو FURADIL -KAOSTOP STREPTOMAGMA میں سے کسی کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔

اگر ایسی طریقہ علاج پسند ہو تو ذہنی اور اسینفول دینے میں کوئی حرج نہیں۔ عرق بید متک یا عرق سولف کا بار بار دینا کیسا مفید ہے۔ جراثیم کو ہلاک کرنے کے لئے جو ادویہ استعمال کی جاتی ہیں ان میں سے آنتھرا کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ البتہ ہمارے ذاتی مشاہدے میں جو زیادہ مفید معلوم ہوئیں ان میں SULPHAGUANDINE سب سے عمدہ تھی۔ 1947ء کی وباء میں ہمارے پاس یہی ایک ہتھیار تھا۔ پروفیسر پروڈاؤ اس کی 20 12 گولیاں ایک ہی وقت میں دے کر آئندہ ادویہ کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے بد قسمتی سے اب یہ روایت پاکستان میں ادویہ کی فرسٹ سے خارج کر دی گئی ہے۔

اس کے بعد SULPHONAMIDES میں سے جو بھی مل جائے غنیمت ہے۔ ورنہ کیولین میں سٹر-پٹو مالکی سین ملا کر دینا بھی مفید ہے۔ مریض کو روزانہ ایک گرام کا محلول پلا دینا کافی ہوتا ہے۔ ERYTHROCIN کی 500mg کی ایک گولی صبح شام تین دن دینا بڑا مفید پائا گیا۔ البتہ دوسرے معالج TETRACYCLIN AMPICILLIN اور SEPTRAN کے بڑے معترف ہیں۔ برطانوی ماہرین CIPROFLAXICIN کو 100 گن بہتر قرار دیتے ہیں پاکستان میں یہ دوائی حال ہی میں آئی ہے۔ شہرت بڑی اچھی ہے۔ بلکہ اسے تپ محرقہ کے لئے بھی بہترین سمجھا جا رہا ہے۔

## طب نبوی

چپچس، اسہال، تپ محرقہ اور بیضہ معدہ اور آنتوں کی ایسی سوزشیں ہیں جن کا اسلوب ایک ہے۔ اور عام طور پر علاج میں کوئی خاص فرق نہیں۔ پوری تفصیل انہی بیماریوں کے علاج کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے۔



پیٹ کی تمام بیماریوں اور خاص طور پر جراثیم کی وجہ سے ہونے والی سوزشوں میں شدہ مفید ترین دوائی ہے کیونکہ یہ

1- جراثیم کش ہے۔

2- پانی اور نمکیات کی کمی کا بہترین علاج ہے۔

3- کمزوری کا بہترین علاج ہے۔

4- پیشاب آور اور دافع درم ہے۔

اگر کوئی اور دوائی نہ بھی دی جائے تب بھی بار بار شدہ دنا ہی کافی رہتا ہے۔ کیونکہ یہ بیماری کی ہر کیفیت کا حل ہے۔

## پیش کی اقسام کا موازنہ

### جراثیمی پیش

موسم گرما میں دبائی صورت

میں پھیل سکتی ہے۔ ایک محلہ

کے متعدد افراد مبتلا ہو جاتے ہیں۔

زیادہ تر بچوں کو ہوتی ہے۔

2-4 دنوں میں شروع ہو جاتی ہے۔

شدید کمزوری کی وجہ سے بستر پر لیٹنا

پڑتا ہے۔

اسال زیادہ ہوتے ہیں۔

اکثر ہوتا ہے۔

بہت زیادہ

شدید درد۔ بائیں حصہ میں

### امیائی پیش

محدود علاقہ میں ہوتی ہے

کبھی کبھار زیادہ افراد متاثر

ہوتے ہیں

بچوں میں کم ہوتی ہے

پندرہ دن سے ایک ماہ بعد

چلنے پھرنے میں مشکل نہیں

پڑتی۔

بار بار نہیں ہوتی

معمول کبھی کبھار

معمولی گرمی ہوتی ہے

درد اور جلن معمولی مگر

پیٹ کے دائیں حصہ میں

1- وبائی کیفیت

2- متاثرین کی عمر

3- عرصہ غفلت

4- حالت مریض

5- اجابت

6- بخار

7- کمزوری

8- پیٹ میں درد

- 9- مردڑ اٹھنا بالکل نہیں یا معمولی شدید
- 10- پیچیدگیاں کئی قسم کی چند ایک
- 11- اجابت کی نوعیت بدودار بدو کم ہوتی ہے
- 12 ظاہری شکل لیس - سیاہ رنگ کا ہوا خون سرخ رنگ میں خون کی آمیزش  
بھی بھی لیس دار - جیلی کی شکل  
کثیر تعداد میں خلیے اور خون  
کے سرخ دانے
- 13- خوردبینی معائنہ سرخ دانے کم تعداد میں کثیر تعداد میں خلیے اور خون  
پیپ بھی بھار کے سرخ دانے اور پیپ
- 14- سبب کی موجودگی ایسا بھی کبھی نظر آتا ہے جراثیم نظر نہیں آتے۔ البتہ  
اور خون کے سفید دانے پیپ اور خون کافی ہوتے ہیں۔  
شکستہ حالت میں
- 15- کولون کا معائنہ بڑی آنت میں ٹمن کی شکل زخم زیادہ نہیں ہوتے۔ البتہ  
بذریعہ کے یا صراحی کی مانند سرخ اور متورم جھلیوں سے
- SIGMAIDOSCOPY ابھرے زخم جن کے آس معمولی دباؤ سے خون نکلتا نظر  
کرنے پر مشاہدات پاس چھوٹے چھوٹے زخم آتا ہے۔  
جیسے کہ گھن کے سوراخ ہوتے ہیں

## امیبائی پیش

### AMOEBIC DYSENTRY

دنیا کے مختصر ترین جانداروں میں ایک حیوان امیبا ہے۔ اس کی اپنی کوئی واضح اور متعین شکل نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ ایک جیلی کی طرح کا لو تھڑا ہے جو اپنے جسم کو کوئی بھی شکل دے سکتا ہے۔

اس کی درمیانوں قسمیں ہیں مگر بیماریوں کے لئے ہماری دلچسپی والی قسم کو ENTAMOEBA HISTOLYTICA کہتے ہیں اس کا زیادہ تر مسکن انسانوں کا پیٹ ہے۔ یہ آنتوں میں رہتا وہاں سوراخ کر کے کبھی ادھر کبھی ادھر نکل جاتا ہے یا دوران خون میں داخل ہو کر آنتوں سے جگر یا ~~بیمبھڑوں~~ میں چلا جاتا ہے۔ اسکی صورت میں اس کا کردار خطرناک اور جان لیوا ہو سکتا ہے۔ آنتوں میں قیام کے دوران یہ بڑی تیزی سے پھلتا پھوٹا ہے۔ بلکہ آٹھ گھنٹوں میں ایک سے دو بن جاتے ہیں۔ یوں ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ ان جانداروں میں سے ہے جو اپنی ردی خود کھا کر کھانے کی بجائے دوسروں پر پردرش پاتے ہیں۔ اس لئے اپنی خوراک کو جا کر تلاش نہیں کرتا۔ امیبا مریضوں کے پاخانے میں خارج ہوتا ہے۔ اور ہر وہ خوراک جو پاخانے سے بالواسطہ یا بلاواسطہ آلودہ ہے وہی امیبا کو دوسرے ندرست فرد کے پیٹ میں پہنچانے کا باعث ہوتی ہے۔ اس کی صرف ایک قسم خراب دانٹوں میں ENTAMOEBA GINGIVALIS کے نام سے مٹی ہے جو اسی کے شکار مریضوں کا منہ چوسنے سے ندرست فرد کو ہو جاتی ہے۔

اندازہ لگایا گیا ہے کہ دنیا کی آبادی کا دس فیصدی ایسا ہی وجہ سے بیمار ہے مثلاً امریکہ جیسے امیر اور سرملک میں اس کے شکاروں کی تعداد دو فیصدی سے زیادہ ہے۔ جب کہ گرم ممالک میں 30 فیصدی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر اس کے لئے زندگی کے حالات خوشگوار نہ ہوں تو یہ اپنے آپ کو پیٹ کر ایک ایسی شکل دے لیتا ہے۔ جس پر موسمی تغیرات اثر انداز نہیں ہوتے۔ اس لئے اگر یہ دھوپ میں کسی سڑک پر بھی کئی دن پڑا رہے تو اس کی موت واقع نہیں ہوتی۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ایک تندرست شخص کے پیٹ میں اگر 2000 امیبا داخل ہو جائیں تو وہ یقیناً بیمار ہو جائے گا۔ جب کہ ایک بیمار کے جسم سے روزانہ خارج ہونے والوں کی تعداد 450 لاکھ تک ہے۔ کھانا پکانے والے بیمار اشخاص یا اشیائے خوردنی فروخت کرنے والے پیٹ کے مریضوں کی وجہ سے یہ بیماری ان کے تمام گائوں میں تقسیم ہوتی رہتی ہے۔

بہیمانہ ممالک میں اہم مسئلہ سبزیوں کی کاشت کا ہے۔ کھیتوں میں کھاد کے لئے کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے۔ بلکہ اکثر مقامات پر شر کے گندے پانی سے سبزیوں کے کھیتوں کی آبیاری کی جاتی ہے۔ جس سے سبزیوں جراثیم اور امیبا سے آلودہ ہو جاتی ہیں۔ کچی سبزیوں کھانا برا مفید ہے۔ لیکن ہمارے شہروں میں ان کو کھانے کا مطلب پیٹ کی بیماریاں حاصل کرنا ہوتا ہے۔

یہ بیماری بہت چھوٹے بچوں میں نہیں ہوتی۔ لیکن عمر میں اضافہ کے ساتھ بیماری کے امکانات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کمزوری، خون کی کمی، حمل، ہارمون کے ٹیکے گھوانے کے دوران ان کو جسم میں زیادہ شرارت کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔

امیبا جسم میں جا کر وہاں کی بھیلیوں کو خراب کرتا ہے۔ ستوں سے جانے والے ورمیدی خون میں شامل ہو کر جگر میں جاتا ہے۔ مگر وہاں پر اس وقت تک اپنا گھر نہیں بنا سکتا جب تک کہ وہاں پر پھنے سے کوئی خرابی موجود نہ ہو۔ تندرست جگر میں اسے ٹھکانہ نہیں مل سکتا۔

## علامات

جسم میں داخل ہونے سے لے کر علامات کے ظاہر ہونے کے درمیان ایک وقفہ ہوتا ہے۔ ابتدا اس سال سے ہوتی ہے۔ جس کے ساتھ تازہ خون بھی نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوزش نے آنٹنوں کے کسی حصہ میں گھر بنا لیا ہے۔ اگرچہ اس کے ساتھ پیٹ میں درد اور اینٹھن ہوتے ہیں، مگر اتنے نہیں جتنے برا ٹنھی پچش میں۔

پاخانے کی شکل یکساں نہیں ہوتی۔ عام طور پر نرم سیال ہوتا ہے اور لیس کی خاصی آمیزش ہوتی ہے۔ خون کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں۔ علامات کی شدت چند دن سے لے کر کئی ماہ تک چلتی ہے۔ پھر بیماری مزمن شکل اختیار کر لیتی ہے۔

کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ پیٹ میں ہر وقت ہوا بھری رہتی ہے۔ بعض اوقات کو زکار مارنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ دودھ، ساگ، گوشت اور چاول کھانے سے پیٹ کے بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں، پرائے اور مرغن غذائیں تکلیف دیتی ہیں۔

ایسا بنیادی طور پر اپنے میزبان کی جھلیوں کا دشمن ہوتا ہے۔ اس لئے جسم کے جس حصے کو ٹھکانا بیٹا ہے وہاں پر اپنے لئے سرنگیں کھودتا ہے۔ ان سرنگوں کو اگر دیکھیں تو وہ ٹن کی طرح ابھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ ایک جگہ قیام نہیں کرتا اور آگے جا کر مزید خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے جیسے کہ:-

## آنٹنوں میں سوراخ

آنٹنوں میں سرنگیں کھودنے کے دوران یہ بھی کھار، آہار، چمید بھی کر دیتا ہے۔ آنٹنوں کے اندر کی چیزیں اگر پیٹ کی کھلی جگہ میں جائیں تو وہاں پر شدید قسم کی سوزش PERITONITIS ہو جاتی ہے۔ ستنیں کام کرنا ترک کر دیتی ہیں۔ پیٹ پر ہاتھ لگائیں تو وہ گوشت پوست کی بجائے لکڑی کا تختہ معلوم ہوتا ہے۔ پیٹ میں شدید درد، فے اور پانی کی کمی کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے۔ پیٹ کے اندر جریان خون کی وجہ سے ہلڈ پریشر گر جاتا ہے۔ خون کی کمی کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل پڑتی ہے۔

اور یہی کیفیت موت کا باعث بن سکتی ہے۔ ایسے مریض بھی دیکھے گئے ہیں جن کے پیٹ میں کینسر تھا۔ اس کے ساتھ ایسا داخل ہوا اور اس نے کینسر میں سوراخ کر دیا۔ اس لئے پرانی پیچش کے کسی مریض کے پاخانہ کا ٹیسٹ کرنے پر اس میں سے ایسا برآمد ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ پاخانہ کے راستہ خون آنے کے دوسرے اسباب کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مزید ٹیسٹ کرنے کی بجائے اگر دو تین دن کے علاج سے علامات ختم ہو جائیں اور مریض کی صحت بہتر ہونے لگے تو پھر مزید تلاش کی ضرورت نہیں رہتی۔

جگر کا پھوڑا

ایمیائی پیچش کے تقریباً آدھے مریضوں کو جگر میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ سائڈ پیچش کی ابتداء کے چند ہفتوں سے لے کر سالوں تک کے وقفہ سے ہو سکتا ہے۔ ابتدا میں بخار، دائیں طرف پیٹ کے اوپر پھلوں کے نیچے درد، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں۔ بخار شام کو زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی معمولی سردی سے چڑھتا ہے۔ پھر پینہ آکر اتر جاتا ہے۔ کبھی ٹانگہ بھی ہو جاتا ہے۔

اکثر مریضوں کو ابتدا ہی میں اتنی تکلیف ہو جاتی ہے کہ ان کو فوری توجہ کی ضرورت پڑتی ہے اور کچھ ایسے ہیں جن میں بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی اور ان کو دہشت میں مبتلا نہیں کرتی اور اس طرح وہ علاج کا ایک اچھا موقع ہاتھ سے گنوا لیتے ہیں۔ اور پرانے بیمار بن جاتے ہیں۔

چونکہ جگر کا محل وقوع دائیں پیٹ کے ساتھ ہے اس لئے بنا اوقات جگر کے پھوڑے کے اثرات دائیں پیٹ کے بھی پیٹ میں لے کر خشک کھانسی سے ابتداء کر دیتے ہیں۔ اس کیفیت کا ایکسے سے مکمل پتہ چلایا جاسکتا ہے۔ خون کا BSR بڑھ جاتا ہے اور سفید دانوں کا تجزیہ کریں تو NEUTROPHILS تعداد میں بڑھ جاتے ہیں۔ ان دو آسان طریقوں سے تشخیص ممکن ہو جاتی ہے۔ اگرچہ لوگ الزا ساؤنڈ کا مشورہ بھی دیتے ہیں مگر اس سے جگر کے پھیلنے کے علاوہ دوسری چیزوں کا زیادہ اچھی طرح پتہ نہیں چلتا۔

جگر میں پھوڑا نہ صرف کہ جگر جیسے اہم مرکز کو خراب کر دیتا ہے بلکہ یہ پھوڑا مہسمرے یا ہیٹ میں پھٹ کر اپنی چاکلیٹ رنگہ کی جگہ ہر جگہ پھیلا کر PERITONITIS جیسی خطرناک صورت حال پیدا کر دیتا ہے۔ مہسمرے میں پانی یا پیپ پڑ جاتے ہیں جسے EMPYEMA کہتے ہیں۔ یہ پھوڑا دل کے غلاف میں بھی پھٹ سکتا ہے۔ اور مریض دل کی بیماریوں کی علامات اور چھاتی کے وسط میں درد لے کر آتا ہے۔ اس کی ظاہری حالت بڑی خراب ہوتی ہے۔ یہ پھوڑا ہسلیوں کی درمیانی جگہ کو چھا کر چھاتی کی جلد کے راستے بھی باہر نکل سکتا ہے۔ خون کے راستے جانے والے ایسا مہسمرے میں براہ راست پھوڑا بنا کر زہر باد پھیلاتے ہیں۔ ماہرین نے اب تک 100 ایسے مریض بھی دیکھے ہیں جن کے دماغ میں پھوڑا نمودار ہوا۔ لیکن بیماری کی یہ بدترین قسم تقریباً عفا ہے۔

### تشخیص

پانخانہ کے معائنہ پر اگر ایسا نظر آجائے اور اس کے اندر خون کے سرخ دانے پھینے ہوئے ہوں تو تشخیص کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔

اتنوں کا SIGMOIDOSCOPE کے ذریعہ معائنہ ایک یقینی طریقہ ہے۔ جس میں ان کی اندرونی حالت سے ہتھکڑی کے علاوہ زخموں سے براہ راست مواد حاصل کیا جاسکتا ہے۔ جن زخموں کی نوعیت مشتبہ ہو ان سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر مزید خوردبینی معائنہ کے لیے باہر نکالے جاسکتے ہیں۔

جگر اور مہسمرے کے اکثر حالات ایکسرے کے ذریعہ پتہ چل جاتے ہیں۔ اگرچہ بعض استاد جگر میں باہر سے ہی سوئی ڈال کر مواد نکال کر اس کے ٹیسٹ پسند کرتے ہیں مگر یہ عمل کسی ماہر سرجن کے ہاتھ سے باقاعدہ آپریشن تھیر میں ہونا چاہئے۔ اس کے باوجود یہ خطرات سے خالی نہیں۔ ایسا مشکل کام ایسے وقت کرنے کا جواز ہو سکتا ہے۔ جب پھوڑے کا علاج پیپٹ کو کھولے بغیر ممکن ہو۔ آج کل اتنی موثر ادویہ موجود ہیں کہ اس خطرہ میں پڑنے کی بجائے چند روز گولیاں کھلا کر عام حالت میں اس جان لیوا بیماری کا علاج کیا جاسکتا ہے۔

## علاج

عرصہ دراز سے امیبا کے علاج میں لوگ تنکھیا کے مرکبات دیتے آئے ہیں۔ جن میں طب جدید کی CARBARSONE وغیرہ اپنے وقتوں کی مشہور دوائیں تھیں۔ اسی طرح آریوڈیک طب کی مشہور دوائی ہینٹ مالتی، بھی تنکھیا کی موجودگی کی وجہ سے بڑی مقبول رہی ہے۔

امیبا گرم ملکوں کا کیزا ہے اور اسطوائی علاقوں میں کام کرنے والے لوگ ہی اس سے متاثر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ مہذب ملکوں میں جسمانی بھلاستوں کو تیار یوں سے لے جانے کا نظام ایسا محفوظ ہے کہ پاخانہ کے ذریعہ پھیلنے والی سوزشی بیماریاں اب وہاں نہیں ہوتیں۔ اور اب کبھی بیضہ ہوتا ہے تو وہ کوئی ایشیائی باشندہ وہاں لے کر جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ رفع حاجت کے بعد ”مہذب“ ملکوں کے ”مغفائی پسند“ کمین جو گند گھولتے ہیں وہ بیماریاں پھیلانے کے لئے کافی سے زیادہ ہے۔ جب فراغت کے بعد طہارت نہ کی جائے۔ ناخن صاف نہ ہوں۔ بیت الخلاء سے واپسی پر صابن سے ہاتھ نہ دھوئے جائیں تو بیماریوں کو پھیلنے سے روکنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ نیویارک کے 2 فیصد باشندے آنتوں میں امیبا لئے پھرتے ہی نہیں بلکہ دوسروں کو تقسیم بھی کرتے ہیں۔

دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی فضائیہ کے ایک ماہر ڈاکٹر ماڈرن نے اس بیماری کا علاج 41 دن کے ایک کورس کی صورت میں مرتب کیا تھا۔ جس میں ہینٹلین کے انجکشن، ایسے ٹین کے ٹپکے، سلفا گوانیڈین کی گولیاں اور متعدد دوائیں شامل تھیں کسی کو 4 دن کسی کو 6 دن اور کوئی 7 دن ملا کر 41 دن پورے کئے جاتے تھے۔ چونکہ کرتلی النی بخش نے زیادہ عرصہ مشرق بعید میں گزارا تھا اس لئے وہ اس علاج کے بڑے مداح تھے۔ ہم نے ان کو میوہپتال میں لوگوں کو یہ علاج دیتے اور کامیاب ہوتے دیکھا ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ اس نسخہ کی اکثر دوائیں اب ناپید ہیں اور کچھ کو دینے کے لئے مریض کو مشاہدے میں رکھنا ضروری ہے۔

لاہور میڈیکل کالج کے تمام پرانے استاد امیبا سے پیدا ہونے والی ہر سوزش حتیٰ



نر جگر کے پھوڑے کا علاج بھی EMETINE HYDROCHLORIDE کے ٹیکوں سے کیا کرتے تھے۔ ان کی ترکیب یہ تھی کہ مریض کو روزانہ آدھ گریں دوائی کا ٹیکہ 10 دن تک جلد کے نیچے لگایا جاتا تھا۔ جسم کے اندر جانے کے بعد یہ دوائی جسم کے تمام عضلات میں پھیل جاتی ہے اور وہاں سے آسانی کے ساتھ باہر نہیں نکلتی۔ یہ دل کے عضلات کو کمزور کرتی ہے۔ اس لئے یہ ٹیکے لگوانے کے دوران مریض اگر چلے پھرے تو دل کا دورہ پڑنے کا احتمال موجود ہے۔ یہ استاد ایسے مریضوں کو ہسپتال میں لٹا کر علاج کرتے تھے اور دل کی تقویت کے لئے STRYCHNINE ساتھ شامل کرتے تھے۔

برطانیہ کے دوا سازوں نے حال ہی میں اس دوائی کی سادست میں کچھ تبدیلیاں کر کے ایک نئی دوائی DEHYDROEMETINE تیار کی ہے۔ جو جسم سے جلد خارج ہو جاتی ہے اس لئے اس کی خوراک ڈیزھ گریں تک دی جا سکتی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی قراہ دین طب کے مطابق یہ قابل اعتماد اور بہترین ہے۔

لمبیا کی مشہور دوائی CHLOROQUIN چونکہ طفلی کیزوں کو مارتی ہے۔ اس لئے لوگوں نے اسے ایبا کے خلاف بڑی کامیابی سے استعمال کیا ہے۔ ابتدا میں پہلے دن صبح دوپہر سہ پر اور رات کو ایک ایک گولی کے حساب سے دو دن دی جاتی ہے۔ پھر روزانہ صبح شام ایک ایک گولی 19 دن دی جاتی ہے۔ لیکن یہ علاج صرف جگر میں ایبا کے حملہ کے خلاف موثر ہے۔ آنتوں کی سوزش پر اس کے اثرات غیر یقینی ہیں۔ کچھ لوگوں کو خون اور دل پر اس دوائی کے اثرات عصبوں ہوتے ہیں لیکن ماہرین کے خیال میں ان پر توجہ کی ضرورت نہیں۔ جب کہ ہم اپنے مشاہدات میں اس دوائی کو اتنے دن دینا خطرے سے خالی نہیں جانتے۔ بلکہ ہم نے لوگوں کو اس سے مرتے بھی دیکھا ہے۔ یہ دوائی پاکستان میں NIVAQUIN اور RESOCHIN کے ناموں سے ملتی ہے۔ جرمنی کی بائیر کمپنی نے کلورو کوائن کو ایک اور ایبا کش دوائی کے ساتھ شامل کر کے ایک مفید نسخہ RESORTEN کے نام سے مرتب کیا تھا۔ ہم نے اسے اکثر مفید پایا۔ ایک برطانوی کمپنی نے ایک کیسادی دوائی METRONIDAZOLE کو

اپنے رجسٹرڈ نام FLAGYL کے لیبل سے فروخت کرنا شروع کیا ہے۔ یہ 200'400 اور 800 ملی گرام کی طاقت میں ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ رات کے کھانے کے بعد اگر 400 ملی گرام کی دو گولیاں چھ دن کھالی چائیں تو جگر کے علاوہ آنتوں سے بھی ایسا ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت میں 200 ملی گرام کی تین گولیاں روزانہ کے حساب سے 10 دن دی جاتی ہیں۔

ایک صاحب کو بیت میں ہوا کمزوری اور اسٹائ کی شکایت تھی۔ وہ ایک ماہر پروفیسر کے پاس گئے جنہوں نے تشخیص کیا کہ ایسا کی وجہ سے ان کا جگر بھی بڑھ گیا ہے۔ دس دن میں FLAGYL کی 30 گولیاں کھانے کے بعد چکروں سے ان کا حال خراب منہ کا زائقہ ایسا کہ جسے صابن گھول کر پی لیا ہو۔ ایک دن تو وہ بیڑھیاں اترنے کے قابل نہ رہے۔ لیکن ثابت قدمی سے 30 گولیاں کھائیں۔ اس کے بعد ایک اور ایسا کس چھ دن کھائی اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کی آنتیں اب صاف ہو گئی ہیں۔ مگر بیت میں اچھارہ بد ہضمی اور بوجھ بدستور ہے۔

اس دوائی کے لیبارٹری تجربات سے معلوم ہوا کہ چوہوں اور دوسرے جانوروں پر اس کا استعمال کینسر پیدا کر سکتا ہے۔ یہ دماغ اور دل پر برے اثرات رکھتی ہے۔ اس لئے اکثر مغربی ممالک میں اس کی فروخت اور درآمد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔

ایک امریکی ادارہ نے اس کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ TINIDAZOLE کے نام سے تیار کیا ہے جو پاکستان میں FASIGYN کے نام سے ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ محفوظ اور موثر ہے۔ اور اسے بار بار کھانے کی ضرورت نہیں اس کے 5000 ملی گرام رات کو 2-3 گولیاں کھا کر قتلوں میں پورے کئے جاتے ہیں۔

جراثیم کش ادویہ میں سے TETRACYCLIN - ERYTHROCIN بھی اس غرض سے مفید ہیں۔ بلکہ ہمارے مشاہدے میں اس بیماری کے لئے انتھرو سین زیادہ مفید اور موثر رہی ہے۔

ان کے علاوہ HYDROXYQUINOLINE - ENTAMIZOLE کو بھی

عشرت حاصل ہے۔ مگر بد قسمتی یہ ہے کہ موخر الذکر کو پاکستان میں اب خالص صورت میں بنانا بند کر کے اس کے ساتھ وہ لعنتی دوائی METRONIDAZOLE شامل کر کے METODIN کے نام سے فروخت کیا جا رہا ہے۔ بلاشبہ یہ دوائی مفید ہے۔ مگر اس سے وابستہ خطرات اس کے بے دھڑک استعمال کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ البتہ چار پانچ دن تک اوسط مقدار میں دینے میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔

## طب نبوی

ایسا کے علاج میں اہم ترین ضرورت ایسا کو جگ کرنے کے ساتھ تنہوں میں بیماری کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنا اور زخموں کو بھرتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے کی سوزش اور حب دق کے لئے ایک چیز قسط البحری کا تذکرہ فرمایا ہے بلکہ انہوں نے ایک بچے کا اس دوائی سے اپنی نگرانی میں شافی علاج بھی کرایا۔ اس دوائی کے بارے میں کرئل چوپڑا نے بھارت میں اور دوسرے ماہرین نے اٹلی میں اور چینی اطباء نے جو تجربات کئے ہیں۔ ان کے مطابق یہ دوائی لیبارٹری میں ایسا کے خاندان کے متعدد حشرات کو دس منٹ میں ہلاک کر سکتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر مقوی دافع سوزش اور آلام ہے۔ اس لئے ایسا کے خلاف قسط البحری کا استعمال جراثیم کے خلاف بھی موثر ہونے کی وجہ سے اضافی فوائد کا حامل ہو گا۔

زخموں کا تھل آنسوں اور مسخروں کی ہر قسم کی سوزشوں کے لئے یسماں مفید ہے۔ یہ تین اگر خالی پیٹ پیا جائے تو سنتوں کے زخم مندمل کرتا ہے خواہ یہ زخم تیزابیت سے ہو یا جراثیم سے سب کے لئے یسماں مفید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پرانی سوزش میں مفید قرار دینے کے علاوہ ستر بیماریوں کی شفا قرار دیا ہے۔ یہ ایک مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ شہد کو قرآن مجید نے شفا کا مظہر قرار دیا ہے۔

کلونجی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے علاوہ ہر بیماری کے لئے شفا قرار دیا

ہے۔

کاسنی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا ذریعہ قرار دینے کے علاوہ اسے جنت کے پانی سے فیض یاب فرمایا ہے۔

ان مشاہدات کو سامنے رکھتے ہوئے آنکھوں میں ایسا کی سوزش سے پیدا ہونے والے ہند مساکل کو حل کرنے کے لئے جو پہلا نسخہ مرتب کیا گیا وہ یوں تھا۔

قطہ البحرى 100 گرام

کلو نجی 50 گرام

دب الرشاہ 15 گرام

ان ادویہ کو پیس کر ایک چھوٹا چمچ صبح شام کھانے کے بعد دیا گیا۔ اس کے علاوہ مریض کو صبح نہار منہ 2 بڑے چمچے شد پانی میں حل کر کے اور رات سوتے وقت بڑا چمچ زیتون کا تیل دیا گیا۔ آنکھوں کی تمام سوزشیں 2-3 ہفتوں میں اللہ کے فضل سے ختم ہو گئیں۔

شد کے جگر پر بے پناہ اثرات ہیں۔ جن مریضوں میں جگر کے متاثر ہونے کا اندیشہ پایا گیا ان کے لئے شد کی روزانہ مقدار بڑھا دی گئی۔ شد دینے کا صحیح وقت وہ ہے جب پیٹ خالی ہو۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صبح نہار منہ یا عصر کی نماز کے بعد نوش فرماتے تھے۔ شد آنکھوں کے زخموں کو بھرتا اور جگر کی حرمت میں اہمیت رکھتا ہے۔

جن مریضوں کے جگر میں سوزش یا پھوڑے کا شبہ رہا ان میں نسخہ یوں تبدیل کیا گیا۔

قطہ البحرى 100 گرام

کاسنی کے چم 20 گرام

مندى کے پتے 30 گرام

ان ادویہ کا مرکب بنا کر چھوٹا چمچ صبح شام کھانے کے بعد دیا گیا اس نسخہ میں مندی کی شولیت اس کے جراثیم کش اثرات کی وجہ سے کی گئی۔ ام المؤمنین حضرت

ام سلمہ روایت فرماتی ہیں۔

كَانَ لَا يَصِيبُ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْحَةٌ أَوْ شَوْكَةٌ إِلَّا  
وَضَعَ عَلَيْهِ الْحَنَاءَ (ترمذی، مسند امام احمد)

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں جب بھی کوئی کانٹا چھما یا زخم  
لگا تو انہوں نے ہمیشہ اس پر مندی لگائی)

مندی کے جراثیم کش اثرات ایک سلسلہ حقیقت ہیں۔ محدث عبداللطیف  
بغدادی نے اس کا پانی پلا کر کوڑھ کا علاج کیا ہے۔ ہم نے گلے کی سوزش کے  
مریضوں کو صرف مندی سے شفا یاب کیا ہے۔ حکیم محمد اعظم خان نے اسے چیچٹ میں  
مغیہ پایا۔ یہی ہوئی بازاری مندی میں زہریلے رنگ ملے ہوتے ہیں اس لئے اس کو  
کھانے کے لئے رونا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مندی کے ایسے پتے لئے جائیں جن میں  
رنگ نہ ہو۔ ان کو پیس کر نسخہ میں شامل کیا جائے۔ اور اسی طرح پتوں کی کوپال کر  
زخموں کے علاج میں استعمال کیا جائے۔

## اسہال

(DIARRHOEA)

ایک عام تندرست آدمی کے جسم سے نکلنے والی نجاست کی مقدار اس کی خوراک کی نوعیت اور وزن پر منحصر ہوتی ہے۔ یورپی اقوام کی غذا میں پھوک اور ریٹے دار چیزیں کم ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کے پاخانہ کا وزن اور حجم کم ہوتا ہے۔ جب کہ افریقی اور ایشیائی قوم کی غذا میں سبزیاں اور اناج زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کا پاخانہ مقدار میں زیادہ ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کو جب روزانہ 200 گرام سے زیادہ مقدار میں پاخانہ آئے تو اسے اسہال قرار دیا جاسکتا ہے۔ پرانی قبض کا وہ مریض جسے چھتے میں ایک دو بار مشکل سے اجابت ہوتی ہے اگر اسے دن میں دو مرتبہ ہو تو یہ اسہال ہے۔ اسہال کی عام طور پر ابتدا نیند سے بیدار ہونے پر علی الصبح ہوتی ہے۔ مریض جب صبح اٹھتا تو طبیعت میں گرانی ہوتی ہے۔ بیت الخلاء جانے پر تھکی اجابت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسہال ہو گئے ہیں۔

اسباب

پیش کی طرح اسہال بھی آنسو کی سوزش ہے۔ لیکن پیش پیدا کرنے والے براہیم سے ہونے والی علامات تھوڑی سی شدید ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ جسم اور آنسو کی متعدد بیماریاں ایسی ہیں جن میں کئی مرتبہ اجابت ہوتی ہے جیسے کہ

## 1- غذائی بد اعتدالیاں

بسیار خوری بالخصوص 'گو بھی' پالک، چٹنائی کی زیادتی۔ تم اور تھوڑا اگر زیادہ مقدار میں کھائے جائیں تو اسہال ہو جاتے ہیں۔ 'کھیر' گجریلا، گاڑ کے حلوہ کی زیادتی سے اسہال ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دودھ پینے اور دال کھانے سے اسہال ہو جاتے ہیں۔

## 2- غذائی کمی

وٹامن "ب" کے بعض اجزاء خاص طور پر کلونیک ہسٹ کی کمی کی ایک بیماری PELLAGRA میں اسہال ایک علامت ہے۔

## 3- جلابوں کی کثرت

کثرت سے جلاب لینے والوں کی آنتوں میں مستقل طور پر خیرش رہنے لگتی ہے۔ جس کی بدولت بار بار اسہال ہوتے ہیں۔

## 4- نشاستہ دار غذائیں

زیادہ مقدار میں نشاستہ دار غذائیں پیٹ میں لٹخ پیدا کرنے کے ساتھ اسہال کا باعث بنتی ہیں۔

## 5- آنتوں کی سوزش

جیش، جراثیمی سوزش، پھیپھوندی اور وائرس کی سوزش۔

## 6- طفیلی کیڑے

طفیلی کیڑوں میں کیچوے اور از قسم TAPEWORM - LEISHMANIA - DONOVANI - GIARDIA LUMBALI - HOOKWORM - OXYURIS VERMICULARIS - TRICHIINELLA

SPIRALIS - ROUNDWORM کی متعدد قسمیں اس سال کا باعث ہوتی ہے۔

## 7- آنتوں کی مزمن سوزشیں

آنتوں کے پرانے زخم CROHN'S DISEASE

CANCER STOMACH-ULCERATIVE COLITIS

## 8- ذیابیطس کی اعصابی سوزش

آنتوں کی مقامی حساسیت، ایکسری کی شعاعوں کے بد اثرات، غدہ و رقیہ اور دوسرے غدودوں کی بیماریاں اور آنتوں کے سرطان۔

زہریلے کوفتوں کے شکار

کھانے کی تمام چیزوں میں گوشت سب سے جلد خراب ہوتا ہے۔ گرم موسم میں تو پکا ہوا گوشت بھی تھوڑی دیر بعد کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ بازاروں میں دیکھ کر بیچنے والوں میں سے اکثر کے سالن دو گھنٹوں کے بعد کھانے کے قابل نہیں رہتے۔ جراثیمی حملہ اور موسمی اثرات سے گوشت میں PTOMINE پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کہ دنیا کی خطرناک ترین زہروں میں سے ہے۔ اس زہر کے بد اثرات کا ایک مظاہرہ جون 1993ء میں لاہور میں ہوا۔

مینڈیکل کالج کے ہوسٹل میں مقیم لڑکوں کے لئے کوفتے پکائے گئے۔ غالباً یہ قیہ خراب ہو چکا تھا۔ کھانے والوں کو 24 گھنٹوں سے بھی کم عرصہ میں قے اور اسہال شروع ہو گئے۔

36 گھنٹوں کے اندر 100 سے زائد لڑکے بیمار ہو کر میو ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر لڑکوں کو مزید علاج کے لئے سرسبز ہسپتال بھیج دیا گیا۔ کیا میو ہسپتال کی اونچی دوکان میں جیٹ کی اس عام بیماری کے علاج کا بندوبست نہ تھا؟ اور یہ لڑکے دو دن میں شفا یاب کیوں نہ ہوئے؟ بد قسمتی یہ ہے کہ ان مریضوں میں سے ایک لڑکا 26 جون کو فوت ہو



کیا۔ کالج کے پرنسپل صاحب کا کہنا ہے کہ یہ لڑکا ہوٹل میں نہیں رہتا تھا۔ اور اس نے دوسروں کے ساتھ کوفتے نہیں کھائے تھے۔ جبکہ لڑکوں کا اصرار ہے کہ اس نے زہریلے کوفتے کھائے تھے اور وہی اس کی ہلاکت کا باعث ہوئے۔

معلوم ہوتا ہے کہ علوم طب کے یہ جید استاد تھے اور اسہال کی وجہ سے جسم سے خارج ہونے والے پانی کی کمی کو پورا کرنے والے محلول کا صحیح انتخاب نہ کر سکے۔

### علامات

اگر دستوں کی مقدار زیادہ ہو اور لیس وار کم ہو تو یہ چھوٹی آنت کی بیماری کو ظاہر کرتی ہے اور اس سے الٹ کا مطلب بڑی آنت کی سوزش ہوتی ہے۔  
کبھی اسہال اور کبھی قبض آنتوں میں سرطان، چھوٹی آنت کی مزمن سوزش، انتڑیوں کی تپ دق یا قبض کشا ادویہ سے پیدا ہونے والی خرابیوں سے ہوتے ہیں۔  
معدہ کی سوزش سے ہونے والے اسہال میں کھانا کھانے کے فوراً بعد اجابت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ موسمیاتی اسہال میں منہ میں جانے والی ہر چیز آنتوں پر وزن ڈال کر نئی اجابت کا باعث بنتی ہے۔

بخار اسی صورت میں ہوتا ہے جب آنتوں میں سوزش زیادہ ہو۔ اور اسہال پرانا ہو جائے اور اس کے ساتھ وزن میں کمی نہ آئے تو یہ آنتوں میں زخموں کی وجہ سے ہے جب کہ وزن میں کمی لانے والی کیفیت جسم کے اندر کسی شدید خرابی کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ ہیٹ کے نچلے حصہ میں قونجی درد سے مراد آنتوں میں رکاوٹ ہوتی ہے لیس وار پکٹائی سے بھرے ہوئے پاخانے بدن کی سوزش یا آنتوں کی تپ دق میں آتے ہیں۔

ہیٹ میں مستقل اچھارہ، سرطان، بڑی آنت میں زخم اور تپ دق میں ہوتا ہے۔  
عام حالات میں مریض کو بار بار اجابت ہوتی ہے جس کے ساتھ درد یا قونج نہیں ہوتا چار دستوں کے بعد کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر پانی کی کمی کی علامات کے ساتھ بلڈ پریشر میں کمی اور پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ آنکھیں اندر کو دھنسن کر کمزور

نبض بے ہوشی اور موت کا باعث ہو سکتے ہیں۔

اسماں خواہ کسی بھی بیماری کے باعث ہو علامات اور انجام یکساں ہوتے ہیں۔ اگر ساتھ میں تے بھی ہو رہی ہو تو انجام زیادہ جلد قریب آ جاتا ہے۔

غذا جب آنتوں میں جاتی ہے تو ہضم کے بعد وہ ایک خصوصی شکل میں آنتوں کے راستے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسماں، پیچش اور پیضہ میں یہ عمل الٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی غذا اور پانی جسم کے اندر داخل ہونے کی بجائے جسم کا اپنا پانی تمکیات مسلسل خارج ہونے لگتے ہیں۔ یہ ابھی تک صحیح طرح معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ سارا عمل کس طرح الٹ جاتا ہے اور نہ ہی ایسی کوئی ترکیب معلوم ہو سکی ہے جس سے آنتوں کو پہلے والے عمل پر واپس لیا جاسکے۔ البتہ قدرت خود ہی مرہانی فرما کر یہ سلسلہ ایک مقام پر ختم کر دیتی ہے۔

## تشخیص

اسماں ایک علامت ہے۔ یہ ایک عام سی بیماری میں عام طور پر آتے ہیں۔ مگر یہ آنتوں میں زخموں سے لے کر سرطان تک کی علامت بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ دست آنے کو معمولی نہ سمجھا جائے لیکن دیرات میں جہاں تشخیص کے ذرائع میسر نہیں یا ایک غریب ملک کے نیم فاقہ کش لوگوں کو منگے اور طویل تشخیصی مراحل سے گزارنا بھی عقل مندی نہیں۔ اس لئے ہر مریض کو ابتدا میں معمولی سمجھا جائے اور اگر ایک معقول عرصہ میں بیماری قابو میں نہ آئے تو پھر اضافی مشقت کا جواز موجود ہے۔

1۔ پاخانہ کا عام معائنہ کسی بھی نیسٹ کرنے والی لیبارٹری میں ممکن ہو سکتا ہے۔ آج کل یہ کلام 15-20 روپے میں ہو جاتا ہے۔ اس نیسٹ سے پیپ کی مقدار اور پاخانہ میں خون سے سرطان کی موجودگی کا پتہ چل سکتا ہے۔ پیٹ میں اگر کیرے بھی ہوں تو وہ ایک مرتبہ لگاتار معائنہ سے ان کا سراغ بھی مل جاتا ہے۔

2۔ اگر عام نیسٹ میں جراثیم کی موجودگی کا پتہ چلے اور یہ بھی ظاہر ہو کہ اس میں پیپ کی خاصی مقدار ہے مگر عام علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا تو پاخانہ کا

CULTURE SENSITIVITY ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے لئے ٹیسٹ کی لیبارٹری سے جراثیم سے پاک مصفا نیوب لی جائے اور پاخانہ کی تھوڑی سی مقدار براہ راست اس نیوب میں کی جائے۔ اور یہ نیوب جلد از جلد لیبارٹری پہنچا دی جائے۔ لیبارٹری یہ بتائے گی کہ اس میں جراثیم کی کون کون سی قسمیں ہیں اور ان کو مارنے کے لئے کونسی دوائیں کارآمد ہوں گی۔

3. اگر بالائی ٹیسٹ سے معلوم ہو کہ پاخانہ میں جراثیم نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنتوں میں زخم ہیں یا رکاوٹ ہو گئی یا سرطان کی کوئی قسم خرابی کا باعث بن گئی ہے۔ ایسی صورت میں آنتوں کا ایکسری کیا جاتا ہے۔ آنتیں ایکسری میں نظر نہیں آتیں۔ اس لئے مریض کو کوئی ایسی دوائی پلائی جاتی ہے جس سے ایکسری کی شعاعیں گزر نہ سکیں۔ اس کے لئے BARIUM کا ایک مرکب کافی مقدار میں پلایا جاتا ہے۔ مگر اس کا انتخاب بڑی احتیاط سے کیا جائے کہ لاہور کے ایک سینما کے سینگر کو جسے اس قسم کے ایکسری کا مشورہ دیا گیا ڈاکٹر نے جلدی میں پورا نام لکھنے کی بجائے BARIUM SULPHIDE لکھ دیا۔ دوا فروش نے اسے BARIUM SULPHATE لینا دے دیا، جو خطرناک زہر ہے۔ حقیقت میں اس نے BARIUM SULPHATE لینا تھا۔ وہ بے چارہ ایکسری سے پہلے ہی وفات پا گیا۔

ایکسری سے آنتوں کے زخم، آنتوں میں رکاوٹ اور تپ دق کا پتہ چل سکتا ہے۔ لیکن یہ سوزش بتانے کے قابل نہیں۔ ایکسری کا عمل 18 گھنٹے پر محیط ہوتا ہے اور خرچ ضرورت سے زیادہ ہونے کے باعث عام طور پر اس کی سفارش نہیں کی جاتی۔

4. PROCTOSCOPY ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ اس میں ایک 4 انچ لمبا آلہ مقعد میں داخل کر کے مہملوں کو براہ راست دیکھا جاسکتا ہے اگر بڑی آنت کے آخری حصہ میں سوزش ہو یا وہاں پر سے وغیرہ ہوں تو اس طریقہ سے چند منٹوں میں جواب مل جاتا ہے۔

5. SIGMOIDOSCOPE کا آلہ 18-24 انچ لمبا ہوتا ہے جو نیچے سے اندر داخل

کر دیا جاتا ہے۔ اس میں چیزوں کو بڑا کر کے دکھانے اور روشنی کا ہندوستان ہوتا ہے۔ اس نلکہ کی مدد سے بڑی آنت کے آخری حصہ میں براہ راست دیکھا جاسکتا ہے۔ آنتوں کے زخم، ان کی رسولیاں، مچلیوں کی سوزش اور مے براہ راست تشخیص کئے جاسکتے ہیں ضرورت پڑنے پر زخم کا مواد ٹیسٹ کرنے کے لئے یا کسی رسولی کا ٹکڑا کالٹ کر نکالا جاسکتا ہے۔ تاکہ اس کا مزید معائنہ کیا جاسکے۔

پیچیدہ مریضوں میں آنتوں کی صورت جان کا پتہ چلانے کے لئے یہ ایک مفید اور کارآمد آلہ ہے مگر یہ قسطنطینیہ یہ ہے کہ ہسپتالوں کا عملہ اپنی تن آسانی کی وجہ سے اس کو کام میں کم ہی لاتا ہے۔ کیونکہ وہ اس سے ذاتی منفعت کی امید رکھتے ہیں۔

ایک شد یافتہ معالج یہ پتہ چلا سکتا ہے کہ مریض کے کون سے حصہ میں خرابی ہے اور اسی مناسبت سے اس کے ٹیسٹ کئے جائیں۔ درجہ اسہال کے سلسلہ میں بلبہ اور جگر کے افعال کا جائزہ لینا بھی مناسب ہوتا ہے مگر یہ سارے ٹیسٹ مریض کا دیوالیہ نکال دیں گے۔

### علاج

بنیادی طور پر اسہال میں ہر وہ دوائی مفید ہے جو پیچش کے لئے دی جاتی ہے۔ اگرچہ اسہال کی کیفیت سوزش کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ ابتدا میں فرق یا باعث کا پتہ چلانا ممکن نہیں رہتا۔ اس لئے آنتوں کو سکون دینے والی ادویہ کے ساتھ ساتھ جراثیم کش ادویہ بھی شامل کر دی جائیں۔ تو معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم کو جب مشرقی پاکستان اور پاکستان میں فسادات کے دوران ہزاروں مریضوں کا علاج کرنا پڑا تو ہم چار بڑے جچے KAOLIN میں ایک ٹنکہ سٹرپٹومائی سین STREPTOMYCIN ملا کر لوگوں کو دے دیتے کہ وہ ایک چھچھو دوائی کو پانی کے ایک پیالہ میں حل کر کے تھوڑا تھوڑا پیتے جائیں۔ عام طور پر اکثر ایک سے دو دن میں شفا یاب ہو گئے۔

اسہال کو روکنے کے لئے LOMOTIL کے نام سے ایک دوائی بڑی مشہور ہوئی اسے متعدد اقسام کی گولیوں اور شربتوں میں شامل کیا گیا۔ اس کا NEOMYCIN کے ساتھ شربت بھی تیار ہوا۔ مگر اب معلوم ہوا کہ یہ جگر کو خراب کرتی ہے۔ اس لئے

اظہار ہے۔ اگرچہ اس کی فروخت بند ہو چکی ہے لیکن دوا ساز ادارے دیکھتے ہیں کہ فروخت کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ATAPULGITE برآمد ہوئی۔ ابھی تک اس کی افادیت پر شبہ کا اظہار سننے میں نہیں آیا۔ متعدد شربت اور گولیاں اسی کی شمولیت سے بنے ہیں۔ عام طور پر مفید دوائی ہے۔

بازار میں KLAOLIN کے جتنے مرکبات ملتے ہیں ان میں سے کوئی بھی بار بار دیا جائے اور اس کے ہمراہ کوئی بھی جراثیم کش دوائی دینی کافی ہوگی۔

### یونانی ادویہ

طب یونانی میں ایسی ادویہ کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جو اسماں کے خلاف مفید ہے۔ ان میں سے اکثر کی افادیت TANNIC ACID کی موجودگی کی وجہ سے ہے۔ جیسے کہ آبنوس، حب آلاس، اشوک، افی، انار، اندر جوتخ، بارنگ، کیکر، برگد، بلوط، بھیرہ، تیلی پھل، پھیل، جامن، خشکاش، حاض، ترنج، دم الاخوین، صندل سرخ، طباشیر، کاکڑا، تلی، کتھا، کنول، گل دھلوا، گل سرخ، گندنا، لودہ پٹھانی، لیون، ماتیس، موچرس، میدہ لکڑی، زیادہ مشہور ہیں۔ بھارتی ماہرین نے اسمال کے علاج کا ایک نسخہ تجویز کیا ہے۔

انجیر خشک (توز کر)	2 اونس
منقی (توز کر)	2 اونس
سنوف ملٹھی	2 چمچے چائے والے
جو کا پانی	2 سیر
سادہ پانی	1 سیر

ان کو اس وقت تک پکائیں جب یہ آدھ رہ جائے۔ چائے کی آدھ پیانی دن میں 2-3 مرتبہ پلائی جاتی ہے۔ اس نسخہ میں انجیر اور منقی اگرچہ طب نبوی سے ہیں مگر ان کی اس غرض سے شمولیت شاید اسمال میں اضافہ کا باعث ہو۔ ان کی بجائے انار کا پانی یا سیب کا عرق زیادہ مفید ہیں۔

## طب نبوی

۱۔ حضرت ابوسعید الخدریؓ روایت فرماتے ہیں:

قد جاء رجلا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي  
استطلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا  
- فسقاء ثم جاء فقال سقته فلم يزد الا استطلاقا فقال له ثلث  
مرات ثم جاء انرا بخته فقال اسقه عسلا فقال لقد سقته فلم يزد  
الا استطلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله و  
كذب بطن اخيك فسقا فبرا (بخاری و مسلم)

ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان  
کیا کہ میرے بھائی کو اس سال ہو رہے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا کہ شہد پلاؤ۔ وہ  
پھر آیا۔ اور مطلع کیا کہ دستوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسے پھر شہد ہی کی  
ہدایت کی گئی اور اس طرح وہ تین مرتبہ اضافہ کی شکایت لے کر اور شہد  
پینے کی ہدایت لے کر چلا گیا۔ جب وہ چوتھی مرتبہ آیا اور شہد کا پھر سے  
سنا تو بولا کہ اس سے تو اس سال بڑھتے جاتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ  
جھوٹ کتا ہے (ان کا اشارہ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف تھا جس میں  
شہد کو شفا کا منظر قرار دیا گیا ہے) اور وہ تندرست ہو گیا۔

علم الادویہ اور اپنے افعال کے لحاظ سے شہد طین بھی ہے اور زخموں کو مندل  
کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لئے شہد کو بار بار دینے سے پہلے تو پیٹ میں جمع  
جراثیم کی TOXINS خارج ہوئیں اور پھر اس نے جراثیم کو ہلاک کیا۔ اور اس  
طرح مریض کے شفا یاب ہونے میں اگرچہ ابتدائی طور پر کچھ وقت لگا۔ لیکن اس  
وقت کا ہر حصہ مریض کی صحت کی بحالی کے لئے ضروری تھا۔ شہد جراثیم کو مارتا اور  
موتی ہے۔ پرانے ڈاکٹر پچیش کے علاج کی ابتداء کسٹرائل سے کرتے تھے تاکہ

زہریں نکل جائیں۔ اس سال کے علاج میں اہم ترین مسئلہ اور ضرورت سبب کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ مریض کے جسم سے نکل چکے نمکیات اور پانی کی کمی کو پورا کرنا ہے۔ شدہ وہ عظیم اور منفرد دوا کی ہے جو کمزوری کو دور کرتی ہے پانی اور نمکیات کی کمی کو پورا کرتی ہے اور جراثیم کو ہلاک کر کے سنتوں اور زخموں کو مندمل کرتی ہے۔

لاہور میں بیضہ کی ایک شدید دوا کے دوران خاکسار کو بھی اس سال ہو گیا۔ چونکہ اس بیماری کا کنٹرول ہماری منہمی ذمہ داری تھی اس لئے متعدی امراض کے ہسپتال کے سپرنٹنڈنٹ سے برائیل تذکرہ بات ہوئی کہ میں بھی لپیٹ میں آیا۔ انہوں نے اپنے آوی کو مناسب ادویہ لائے کی ہدایت کی تو میں نے ان کے استعمال سے انکار کرتے ہوئے صرف شدہ پر گزارا کرنے کا خیال ظاہر کیا۔ وہاں پر موجود تمام ڈاکٹرز بس پڑے۔ چنانچہ اتمام حجت کے لئے میں ان کے دفتر میں اس وقت تک بیٹھا رہا جب تک کہ شدہ پی کر تندرست نہ ہو گیا۔

علاج کی ترکیب یہ تھی

پانی کے گلاس میں 2 چمچے شدہ ڈال کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ کام بھی ہوتا رہا اور گھونٹ گھونٹ شدہ بھی پیا جاتا رہا۔ جب ایک گلاس ختم ہوا تو دوسرا آگیا۔ 12 بجے دوپہر سے شام 5 بجے تک تین گلاس شدہ پیا گیا۔ دوسرے گلاس کی ابتدا میں ایک اجابت مزید ہوئی اور اس کے بعد پھر چمین آگیا۔ جینٹ کا بوجھ پہلے گلاس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ جب ہسپتال سے باہر نکلے تو جسم میں نہ کوئی جھکن اور نہ ہی بیماری کے بعد کمزوری کا کوئی نشان تھا۔

ڈاکٹروں کو یقین نہ تھا کہ اتنی شدید تکلیف کسی جراثیم کش دوائی کے بغیر محض شدہ پینے سے ختم ہو سکتی ہے۔ اس لئے تندرستی تک کا عرصہ ان کے درمیان گزارا تاکہ ان کو اطمینان رہے کہ دوسری کوئی دوائی نہیں

کھائی گئی۔ اس مشاہدے کے بعد بیضہ اور پچیش کے سینکڑوں مریضوں کو شدہ پلایا گیا اور وہ کسی علاج کے بغیر شفا یاب ہوئے۔ اسی قسم کا ایک مظاہرہ ڈھاکہ میڈیکل کالج میں بھی دکھایا گیا۔

اس سال کے لئے شدہ سے بہتر، مفید، یعنی اور موثر کوئی دوائی نہیں۔

- 2- پچیش کے علاج کے سلسلہ میں لعاب کی دانہ اور شدہ کے مرکب کا تحصیلی تذکرہ کیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ نسخہ بھی شدہ کے جامع کمالات کی بنا پر افادت رکھتا ہے۔
- 3- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کو جہاں کتنی ہی مفید ادویہ عطا فرمائیں وہاں پر ایک تحفہ بھی پھل بھی ہے۔ انہوں نے اسے دل کی بیماریوں، جسمانی کمزوری اور والو VALVES کی بیماریوں میں اکسیر قرار دیا ہے۔ اسی پھل کے بیج نسخوں میں اس سال کے لئے استعمال کئے گئے۔ انیسویں صدی میں بنگال میں مطلب کرنے والے یورپی ڈاکٹروں کو جب آنکھوں کی سوزشوں کے مریضوں سے سابقہ پڑا اور ان کی طب میں اس کا شافی علاج نہ ملا تو انہوں نے ہی کو استعمال کیا۔ ان ڈاکٹروں کے تجربات اور بھارتی حکومت کے محکمہ طب کے مشاہدات کی روشنی میں ہی کو اس سال کے علاج میں بڑے اعتماد کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

- ا۔ تازہ ہی پھل جو ابھی تھوڑا کچا ہو چھلکے سمیت کاٹ کر پانی میں ڈال کر خوب ابالیں۔ اس کا یہ خوشامدہ تھوڑا تھوڑا کر کے بار بار پلائیں
- ب۔ کچے ہی پھل کو چو لہے کی بھو بھل میں رکھ کر بھون لیں۔ جب سرخ ہو جائے تو نکال لیں۔ اس کا گودا نکال کر 20-40 گرام صبح نہار منہ کھاتا پرانے اس سال میں مفید ہے۔

- ج۔ یہی کا گودا نکال کر اس کو شدہ اور پانی میں ملا کر اچھی طرح بلوئیں۔ اگر تھوڑی مقدار میں ہو تو ایک دو دن میں استعمال کر لیں۔ زیادہ مقدار ہو تو ابال کر رکھیں۔
- د۔ یہی کا گودا نکال کر اس کو دھوپ میں رکھ کر خشک کر لیں۔ پھر اسے پیس کر ٹین کے ڈبہ میں بند کر کے رکھ لیں۔ حسب ضرورت آدھ چھوٹا چمچ دن میں 4-2 مرتبہ پانی کے ہمراہ دیں۔



## بہی کا شربت

بھارتی ماہرین نے بہی کو مسل کر پانی اور کھانڈ ملا کر شربت بنانے کا نسخہ بیان کیا ہے۔ اٹھا کے خیال میں یہ شربت اسمال اور جھپٹس کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے۔ بہی کا شربت یا بہی کا گودا نمار منہ کھانے سے وہاں کے دنوں میں ہیضہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ بعض اطباء کا خیال ہے کہ اس شربت کو پیتے سے اسمال اور ہیضہ کے بعد کی کمزوری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔

بھارتی اطباء سے 500 سال پہلے حافظ ابن القیم نے بہی کا مرہ بنانے کی ترکیب بیان کی ہے۔ وہ بہی کو دھو کر اس کی چھوٹی چھوٹی قاشیں ملا لیتے ہیں اس کے بعد ان کو پانی میں ڈال کر خوب ابالیں۔ جب یہ نرم پڑ جائیں تو شد ملا کر اس طرح پکائیں جیسے مرہ یا شربت کی تار بنائی جاتی ہے۔ جب تار بندھ جائے تو اتار کر مصفا برتنوں میں محفوظ کر لیں۔ یہ مرہ اور اس کا شربت نمار منہ پینے سے پیٹ سے اسمال اور دل سے بوجھ اتر جاتا ہے۔ ایک حدیث سے قیافہ لگتا ہے کہ اگر یہ شربت حاملہ عورت پیئے تو اس کے یساں لڑکا پیدا ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے۔

بھارتی وید بھی کے ساتھ اورک، کتمہ، اجوائن، انار کا چھلکا، آم کی گھٹلی کا مغز اور سیپاری ملا کر اسمال کے لئے سفوف بناتے ہیں۔ ان کو شامل کرنا برا نہیں۔ لیکن یہ بذات خود اتنی منید ہے کہ دوسرے اضافوں کی ضرورت نہیں رہتی۔

## بچوں کا اسہال

### INFANTILE DIARRHOEA

بچوں کو دست آنے ایک معمول کی بات ہے۔ اکثر ماہیں دو چار دست آنے کو اہمیت نہیں دیتیں۔ وراثت نکلنے پر دست معمول کی بات سمجھی جاتی ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ بچے کو دست اسی وقت آتے ہیں جب اس کے پیٹ میں جراثیم باہر سے داخل ہو جائیں۔ چونکہ بچہ از خود باہر جا کر کوئی ٹنڈی چیز نہیں کھا سکتا اس لئے بچے کو دست آنے اس کی ماں کی لاپرواہی یا حالات سے ناواقفیت کا مظاہرہ ہے۔

### فیڈر اور چوسنی

بچوں کو بیمار کرنے میں جو کماں چوسنی کو حاصل ہے وہ کسی اور چیز کو نہیں۔ ماہیں بچوں کو مصروف رکھنے یا خود کو فراغت دلوانے کے لئے بچے کے منہ میں چوسنی دے دیتی ہیں۔ کچھ بچوں کے گلے میں دھاگہ ڈال کر چوسنی مستقل لٹکتی رہتی ہے۔ جہاں وہ رویا چوسنی منہ میں دے دی اور وہ مطمئن ہو گیا۔ اسی لئے انگریزی میں اسے BABY SOOTHERS کہتے ہیں۔ بچوں کو سکون یا اطمینان دلانے والا یہی ذریعہ ان کے پیٹ میں جراثیم کے دخول کا باعث بنتا ہے۔ وہ اس طرح کہ منہ میں چوسنی یا فیڈر دیتے وقت ماں کے ہاتھ نیل پر ضرور لگتے ہیں بلکہ دینے سے پہلے نیل کو دبا کر بھی دیکھا جاتا ہے۔ چونکہ کسی کے ہاتھ کبھی بھی جراثیم سے پاک نہیں ہوتے۔ اس لئے آلودہ ہاتھ چوسنی کو جراثیم آلود کر کے بچے کے گلے اور پیٹ میں سوزش کا آغاز

کرتے ہیں۔ اور یہ سوزش ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔

میوہپتال کے شعبہ امراض اطفال کی پروفیسر قمیدہ طیلل صاحبہ کے پاس جب بھی کوئی بچہ کسی بھی بیماری کے سلسلہ میں آتا ہے وہ سب سے پہلے اس کے گلے سے چوسنی اتار کر اپنے کمرے میں لٹکا دیتی ہیں اور اسی طرح ان کا دفتر رنگ رنگ کی چوسنیوں کا عجیب گھر بن گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چوسنی والا بچہ کبھی تندرست نہیں رہ سکتا۔ اس کا گلا ہمیشہ خراب رہتا ہے۔ اس کے حلق اور پیٹھڑوں میں سوزش کی وجہ سے کھانسی مستقل رہتی ہے۔ جب یہ جراثیم آلود تھوک یا بلغم بیٹھ میں جاتے ہیں تو اسہال ہوتا ہے۔

چار ماہ کی عمر تک بچے کی جسمانی اور غذائی ضروریات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس عمر کے بعد اسے دودھ پر رکھنا اسے فائدہ دینے کے مترادف ہے۔ دودھ کے علاوہ اسے ٹھوس غذا کی ضرورت رہتی ہے۔ جس میں دلیا، آلو، کیڑا، کھجور وغیرہ شامل ہیں۔ بعض بچے سنے (الٹول) کو آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ ان کو عادت پڑنے میں دو ایک دن لگتے ہیں۔ مائیں جب یہ دیکھتی ہیں کہ وہ کچھ نہیں کھا رہا تو اس کو زبردستی دودھ کی بھرتی دیتی ہیں۔ سوتے میں اس کے منہ میں فیڈر دیا جاتا ہے۔ فیڈر کی چوسنی اور اس کے اندرونی حصہ جراثیم کے انہم مراکز ہیں۔ 10-12 سال کے لاولے بچوں کو فیڈر سے دودھ پیتے دیکھا گیا ہے۔ کھانسی اور اسہال کا مستقل شکار ہونے کے ساتھ ساتھ چوسنی پر دباؤ رکھنے کی وجہ سے ان کے سامنے کے دانت اور تالو نیڑے ہو جاتے ہیں۔

فیڈر کو صاف رکھنے کے لئے اسے ابالنے کا طریقہ درست ہے۔ مگر اس عمل میں چوسنی کا رز خراب ہو جاتا ہے۔ کیلادوی جراثیم کش ادویہ سے فیڈر صاف ہو سکتا ہے مگر ان کا جسم کے اندر جانا مناسب نہیں۔۔۔ اس ساری مصیبت کا آسان حل یہ ہے کہ فیڈر صرف مجبوری کی حالت میں دیا جائے اور جیسے ہی بچہ قبول کر سکے اسے پیلا، گلاس یا پیچ کے ساتھ دودھ پلائیں۔ بلکہ دودھ کی بجائے اس کے مرکبات از قسم سویا، کنسرو، کارن ٹیور وغیرہ دیں جن میں دودھ کے ساتھ ٹھوس اور مقوی

غذائیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ چھ سنی کا استعمال کسی طور جائز اور محفوظ نہیں۔

## اسہال کی قسمیں

### بسیار خوری

بچوں کو ضرورت سے زیادہ کھلانے، خاص طور پر زیادہ دودھ پلانے یا گاڑھا دودھ پلانے سے چھٹائی کی زیادتی سے دستوں میں دہی کی مانند بھٹیاں ہوتی ہیں اور بدبودار۔ جب یہ غذا نشاستہ کی زیادتی سے سبزی مائل، جھاگ والے دست آتے ہیں۔ بعض اوقات کسی خاص قسم کی غذا سے حساسیت ہو جانے کی وجہ سے بھی اسہال ہو جاتے ہیں۔

### سوزشی اسہال

اگر وائرس کی وجہ سے ہو تو پہلے کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اسہال ہوتے ہیں۔ عام طور پر RORWALK VIRUS POLIO CALCIVIRUS COCKSACKIE ECHOVIRUS ROTAVIRUS YARSINIA COMPILO POACTER میں جراثیم کے جراثیم اسہال پیدا کرتے ہیں۔ جب کہ جراثیم میں KLABSICELLA SHIGELLA ECOLI SALMONELLA اسہال کا باعث بنتے ہیں۔

### پرانا اسہال

ہیٹ میں رہنے والے طفیلی کیزے جیسے کہ TAPE WORM GIARDIASIS WHIP WORM ROUND WORM کی وجہ سے ہوتا ہے۔

### علامات

بچے کے پاخانے تعداد میں بڑھنے لگتے ہیں۔ پھر ہلکا بخار اور تے شامل ہو جاتے ہیں۔ دستوں کا رنگ سبزی مائل، بدبودار کافی مقدار میں اور ٹیس آئیز ہوتا ہے۔

روزانہ تعداد 12 تک جا سکتی ہے۔ زیادہ بیمار بچوں میں دستوں کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ان کا رنگ سفید اور اجابت بدبو دار ہو جاتی ہے۔ پیاس، خشک ہونٹ اور زبان جسم کا پانی نکل جانے کا پتہ دیتے ہیں۔ اس سال کے ذریعہ جسم کا پانی مزید نکلے تو تالو اندر کو دب جاتا ہے۔ آنکھیں اندر کو دب جاتی ہیں۔ چہرے کی ہڈیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ ناخن اور ہونٹ نیلے پڑتے ہیں تو سانس اور نبض تیز ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلہ پر بخار یا تو بہت بڑھ جاتا ہے یا اعتدال سے بھی گر جاتا ہے۔

بعض بچوں میں تیز بخار کے ساتھ خستہ دورے پڑتے ہیں۔ پچھلے ہوش لگتا ہے۔ اپنی سادہ بدھ کھو دیتا ہے۔ پیشاب بند ہو جاتا ہے اور موت دو قدم کے فاصلے پر آ جاتی ہے۔ دستوں میں خون یا میس کی آمیزش سے آنٹوں میں سوزش کا پتہ چلتا ہے یا اس کا مطلب ہے کہ دوسری چیزوں کے علاوہ جراثیم کش ادویہ بھی دی جائیں۔

### علاج

اس سال میں مبتلا بچوں کو علاج کی ضرورت بلاشبہ ہوتی ہے مگر ان کی اصل ضرورت پانی کی کمی کا فوری بندوبست ہے۔ بچے کو خواہ دو ایک دن مناسب علاج میسر نہ آئے لیکن پانی یا پانی اور نمکیات کی کمی کو پورا کرنے والے سیال مسلسل دیئے جاتے رہیں۔ ہمارے ملک میں بچوں کے لئے سوئف اور الایجی کے ساتھ نمک اور کھانڈ ابال چھان کر چمچہ چلانا آسان ترکیب ہے۔ ورنہ مجبوری میں بچے کو چھانچہ، چاولوں کی بچھ، جو کا پانی یا کوئی سیال دیا جاسکتا ہے۔

عالی ادارہ صحت نے ایسے بچوں کے لئے ORS کا نسخہ بنایا ہے۔ یہ سوئف تمام سرکاری ہسپتالوں، زچہ خانوں، خاندانی منصوبہ بندی کے مراکز اور مراکز ٹیکہ سے مفت ملتا ہے۔ اس کا ایک نسخہ ہم پیسے عرض کر چکے ہیں دوسرا مشہور نسخہ یہ ہے۔

SODIUM CHLORIDE 3.5gm (عام خوردنی نمک)

SODIUM BICARBONATE 2.5gm (سوڈا پانی کا رب)

POTASSIUM CHLORIDE 1.5gm

GLUCOSE 20gm (گلوکوس)

اس مرکب کو ایک سیر صاف پانی میں حل کر کے بچے کو دن بھر پلایا جائے۔ یاد رہے کہ اس مرکب کو اگر گرم کیا جائے تو زہریلا ہو جاتا ہے اور پانی میں گھولنے کے بعد دوسرے دن تک پڑا رہے تو بھی زہریلا ہو جاتا ہے۔ اگر سارا پانی ایک دن میں نہ پیا جاسکے تو بلایا رات کو پیمینک دیں۔ اگر گلوکوس میسر نہ ہو تو اس کی جگہ 40 گرام چینی ڈالی جاسکتی ہے۔

بھارتی ماہر ڈاکٹر گولوالا نے ملکی حالات کے مطابق ایک آسان نسخہ بیان کیا ہے۔ گلاس میں چار اٹھی کے برابر پانی ڈال کر اس میں دو چمکی نمک اور چار چمکی کھانڈ ملا کر اس میں لیوں کا تھوڑا سا پانی ڈال دیں۔ اس کا ذائقہ آئسوڈز کی طرح کا ہونا چاہئے۔ یہ پانی ORS کا بہترین نعم البدل ہے۔

امراض اطفال کے پاکستانی ماہر ڈاکٹر واسطی نے دستوں میں جھلا بچوں کے لئے نمکیات کا ایک نہایت عمدہ سیال تیار کیا تھا۔ ORS سے ہر لحاظ سے زیادہ مفید اور جامع تھا۔ مگر ہماری حکومت نے اپنے ملک میں اس کو رائج نہ کیا کہ ہمارے یہاں باہر کی چیزوں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اور پاکستانی ہونا ڈاکٹر واسطی کی ترقی اور شہرت کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔

اگر بچے کی مقدار اتنی بڑھ جائے کہ دو دو منٹ کے بعد آنے لگے یا آنٹوں میں رکاوٹ پڑ جائے تو ایسے میں ORS دینا مضر ہوتا ہے۔

اس سال کے دوران بچے کو معمول کی غذا اسی طرح دی جائے۔ کمزوری اور قبض پیدا کرنے کے لئے سیب کا جوس یا سیب سے بنی ہوئی غذاؤں جیسے کہ APLONA دی جاتی ہیں۔ کیلا اور تلی کھجڑی بھی دیئے جاسکتے ہیں۔

ادویہ

وہ تمام ادویہ جو پیش اور اس سال کے سلسلے میں بیان کی گئیں بچوں کو بھی دی جا سکتی ہیں۔ ان میں بچوں کے لئے خصوصی خوش ذائقہ شربت بھی ہوتے ہیں۔ پرانی ادویہ میں سلفا ڈالیا زین اب بھی شہرت رکھتی ہے۔

ذاتی کی کمی اگر زیادہ ہو تو اس کو پورا کرنے کے لئے DRIP لگائی جاسکتی ہے۔

مگر یہ کام بڑے احتیاط سے اور ایسے اواروں میں ہونا چاہئے جہاں خون کے خصوصی ٹیسٹ کرنے کا انتظام ہو۔ کیونکہ اس امر کے چشم دید گواہ موجود ہیں کہ مریض کی حالت کے مطابق اگر گھوکوس وغیرہ کے انجکشن کا نسخہ تبدیل نہ کیا جائے تو اسی سے موت واقع ہو سکتی ہے۔

پروفیسر فمیدہ جلیں صاحبہ میو ہسپتال میں بچوں کی بیماریوں کے شعبہ کی سربراہ ہیں انہوں نے بچوں کے اسہال اور اس کی روک تھام کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت رسالہ 'تالیف کیا۔ جس کے کارآمد اقتباسات کا خلاصہ یہ ہے۔

### اسہال کے اسباب

کبھی 'مگر' مٹی سے آلود کھانے پینے کی چیزیں۔

اسہال کی سب سے بڑی وجہ چوستی ہے۔ دانت نکالتے وقت منہ میں رکھنے والے چمچے۔ کھانے پینے کے برتن اور اگر کھلے رہیں تو ان پر کھیاں بیٹھتی ہیں۔

بچے گھیموں اور ٹالیوں پر پاخانہ کرتے ہیں۔ گندے پانی کے ذخیروں میں سے گلے ہوئے پانی کے پائپ جب گزرتے ہیں تو پیشہ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔

سوکھے اور کمزور بچوں میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ اس لئے وہ بار بار بیمار ہوتے ہیں۔

اسہال کی وجہ سے جسم کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔

### جسم کا پانی خشک ہونے کی علامات

جب بچے کو روزانہ دس یا اس سے زیادہ دستہ جائیں اور وہ پانی جیسے پیتے ہوں تو اس سے پانی کی کمی ہو جانا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ جس کی علامات یہ ہیں۔

زبان اور ہونٹ بالکل خشک، اندر دھنستی ہوئی 'شکھیں' آنسو خشک، جلد کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ جلد کی چمکی بھر کے کھینچ کر چھوڑ دیں تو وہ واپس اسی وقت پہلی حالت پر نہیں جاتی۔ پیشاب کم یا بند ہو جاتا ہے۔ چہرے کی رنگت 'نہری' پہلی، تاہم اندر دھنستا ہوا۔ وزن میں تیزی سے کمی، مہموری اور کمزور سانسوں کے ساتھ

تے اور بخار بھی ہو سکتے ہیں۔

ان تمام میں کسی بچے میں کوئی سی تین نشانیوں موجود ہوں تو اس کو پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ (یہ کمی صرف پانی کی نہیں بلکہ نمکیات کی بھی ہو سکتی ہے)

### پانی کی کمی کا علاج

ORS یا نمکول کا پیکٹ ایک سیرپانی میں حل کر کے اسے دن میں پلا دیں۔ اگر پیکٹ میسر نہ ہو تو۔ نمک دو چمکی۔ میٹھ سوڈا ایک چمکی۔ چینی ایک مٹھی۔ ان سب کو ایک سیرپانی میں حل کر لیں۔ اس محلول کو ایسا خطرناک ہے۔ اسے ڈھک کر برتن میں رکھیں اور پلائے جائیں۔ اگر تازہ سنگترے یا موکھی کا پانی مل جائے تو چند قطرے ملا دیں۔ چھ ماہ تک کے بچے کو ہر دست کے بعد ایک چمٹا تک نمکول کا پانی دیں۔ (بشرطیکہ ابتدائی کمی پوری کی جا چکی ہو)

سات ماہ سے ایک سال کے بچے کو ہر دست کے بعد آدھ پاؤ نمکول دیں۔

ایک سال سے دو سال تک کے بچوں کو ہر دست کے بعد آدھ پاؤ سے تین چمٹا تک نمکول پلایا جائے۔

دو سال سے پانچ سال تک کے بچوں کو تین چمٹا تک سے ایک پاؤ نمکول پلایا جائے۔

### ہدایات

نمکول تیار کر کے پانی کو گرم نہ کیا جائے۔

تین ماہ سے کم عمر بچوں کو جھٹی نمکول دیا جائے اتنی ہی مرتبہ سادہ پانی پلایا جائے۔ تین ماہ سے ایک سال تک کے بچوں کو نمکول دو مرتبہ دے کر ایک مرتبہ پانی دیں۔ دست رک جائیں تو نمکول بند کر دیں۔ اس کی جگہ سادہ پانی دیا جاتا رہے اور جسم سے پانی کی کمی کی علامات پر توجہ رکھیں۔



## شدید اسہال کے بعد ابتدائی غذا

یہ سلسلہ پانی کی کمی کا مداوا ہونے کے بعد شروع کیا جائے۔

نصفے بچوں کو ماں کا دودھ 4-6 گھنٹہ بعد پلایا جائے۔ بچہ اگر دوسرا دودھ پیتا ہے تو اس میں نصف مقدار پانی ملا دیں۔ دست بند ہونے پر پانی کی مقدار آہستہ آہستہ کم کر دیں۔ سات سے اٹھارہ ماہ کے بچوں کو نرم، ٹھوس غذا جیسے کہ دہی، پتلی کھجڑی، سٹلے ہوئے کیلے، کو بغیر گھی کے حلوہ، فرنی اور دلیہ، بند خوراک میں FAREX، FARLAC-CERELAC وغیرہ دے سکتے ہیں۔

بڑے بچوں کو مندرجہ بالا غذاؤں کے علاوہ سادہ پانی، جو ابال کر اس کا پانی، بلکی چائے، سبز الائچی اور سونٹھ یا لیمن گر اس کا قہوہ، سنگترے یا سیب کا رس دے سکتے ہیں۔

## آئندہ کے اسہال کی روک تھام

بچے کو دو سال تک ماں کا دودھ پلایا جائے۔ (قرآن مجید نے بھی مدت رضاعت دو سال مقرر کی ہے)

چار ماہ کے بچے کو ٹھوس غذا از قسم دلیہ، فرنی، مسٹلا کیلا اور آلو، نرم مکھڑی، بتدریج شروع کریں۔

اگر ماں کا دودھ نہ دیا جاسکے تو بچے کو پالہ اور جھج سے دودھ پلایا جائے۔

فیڈر اور پوسٹی لینے والے بچے کبھی تندرست نہیں رہتے۔

دو سال سے کم عمر بچوں کو پانی ہمیشہ ابال کر ٹھنڈا کر کے پلائیں

بچے کے برتن دھو کر ڈھانپ کر رکھیں تاکہ وہ گرد و غبار اور کھیتوں سے محفوظ

رہیں۔

کھانے کھلانے سے پہلے اپنے ہاتھ صابن سے دھولیں۔

پھل اور سبزیاں اچھی طرح دھونے کے بعد چھلکے اتار کر دیں۔

## طب نبوی

بچوں کے اسمال اس کے علاج میں جو جو باتیں طب جدید میں جدید ترین ہیں۔ وہ پیش کر دی گئیں ہیں۔ علاج میں کام آنے والی ادویہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جس میں یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ جدید ادویہ میں اکثر خطرناک ہیں اور پانی کی کمی پورا کرنے والے اکثر مرکبات کو جسم میں داخل کرنا بھی فنی مہارت کے ساتھ ساتھ جان جو حکم کا کام ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسمال کے ایک مریض کا ذکر کیا جا چکا ہے جس کے لئے انہوں نے شہد تجویز فرمایا اور کچھ عرصہ شہد پینے کے بعد وہ شفا یاب ہو گیا۔

شہد ایک عمل غذا ہونے کے ساتھ ساتھ ہر اشیم کش ہے۔ اس میں وہ تمام معدنیات اور نمکیات پائے جاتے ہیں جو جسم انسانی میں موجود ہوتے ہیں۔ جب قے یا اسمال کے ذریعہ جسم سے پانی خارج ہوتا ہے تو صرف عام خوردنی نمک نہیں لگتا بلکہ اس عمل میں کئی اور کیمیادوی مرکبات اور جوہر بھی ہوتے ہیں جن کی تفصیل کا ابھی مکمل اندازہ بھی نہیں کیا جاسکا۔ ان کی کمی کسی ایسی سیال سے پوری کرنی چاہئے جس میں وہی کچھ موجود ہو جو جسم سے خارج ہوا ہے۔ لاہور کے متعدد ہسپتال اور ڈھاکہ میں ہیضہ کی دباؤ کے دوران وسیع مشاہدات کے بعد ہم پوری دانتداری سے یقین رکھتے ہیں کہ شہد کو ابلے پانی میں حل کر کے پلانے سے بہتر آج تک کوئی دوائی ایجاد نہیں ہوئی۔ اسمال کے دوران شہد دینے سے نہ صرف یہ کہ مریض کو بعد میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ ہوگی بلکہ وہ بیماری کے دوران بھی چلا پھرتا رہتا ہے۔ اس کی آنکھیں اگر اندر دھنس بھی گئی ہوں تو یہ کیفیت دو چار دفعہ شہد پینے کے بعد دور ہو جاتی ہے۔ جسم سے نکلے ہوئے تمام نقصان پورے ہو جاتے ہیں۔

قرآن مجید نے انار کو اتنی اہمیت عطا فرمائی ہے کہ اسے جنت کا میوہ قرار دیا

ہے۔ سورۃ الانعام میں دو مختلف مقامات پر اور سورۃ الرحمن میں اس کا اچھے الفاظ میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ تورات مقدس میں کم از کم سات مقامات پر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالکؓ روایت فرماتے ہیں۔

انہما قال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرمان فقال ما  
من رمانہ الا وفيہ حبۃ من رمان الجنة (ابو نعیم)

(میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انار کے بارے میں پوچھا۔  
انہوں نے فرمایا کہ ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنت کے اناروں کا کوئی  
دانہ نہ ہو)

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ اس اہمیت سے سگاہ تھے۔ اس لئے انہیں بھی کہیں  
سے انار کا ایک دانہ بھی میسر نہ جاتا تو وہ اسے بڑی عقیدت سے کھا لیتے تھے۔ حضرت  
علیؓ فرمایا کرتے تھے۔

من اکل رمانہ نور اللہ قلبہ (ذہبی)

(جس نے انار کھایا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے)

انار کو جنت کا میوہ اور دل کو روشن کرنے والا قرار دینے کا مطلب صاف ظاہر  
ہے کہ اس میں بے پناہ افادت موجود ہے۔ اطباء قدیم نے اسی اساس پر اسے مختلف  
بیماریوں میں استعمال کیا ہے۔ محدثین نے اسے کھانسی اور امراض صدر میں مفید قرار  
دیا ہے۔ اسے اسہال کا علاج بتلایا گیا ہے۔ بچے کو روکتا ہے اور بیماروں کو توانائی مہیا  
کرتا ہے۔

حافظ ابن القیمؒ کی تجویز کے مطابق پیٹھے انار کا پانی نکال کر اسے چولیسے پر رکھ کر  
گٹھا کر لیا جائے۔ پھر اس میں شہد ملا کر مریض کو بار بار چٹائیں گلے کی سوزش کو  
دور کر دیتا ہے اور آنکھوں کے زخم مندمل کرتا ہے۔

طب یونانی میں انار کا شربت "رب انار شیریں" کے نام سے مشہور دوائی ہے۔  
انار کا چھلکا قابض ہونے کے علاوہ پیٹ کے کیڑوں کی بہترین دوائی ہے۔ حضرت علیؓ  
روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كلوا الزمان بشحمه فان دماغ المعدة (ابو نعيم)

(انار کو اس کے چٹکے سمیت کھاؤ۔ کہ یہ معدہ کو حیات نو دیتا ہے)

انار کا چھلکا ابال کر اس میں انار کا جوس اور شہد ملا کر دو چار مرتبہ کھانے سے نہ صرف کہ ہر قسم کے اسہال بند ہو جاتے ہیں۔ بلکہ پیٹ میں پائے جانے والے کیزے بھی مر جاتے ہیں۔ حکماء نے انار کی چھال کے علاوہ اس کے درخت کی چھال اور اس کو تگنے والے پھول بھی اسہال، پیٹ کے کیزوں اور خونی بواسیر میں اچھے اثرات کے ساتھ بیان کئے ہیں۔

شہد ملا کر پانی یا انار کا عرق شہد ملا کر دینے سے اسہال ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بچے کو بعد میں بھی کمزوری نہیں ہوتی۔

## ہیضہ

## CHOLERA

عام لوگ بار بار کی تے اور اس سال کی شکایت کو ہیضہ کہتے ہیں۔ یہ ایک شدید متعدی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو لگ کر وبائی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ طبی اصطلاح میں ہیضہ اس سال اور تے کی وہ کیفیت ہے جو VIBRIO CHOLERAE نامی جراثیم پھوٹی آنت میں سوزش سے پیدا کرتے ہیں۔ مغربی مفسرین نے ہم لوگوں کو بدنام کرنے کے لئے اسے ایشیائی کولیرا کا نام دیا ہے۔ کیونکہ ان کے خیال میں یہ صرف ایشیائی ملکوں میں ہوتا ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ کولیرا کی ایک قسم ELTOR-SEROTYPE OGAWA VIBRIO CHOLERAE بھی ہیضہ ہی ہے۔ لیکن اس کی سوزش وبائی شکل اختیار نہیں کرتی۔ عالمی ادارہ صحت کی تشریح کے مطابق اس بیماری کو مشترک زہ ضروری نہیں ہے۔ جب کہ صحت کے قوانین کی رو سے ۱۹ بیماریاں ایسی ہیں جن کے بارے میں عالمی ادارہ صحت کو سرکاری طور پر مطلع کرنا ضروری ہے۔ بلکہ طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا اگر کوئی کیس ہو جائے تو علاج کرنے والے ڈاکٹر کی یہ قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر محکمہ صحت کے حکام کو مطلع کرے۔ ان میں سے ایک ہیضہ بھی ہے۔ محکمہ صحت کے حکام اس مریض کی تشخیص کی پڑتال کریں۔ پھر اس پاس کے لوگوں کو اس سے بچانے کے طریقے اختیار کریں۔ محکمہ صحت اس مریض کے کوائف سرکاری ریکارڈ میں شائع کرے۔ ان بیماریوں کو NOTIFIABLE بیماریاں کہتے ہیں۔ اس ریکارڈ یا اشتہار کا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے ملکوں کے لوگ دیارِ زہ علاقہ میں جا کر اپنے تپ کو خطرہ میں نہ ڈالیں۔ اس

سلسلہ کا سب سے پہلا مکمل ہدایت نامہ یوں ہے۔

حضرت عبدالرحمان بن عوفؓ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا جب تم کسی شہر میں طاعون کا سنو اور تم وہاں موجود ہو تو

وہاں سے باہر نہ نکلو۔ اگر تم باہر ہو تو اس شہر میں مت جاؤ۔ (بخاری)

وہاں کی روک تھام کا یہ جامع قانون آج بھی اسی طرح مکمل اور قابل عمل

ہے۔ جب کسی شہر میں انفلونزا یا میضہ یا چچک پھوٹ پڑی ہو اور وہاں کا رہنے والا

کوئی شخص کسی دوسرے شہر جاتا ہے تو وہ اس شہر کی بیماری اس دوسرے شہر تک لے

جا کر اس کے پھیلاؤ کا باعث بنتا ہے۔ جب کہ دوسرے شہر سے آنے والا مجدد دست

فرد وہاں آکر بیمار ہو سکتا ہے۔

## وبائی حیثیت

دبیات کی مصدقہ تاریخ میں دریائے گنگا کے اردگرد کا علاقہ پچھلے 160 سال سے

ہیضہ کی وبا کا مسکن رہا ہے۔ جب یہ دریا پھاڑوں سے نکل کر ہردوار کے مقام پر

میدانی علاقہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کی شکل و صورت اور پانی کا رنگ بلکہ پانی کا

ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔ گنگا کی گزرگاہ کا آخری پہاڑی قصبہ لکشمں جھولا ہے۔ وہاں

تک دریا کا پانی نہایت لہریز اور شیریں ہوتا ہے۔ ہردوار ہندوؤں کا مقدس مقام ہے۔

ان کے عقیدہ میں دریائے گنگا بہشت سے نکلتا ہے۔ اس میں غسل کرنے سے گناہ دور

ہوتے ہیں۔ اس کا پانی چیزوں کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ اور اس میں جن مرنے

والوں کی راکھ بھائی جائے وہ جنت میں جاتے ہیں۔ اس طرح ہردوار میں غلاعت کے

ڈھیر دریا میں داخل کر دیئے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر گھوش نے مشاہدہ کیا ہے کہ ہردوار سے

دس میل دور بھی گنگا میں ہیضہ کے جراثیم مستقل طور پر مقیم ہوتے ہیں۔

1945ء میں ہندوؤں کا ایک مذہبی میلہ کہہ منعقد ہوا۔ لاکھوں کی تعداد میں

زارین ہردوار گئے اور وہاں ہی گنگا کا پانی دوسروں کے لئے شہرک کے طور پر لائے۔

چونکہ اس پانی میں ہیضہ کے جراثیم تھے اس لئے یہ وباء پورے ہندوستان میں پھیل

گئی۔ بیماری کی روک تھام کے سلسلہ میں کبھی امرود زیرِ عتاب آتے اور ملک میں ان

کی فروخت بند کی گئی اور کبھی لوگوں کو ایک بے کار قسم کی ویکسین کے ٹیکے لگتے رہے۔ چونکہ ایک ہی سرنگ کو دوبارہ صاف کئے بغیر سینکڑوں افراد کو ٹیکے لگتے تھے اس لئے ہزاروں افراد کو انجیکشن سے پھوڑے بن گئے۔ اور انہوں نے گنگا جل پیا تھا ان کو ہیضہ بدستور ہوتا رہا۔ اس وباء کا دلچسپ حصہ یہ تھا کہ مسلمان عام طور پر محفوظ رہے۔ کیونکہ انہوں نے گنگا جل نہ پیا تھا۔

۱۹۶۱ء میں بنگال اور مشرقی پاکستان میں ہیضہ کی شدید وبا پڑی۔ وہاں سے یہ اندونیشیا اور سنگاپور سے ہوتی ہوئی یورپ بھی گئی۔ ۱۹۷۰ء میں اسرائیل میں ہیضہ کی وبا ان کی اپنی گندی سبزیوں کی وجہ سے پھیلی۔ وہ کھیتوں میں انسانی فضلہ کی کھاد استعمال کر رہے تھے۔ اس لئے کچی سبزیاں کھانے والوں کے ذریعہ ہیضہ پھیل گیا۔ سبزیوں کے علاوہ پھلیاں بھی اس کے پھیلاؤ کا باعث رہیں۔ ۱۹۷۳ء میں اٹلی کے متعدد شہروں میں ہیضہ پھیل گیا جو کہ اشیاء سے نہیں آیا تھا۔ ۱۹۷۸ء میں ہیضہ کی ایک شدید وباء شمالی امریکہ میں پھیلی۔

جب لوگ بارش کا جمع شدہ منہ پانی استعمال کرتے ہیں اور جب گرمی اور ہوا میں نمی کی وجہ سے کھیتوں کی افزائش ہوتی ہے تو یہ موسم ہیضہ کے پھیلنے کے لئے بہترین ہوتا ہے۔ اگرچہ پاکستان میں حیدرآباد کے علاقہ میں ۱۹۶۰ء میں ہیضہ موسم سرما کی شدت میں بھی پھیل گیا تھا اور لاہور میں ہم نے ۱۹۶۲ء میں ہیضہ کی ایک وباء کو نسلت کامیابی کے ساتھ پھیلنے نہ دیا۔ لیکن بنگلہ دیش اور بھارتی بنگال میں یہ بیماری موسم سے قطع نظر سارا سال سدا بہار رہتی ہے۔ البتہ سیلابوں کے بعد جب گندے پانی کے جوہر تمام علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں تو بیماری شدت اختیار کر لیتی ہے۔ بنگلہ دیش کے حالیہ طوفان کے بعد ایک لاکھ افراد ہیضہ سے ہلاک ہوئے۔

ہیضہ پاکستان کی بیماری نہیں اور اگر کبھی یہ وراثہ ہو کر یہاں آیا بھی تو اسے چند دنوں میں ختم کر دیا گیا۔

## بیماری کا اسلوب

ہیضہ کے جراثیم غلیظ اور ٹھہرے پانی میں پرورش پاتے ہیں۔ اسی لئے اسلام نے پینے والے پانی کے بارے میں ایک اہم ہدایت جاری فرمائی۔ حضرت ابوامامہ الباہلیؓ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

(پانی اس وقت تک پاک ہے جب تک کہ کوئی چیز اس کی خوشبو ذائقہ

اور رنگ کو تبدیل نہ کرے) (بخاری، ابن ماجہ، ابی حاتم)

جراثیم آلود پانی کے پینے سے ہیضہ، اسال، چھش، آنٹوں کے کیڑے اور درختوں بیماریاں پھیلتی ہیں۔ بلکہ جب کوئی دیا پانی سے چلتی ہے تو ایک ہی وقت میں سینکڑوں افراد متاثر ہوتے ہیں۔ اس باب میں قرآن مجید نے پانی کو استعمال سے پہلے چیک کرنے اور اس کے متعلق جملہ کوائف کو توجہ میں رکھنے کے بارے میں ایک اہم راہبری عطا فرمائی ہے۔

(اور یہ بتاؤ کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو کہاں سے آیا ہے اور وہ کیسا ہے؟)

(واقعہ: 68)

بچنے کے مریض کو چھونے سے بیماری نہیں ہوتی۔ اس کے جسم سے نکلنے والی نجاتوں جیسے کہ سہلے اور دست میں جراثیم ہوتے ہیں۔ کھیاں چونکہ ایسی غلاظتوں کو پسند کرتی ہیں اس لئے وہ ان پر بیٹھ کر اپنے جسموں کو جراثیم آلود کر لیتی ہیں۔ وہاں سے انھہ کر جب یہ کھانے پینے کی کسی چیز پر میٹھتی ہیں تو ان کے پروں اور پیروں سے وہ چیز آلود ہو جاتی ہے جسے کھانے والے کے پیٹ میں جراثیم داخل ہو کر اسے بیمار کر دیتے ہیں۔

بچنے سے شفا یاب ہونے والے بعض مریضوں کے پاخانے میں کئی ہفتوں تک جراثیم خارج ہوتے رہتے ہیں۔ ان کو CARRIER کہتے ہیں یہ لوگ جراثیم کا چتا پھرتا ڈپو بن کر بیماری پھیلاتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص پانی کے ذخائر، مراکز اور گزرگاہوں کے قریب رفع حاجت نہ کرے۔



## اسلام اور ہیضہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں جو اہم ہدایات مرحمت فرمائی ہیں۔

- 1- پانی کی گزرگاہوں، ذخروں اور مراکز کے قریب رفع حاجت نہ کی جائے۔
  - 2- کھڑے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے۔
  - 3- جس پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو گیا ہو اسے استعمال نہ کیا جائے۔
  - 4- کھانے کی جس چیز پر کسی بیٹھی ہو اسے نہ کھایا جائے۔
  - 5- کھانے پینے کی چیزیں ڈھانپ کر رکھی جائیں۔
  - 6- کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں۔
  - 7- رفع حاجت کے بعد صاف پانی سے طہارت کی جائے اور اس کے بعد دوبارہ کسی صاف کرنے والی چیز کی مدد سے ہاتھ دھوئے جائیں۔
  - 8- رفع حاجت کے بعد طہارت میں صرف بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے اور اس ہاتھ کو کھانے میں استعمال نہ کیا جائے۔
  - 9- جسم کے مستور حصوں کو دائیں ہاتھ سے لمس نہ کیا جائے۔
  - 10- صبح کا ناشتہ جلد کیا جائے اور اس طرح گھر سے خالی پیٹ نکلنے کی گنجائش نہ رہے۔
  - 11- کھانے کے ساتھ سرکہ استعمال کیا جائے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سرکہ کی موجودگی میں ہیضہ کے جراثیم ہلاک ہوتے ہیں۔
  - 12- ناخن نہ بڑھائے جائیں۔
- اگر ان ہدایت پر عمل کیا جائے تو ہیضہ ہی نہیں بلکہ اسہال، منہاں اور تپ محرقہ کا امکان بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص اتفاق سے بیمار ہو بھی گیا تو اس کی بیماری دوسروں کو نہ لگ سکے گی۔ بلکہ پیٹ کے کیرڈوں اور پولیو سے بھی حفاظت ہو سکتی ہے۔

اگر انسان کا معدہ درست کام کر رہا ہو تو پیسہ کے جراثیم اس کے تیزابی جوہر کو عبور کر کے چھوٹی آنت میں نہیں جا سکتے۔ وہ لوگ جو تیزابیت کو رفع کرنے کے لئے سوڈا بائی کارب یا ANTI ACID گولیاں کھاتے رہتے ہیں ان کو پیسہ ہونے کا امکان دوسروں سے زیادہ ہے۔

جراثیم کے پیٹ میں داخل ہونے کے 24-72 گھنٹوں میں علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس سال یا تے فوری طور پر شروع ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں ان کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ مگر تھوڑی دیر میں یہ چاولوں کی چھہ کی طرح سفید ہو جاتے ہیں۔ جن میں تھوڑی سی لیس بھی ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پر پیٹ میں نہ تو مروڑ ہوتے ہیں اور نہ ہی درد ہوتا ہے۔ درجہ حرارت نارمل سے بھی کم ہوتا ہے۔ تے اور دست تعداد میں بڑھتے جاتے ہیں بلکہ ایک گھنٹہ پانی بھی ہضم نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں کو 10-15 اس سال دیکھے گئے ہیں۔

پیسہ کے جراثیم اپنے جسموں سے ایک کیمیادی ENTERO TOXINS پیدا کرتے ہیں۔ جو چھوٹی آنت میں پانی اور نمکیات کے انجذاب کو روکتے اور نمکیات کو خارج کرتے ہیں اور اس طرح تھوڑی سی دیر میں سارے جسم کا پانی نکل جاتا ہے جسے DEHYDRATION کہتے ہیں۔

جسم سے پانی کے اخراج کی وجہ سے مریض بے حال ہو کر گر جاتا ہے۔ خون گاڑھا ہونے سے دوران خون کا سارا سلسلہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ گاڑھا خون آکسیجن اٹھانے کے قابل نہیں رہتا اور سانس لینے میں مشکل پڑتی ہے۔ بلڈ پریشر گر جاتا ہے۔ پیشاب بند ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ اگر مزید جاری رہے تو گردوں میں انحطاط ہونے لگتا ہے۔ جو ہمیشہ کے لئے ہو گا۔ نبض ڈوبنے لگتی ہے جلد خشک اور آنکھیں اندر کودھنس جاتی ہیں۔

پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب تے اور اس سال اپنے آپ رک جاتے ہیں۔ نبض بہتر ہونے لگتی ہے۔ درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے۔ بد قسمت مریضوں کو تیز بخار بھی ہو

سکتا ہے۔ کچھ مریض ایسے ہیں جن کی موت ابتدائی مرحلے ہی میں ہو جاتی ہے۔  
 بیضہ کی طرح کی علامات بعض زہروں جیسے تنکھیا، پارا، فلورائیڈ اور سیسہ کھانے  
 سے بھی ہو سکتی ہے۔ مگر ان سب کے ساتھ طلق اور پیٹ میں شدید جلن ہوتی ہے  
 جب کہ اسہال اور پیچش میں بخار پیٹ میں درد اور اسہال میں خون اور لیس ہوتے  
 ہیں۔ ان سوزشوں میں بخار ہوتا ہے جب کہ بیضہ میں بخار نہیں ہوتا۔

### علاج

پیادہی سے قطع نظر سب سے پہلے جسم سے خارج ہونے والے ٹمک اور پانی کی  
 کمی کو فوری طرح پورا کیا جائے۔ مریض کو اگر ابتدائی مرحلہ میں دیکھا جائے تو  
 ORS سے گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن 5-6 دستوں کے بعد انتظار کی گنجائش باقی نہیں  
 رہتی۔ اور گلوکوس اور ٹمک کا محلول درید کے ذریعے فوراً دے دیا جائے۔

لاہور کے متعدد امراض کے شفاخانے سے طویل وابستگی کے دوران ہم نے  
 دیکھا ہے کہ بیضہ کے مریض کی درید میں ٹمک کا محلول داخل کرنے کا صحیح نسخہ کتابی  
 علم سے میسر نہیں آ سکتا۔ بڑے بڑے استادوں کو ایک پرانے کمپونڈر کے سامنے  
 شرمسار ہوتے دیکھا ہے کیونکہ نسخہ کا انتخاب حالات کے ساتھ بدلتا ہے مثلاً  
 SALINE 5% GLUCOSE کی تین چار بوتلیں دینے کے بعد وہ ALKALINE  
 دیتے ہیں۔ ہم نے بیضہ کے علاج کے عالمی شہرت کے مراکز دیکھے ہیں۔  
 لیکن کونسا محلول کتنی مقدار میں دیا جائے۔ اس کا صحیح فیصلہ ہسپتال کے پرانے نیم  
 خوانہ ملازمین سے بہتر کہیں نہیں دیکھا۔ جب یہ لوگ ملازمت سے ریٹائر ہوتے تھے تو  
 مجھے دلی دکھ ہوتا تھا کہ ملازمت کے قوانین یا سیاسی مصلحت ہمیں اس امر کی اجازت  
 نہیں دیتی کہ ایسے مفید لوگ خدمت پر برقرار رکھے جائیں۔

مریض کے جسم سے پانی اور نمکیات کی کمی کو دور کرنا اہم ترین ضرورت ہے۔  
 اس کو شروع کرنے کے بعد اصل بیماری کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے۔ ہتھوں سے جلن  
 کو دور کرنے والے مرکبات از قسم STREPTOMAGMA - FURADIL  
 KAOSTOP وغیرہ یا KAOLIN کا سفوف پانی میں گھول کر مریض کو ہر پانچ منٹ

بعد ایک چمچ کے حساب سے مسلسل پلایا جائے۔ مریض کو شدت سے پیاس لگتی ہے۔ اگر وہ پانی پی لے تو بیماری بڑھتی ہے۔ پیاس کی ضرورت منہ میں برف کی ٹلی رکھ کر پوری کی جائے۔ ورنہ اس کے جسم میں پانی کی معقول مقدار دریدوں کے راستے داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک برطانوی ڈاکٹر نے تھائی لینڈ اور افریقہ کے مشاہدات کی روشنی میں بتایا ہے کہ ایک مریض کو کم از کم 40 بوتلیں پانی دریدوں میں دینا پڑتا ہے۔

تے اور متلی کے لئے NIVADOXIN-AVOMIN-TORECAN میں سے کوئی بھی گولی دی جا سکتی ہے۔ اگرچہ ان کے انجیکشن بھی ملتے ہیں مگر ان سے بلڈ پریشر میں کمی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ایسے مریضوں کا بلڈ پریشر پیسے ہی کم ہوتا ہے۔ اس لئے ان کا استعمال خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔

بچوں میں موجودہ ہیضہ کے جراثیم کو ہلاک کرنے کے لئے جراثیم کو مارنے والی متعدد دوائیں موجود ہیں۔ ہمارے مشاہدے میں سب سے عمدہ دوائی CHLORO-STREP کا شربت یا کیپسول رہی ہے۔ اس کے دو کیپسول صبح، دوپہر، شام دو روز تک دینا کافی رہتا ہے۔ اگر یہ دوائی میسر نہ ہو تو اسی طرح CHLOROMYCETIN کے کیپسول دیئے جائیں اور ان کے ساتھ سٹرپٹو مائی سین کا ٹیکہ گھول کر اس کا نصف صبح شام دوائی والے گھولوں میں گھول کر پلایا جائے۔ ان کے علاوہ ماہرین FUROXONE کے 400mg کی ایک گولی دو روز تک صبح شام دیتے ہیں۔ TETRACYCLIN کے 250mg کے دو کیپسول صبح، دوپہر، شام بھی اچھی شہرت رکھتے ہیں۔ جدید دوائی CIPROFLAXIN سب سے عمدہ ہے۔

کنزور دل کے لئے اضافی طور پر وٹامن B-12 کے انجیکشن مفید رہتے ہیں۔ ہیضہ کے علاج میں کچھ مقامی دواؤں کو گھروں میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جیسے کسی کا جی تھلائے یا دو ایک اسہل ہوں تو سبز الائچی، سونف کا قہوہ مقبول ترین کوشش ہے۔ ان اشیاء کی اچھائی میں کوئی کلام نہیں۔ لیکن ہیضہ میں سوزش کی وجہ سے آنٹوں میں جلن کی سی کیفیت ہوتی ہے اور پیٹ میں جلنے والی کوئی بھی چیز وزن ڈال کر رہے اور اسہل میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ اس لئے قہوہ دینے سے مریض کی حالت مزید

خراب ہونے کا اندیشہ موجود ہے۔

## امرت دھارا

تقسیم ملک سے پہلے لاہور میں ریلوے روڈ پر ایک وید پنڈت ٹھاکر دت شریا تھے۔ انہوں نے الاچھی 'سوفٹ' دھنیا 'دار چینی' لوگ 'سوئے' سیاہ مرچ 'زیرہ وغیرہ کا سرا اریاح مصالحوں کے دلانستی تیل منگوا کر ایک مرکب "امرت دھارا" تیار کیا اور اسے خوب چلانی دی۔ حقیقت میں یہ نسخہ ان کو حکیم نور الدین بھیروی نے دیا تھا اور طب جدید میں یہ ESSENTIAL OIL MIXTURE کے نام سے مشہور تھا۔ پنڈت ٹھاکر دت کی اشتہار بازی کی وجہ سے امرت دھارا کا نام زبان زد عام ہی نہ ہوا بلکہ روزمرہ کی بول چال کا محاورہ بن گیا۔ پنڈت نے اسے بھڑکانے سے لے کر ہڈی نوٹنے تک کی بیماری کی اکسیر قرار دیا اور لوگ اس پر یقین بھی رکھتے تھے۔

امرت دھارا کی اصل شہرت ہیضہ کے علاج کے سلسلہ میں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک چمچ چینی لے کر اس پر امرت دھارا کی چند بوندیں ڈال کر پی لیں ہیضہ جاتا رہے گا۔ پورے ہندوستان میں ایسا کوئی گھر نہ تھا جہاں ہنگامی ضرورت کے لئے امرت دھارا نہ ہو۔ بلکہ سفر میں بطور خاص مسلمان میں شامل کیا جاتا تھا۔ اس کے جملہ اجزاء بد ہضمی میں مفید تھے۔ لیکن جراثیمی خیرش کی وجہ سے آنتوں میں ہونے والی سوزش کے دوران یہ اضافہ کا باعث ہو سکتا تھا۔ اس لئے ہیضہ کے ہزاروں مریضوں کی حالت صرف امرت دھارا کی وجہ سے خراب ہوئی ہوگی۔ لیکن پیلک کا یقین آخری دم تک قائم رہا۔

## طب نبوی

اس سال اور پچپش کی دوسری قسموں کی طرح یہاں بھی موثر اور مفید دوائی شہد ہے۔ جس میں جراثیم کو مارنے اور آنتوں کو سکون دینے کے ساتھ ساتھ مریض کی کمزوری کے علاج کی اضافی صلاحیت بھی موجود ہے۔

آنٹوں میں ہونے والی ہر جلن اور تیزابیت کے خلاف ہی موثر ہتھیار ہے۔  
 چونکہ یہ پھل ہر موسم میں میسر نہیں ہوتا اس لئے عام حالات میں اس کے ”جج“ بھی  
 دانہ سے گزرا ہو سکتا ہے۔ یہی دانہ کو پانی میں دو گھنٹے بھگو کر نرم کر دینے کے بعد  
 اسے پھینٹ کر لعاب نکال لیا جاتا ہے۔ اس لعاب میں شہد ملا کر مریض کو تھوڑی  
 تھوڑی دیر کے بعد 10-20 قطرے چٹائے جائیں۔ جب بھی کوئی چیز معدہ میں جاتی ہے  
 تو اس کے وزن سے آنٹوں میں حرکت ہو کر تھے یا اسہال ہو جاتے ہیں۔ اس کا آسان  
 حل یہ ہے کہ چیز کی مقدار اتنی ہو کہ وہ منہ ہی میں جذب ہو جائے اور معدہ تک نہ  
 جانے پائے۔ اسی ترکیب سے شہد اور یہی دانہ کا گاڑھا سا آمیزہ دیا جاتا ہے۔ اس  
 آمیزے میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ تھے کو چند  
 منٹوں میں روک دیتا ہے۔

دوسری ترکیب انار کا پانی ہے۔ انار کا پانی نکال کر اسے چھچھ کر کے براہ  
 راست دیا جا سکتا ہے۔ ورنہ اسے آہستہ آہستہ گرم کریں جب وہ گاڑھا ہو جائے تو  
 ٹھنڈا کر کے شہد ملا دیں۔ یہ مرکب آہستہ آہستہ دینے سے اسہال اور تھے بند ہو  
 جائیں گے۔ پانی اور نمکیات کی کمی شہد کے آمیزے سے پوری کی جا سکتی ہے۔ یہ بلڈ  
 پریشر کو بھی بہتر کرے گا اور پیشاب آور بھی ہے۔ بیضہ میں شہد کا ایک اہم فائدہ یہ  
 ہے کہ گردوں کا درم آتا رہتا ہے۔ پیٹ کی اکثر سوزشوں کے دوران گردوں پر برے  
 اثرات مرتب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گردے پیشہ کے لئے بیمار ہو جاتے ہیں۔  
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کے تحت شہد کو ابلے  
 ہوئے پانی میں حل کر کے دنا گردوں کے لئے اکسیر ہے۔

جسم میں محدود بیضہ کے جراثیم کو مارنے کے لئے جدید ادویہ میں سے کسی ایک  
 کو ان کے ساتھ دے دینا مضائقہ نہیں۔ اگرچہ یہی نسخہ جراثیم کش بھی ہے لیکن  
 اضافی طور پر کلورومائیٹین یا نیڑا سا۔ لیکن یا سپہران کی اضافی خوراک مزید بہتر ہوگی۔

## تپ محرقہ۔۔۔ معیاوی بخار

### TYPHOID FEVER

#### موتی جھرو ENTERIC FEVER

انسانی تاریخ کی قدیم ترین بیماریوں میں تپ محرقہ کو بڑی شہرت حاصل ہے۔ بیٹ کی دوسری بیماریوں کی طرح یہ بھی ایک سے دوسرے تک کھینوں، تودہ پانی، یا بیمار کے جسم سے نکلنے والے جراثیم کے ذریعے پھیلتا ہے۔ بھارت میں ایک وباء کے دوران 350000 کی آبادی کے ایک شہر میں 9000 افراد دو ماہ میں اس کا شکار ہوئے۔ 1980-81ء کے دوران دنیا کے مختلف ممالک میں اس کے مریضوں کی شرح عالمی ادارہ صحت نے اس طرح بیان کی ہے۔

#### براعظم افریقہ

5471	مصر	3497	الجواز
630	نیونس	2931	مراکش

#### براعظم امریکہ

6218	کولمبیا	10872	چلی
		510	ریاست ہائے متحدہ امریکہ

#### براعظم ایشیا

براعظم آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور نوٹکا میں سے کسی ایک میں بھی 25 مریض سے زیادہ دیکھنے میں نہیں آئے۔

پاکستان میں تپ محرقہ اگرچہ عام ہوتا ہے لیکن جہاں تک ہمارے ذاتی علم کا تعلق ہے کسی نے محض شہادت سے 44784 مریض قرار دے دیئے ہیں۔ ورنہ دس سالوں میں لاہور شہر میں ایک بھی مریض کی باضابطہ اطلاع جاری نہیں کی گئی۔ کسی کو تپ محرقہ قرار دینے کے لئے یہ ضروری ہے کہ تشخیص مکمل ہو۔ یعنی اس کا خون وغیرہ ٹیسٹ کر کے یہ طے کر لیا جائے کہ وہ اس کا شکار ہے۔ محض اس کے لئے مریض کو دس دن لگاتار بخار چڑھا اندازہ سے تپ محرقہ قرار دینا درست نہیں۔

یہ ایک جراثیمی سوزش ہے جو اس کو پیدا کرنے والے جراثیم SALMONELLA TYPHI کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گندی خوراک کے ذریعہ یہ جراثیم جسم میں داخل ہونے کے بعد چھوٹی آنت کے کسی حصہ کو پسند کر کے اپنے تخریبی عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ 1964ء میں برطانیہ کے علاقہ سکاٹ لینڈ میں اس کی دباؤ میں بند گوشت کھانے سے شروع ہوئی۔ انسانی جسم میں ان جراثیم کے خلاف قوت مدافعت موجود ہوتی ہے۔ اور یہ جس کسی کے جسم میں جاتے ہیں اس میں ہر ایک کو بیمار نہیں کر سکتے۔ اگر ان کی مقدار زیادہ ہو یا مریض کی قوت مدافعت کمزور ہو تو تپ محرقہ کا حملہ ہو جاتا ہے۔ جن غذاؤں کو بخار بستہ سبوروں میں رکھا جاتا ہے ان میں موجود اکثر جراثیم سردی سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لیکن تپ محرقہ کے جراثیم دو سال تک آئس کریم یا برف کے سانچے میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہیضہ کے جراثیم بھی فریج میں طویل زندگی گزارنے کے باوجود اپنی اذیت رسانی قائم رکھتے ہیں۔ جسم میں داخل ہونے کے ایک ہفتہ سے لے کر تین ہفتوں کے درمیان اپنا کام مکمل کر کے اپنی تعداد اتنی کر لیتے ہیں کہ مریض کی جسمانی مدافعت کو ختم کر کے باقاعدہ محرقہ کا بیمار بنا لیں۔



پاکستان میں لوگ اس کے بخار کو معیادی بخار یا موتی جھرو بھی کہتے ہیں۔ معیادی اس لئے کہ پرانے معالج کما کرتے تھے کہ یہ بخار 11 دن یا 19 دن یا 21 دن یا 31 دن میں ٹوٹتا ہے۔ یہ اس کی معیاد ہے۔ اگر اس سے پہلے توڑا جائے تو مریض کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ ٹوٹتا تھا تو اسے بحران کہتے تھے۔ حالانکہ اصلیت یہ تھی کہ کسی بھی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہ تھا جس سے بخار توڑا جاسکے۔ اپنی کمزوری کا الزام بخار پر دے کر وہ اپنا بھرم قائم رکھتے تھے شرح اموات 25 فیصدی تک چلی جاتی تھی اور معالج کی ساری صلاحیت شروع سے آخر تک خاموش تماشائی سے زیادہ نہ تھی۔ کیونکہ علم الطالع کی جتنی بھی کتابیں دیکھی گئی ہیں ان میں مذکور زیادہ تر نسخے اس بیماری پر اثر نہیں رکھتے اور جو کچھ بھی کیا جاتا رہا اس کا زیادہ تر مقصد مریض کے دل کو تسکین دینی تھی۔ اور دوسری طرف مریض کو غذا کی طرف سے اتنا پرہیز کروایا جاتا تھا کہ بیماری کی کمزوری کے ساتھ فائدہ کشی اس کی عمومی صحت کے لئے غذائیں یا وہ قوت مدافعت کی کمزوری سے ختم ہو جاتا۔

تپ محرکہ آنکھوں کی سوزش ہے اور اس میں غذا کی زیادتی یا بلا سوجھے سمجھے انتخاب تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ مریض کو دودھ اور رس بسکٹ دے دے کر بے حال کر دیا جائے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کو کھانے پینے سے منع نہ کیا کرو۔ مریض کو جب بھوک لگے تو کھاوے۔

بخار کے ایک مریض کی حضورؐ جب عیادت کرنے گئے تو اس سے خاص طور پر پوچھا کہ وہ کسی چیز کو کھانے کی خواہش رکھتا ہو تو بتائے۔ اس نے منہم کی روٹی طلب کی تو حضورؐ نے بذات خود لوگوں کو فرمائش کی کہ جس کے یہاں ایسی روٹی موجود ہو وہ اپنے بیمار بھائی کے لئے لائے۔

علامات

پہلا ہفتہ: بیماری کی ابتدائی حکمن 'کمزوری' جسم میں اینٹنن اور شدید سر درد، ہیٹ میں بوجھ کی کیفیت، معمولی اسہال اور اس کے ساتھ کبھی قبض، بھوک اڑ جاتی

ہے۔ ناک سے نکسیر بھی آسکتی ہے۔ اسہال کے ساتھ کبھی کبھی خون بھی شامل ہو جاتا ہے۔

زبان سخت میلی، ہیٹ میں اچھارہ، بخار آہستہ آہستہ تیز ہوتے شام کو بڑھ جاتا ہے جو کہ 103 F تک چلا جاتا ہے جب کہ صبح کو کم ہوتا ہے لیکن بالکل نارمل نہیں ہوتا۔ دل کی رفتار کم ہونے لگتی ہے اور نبض کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے۔ چرا بجھا بجھا اور آنکھوں سے چمک جاتی رہتی ہے۔

دوسرا ہفتہ: سردی میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن جسم میں کمزوری بڑھتی ہے۔ چرا بے رونق ہو جاتا ہے۔ تلی بڑھ جاتی ہے۔ ہیٹ کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر میں کمی آ جاتی ہے۔ مگر نبض کی رفتار بستر معلوم ہوتی ہے۔ اسہال کی شکایت بدستور رہتی ہے۔ بخار حسب سابق شام کو تیز مگر صبح کو کم۔

ساتویں سے دسویں دن کے درمیان ہیٹ اور جسم کے اکثر مقامات پر گلہابی رنگ کے دانے نمودار ہوتے ہیں جن کی شکل پیالے جیسی ہوتی ہے۔ ان کو انگلی سے دبائیں تو سفید پڑ جاتے ہیں۔ دو تین دن میں یہ دانے غائب ہو جاتے ہیں۔

ان دانوں کو پنجاب میں "لورکی" کہتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ دانے اگر اندر رہ جائیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ ان کو باہر نکالنے کے لئے خوب کلاں کا پانی اور متہ دیا جاتا تھا۔

تیسرا ہفتہ: جن کو بیماری کا حملہ شدید نہ ہوا ہو اور انہوں نے ٹھیک سے علاج بھی نہ کروایا ہو اس ہفتے ان کی بیماری کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ جسم پر کمزوری کے آثار نظر آتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو مریض کی حالت کی خرابی کی علامت ہے۔ خراب حال مریضوں کی آنتوں سے خون آنے لگتا ہے۔ آنتوں میں سوراخ ہو کر جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ دماغی حالت خراب ہو سکتی ہے اور مریض ہریان کی کیفیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پیشاب اور پاخانہ اپنے آپ نکل جاتے ہیں۔ آنتوں میں سوراخ یا جریان خون یا دل کی سوزش موت کا باعث بن جاتے ہیں۔

چوتھا ہفتہ: اگر مرض میں پیچیدگیاں زیادہ نہ ہوئی ہوں تو اس ہفتے بخار ٹوٹ جاتا

ہے۔ بھوک پھر سے لگنے لگتی ہے۔ زبان صاف ہو جاتی ہے۔ وزن بڑھنے لگتا ہے۔ نبض کی حالت بہتر ہوتی ہے لیکن معمولی چلنے پھرنے سے تیز ہو جاتی ہے۔ کئی جگہ سے کھل اترنے لگتی ہے۔ لیکن دل کی کمزوری یا گردوں پر برے اثرات سے پیروں پر درم آ جاتا ہے۔ خون کی ٹالیوں میں سوزش کی وجہ سے کسی درید میں خون جم کر ایک نیا مسئلہ پیدا کر دیتا ہے۔

اگر گردے یا پتہ متورم ہو گئے ہوں تو مریض ظاہری طور پر شفا یاب ہونے کے باوجود اپنی جسمانی نجاستوں کے ذریعہ تب محرقہ کے جراثیم خارج کرتا رہتا ہے۔ اور دوسروں کے لئے خطرے کا باعث بن جاتا ہے۔

### دورہ کا بخار

جن مریضوں کو بیماری کے دور میں کم غذا دی گئی ہو یا ان کو دواؤں کی مقدار ضرورت سے کم کر دی گئی ہو تو 9-12 دن کے بعد پھر سے بخار چھ جاتا ہے۔ اور سارا قلعہ از سر نو شروع ہو جاتا ہے۔

### بیماری کی پیچیدگیاں

پیٹ میں ہوا بھرنے سے کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسہال میں زیادتی کی وجہ سے آنٹوں میں سوراخ ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔

تیسرے ہفتہ میں غشی کے دورے، چہرے پر مردنی، کھیرا ہٹ، سانس میں تکلیف کے ساتھ اگر جسم کا درجہ حرارت گر جائے تو یہ اس امر کی علامت ہے کہ اندر جریان خون ہو رہا ہے نبض کی کمزوری اور بلڈ پریشر کے گرنے کا تقاضا ہے کہ مریض کو فوراً ہسپتال لے جائیں ورنہ بچنا ممکن نہ رہے گا۔

جگر اور پتہ پر اثرات سے یرقان اپینڈکس میں سوزش ہو سکتی ہے۔ تلی میں پھوڑا بھی بن سکتا ہے۔ اور وہ پھٹ بھی سکتی ہے۔

دو ہفتوں کے بعد مریض کو نمونیا اپنی مکمل علامات کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ حمل کے ابتدائی ایام میں اسقاط حمل۔

گرووں میں سوزش کی وجہ سے مستقل خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ پیشاب بند ہو جانا ہے اور فوطوں میں ورم آکر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔  
 بخار خواہ معمولی ہو دل پر کسی قدر اثر ضرور ہوتا ہے۔ مگر بعض حالات میں بڑھ کر دل کے عضلات میں سوزش کے علاوہ کبھی کبھار موت کا باعث بن جاتا ہے۔  
 خون کی نالیوں میں سوزش اکثر ہو جاتی ہے۔ ٹائف اور ران کی وریدوں میں اکثر خون جم کر دوران خون رک جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے ورم اور GANGRENE ہو سکتے ہیں۔

بخار کی شدت اور اعصابی سوزش کی وجہ سے مریض کی دماغی حالت متاثر ہو کر جنون کی سی کیفیت دیکھنے میں آتی ہے۔

تپ محرقہ کے جراثیم کی زہریں دماغ کی بھلیوں پر سوزش پیدا کر کے گردن توڑ بخار کی طرح کیفیت پیدا کر سکتی ہے جسے MENINGITIS کہتے ہیں۔ تپ محرقہ کے بعد کئی مریضوں کو ریشہ اور فالج بھی ہوتے دیکھے گئے ہیں۔  
 جوڑوں اور ہڈیوں میں سوزش ایک عام نتیجہ ہے۔

جلد پر پھنسیاں نکلتی ہیں۔ بال گرتے ہیں۔ ناخن بے جان اور پٹلے ہو جاتے ہیں جو لوگ منشیات کے عادی ہیں۔ پان میں توام کھاتے ہیں۔ یا شراب پیتے ہیں ان کو تپ محرقہ کے مسائل دو سروں کی نسبت زیادہ شدید ہوتے ہیں۔

### تشخیص

برطانوی ماہرین کا اندازہ ہے کہ 84 فیصدی مریضوں کی علامات کی بنا پر تشخیص کی جا سکتی ہے۔ چونکہ یہ بیماری خطرناک اور علاج کے لئے معمول سے زیادہ تردد کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے تشخیص کے ساتھ ساتھ ایسے ٹیسٹ بھی کرنے ضروری ہیں جن سے مریض کی بیماری کی نوعیت بھی ہو جائے۔

TLC & DLC خون میں موجود سفید دانے بیماریوں کی تشخیص میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد اور ان کی مختلف قسموں کا تناسب بیماریوں کی تشخیص میں مددگار ہوتا ہے۔

تپ محرقہ میں ان سفید دانوں کی تعداد TLC کی جائے تو ان میں کمی - جاتی ہے۔ کتابی علم کے مطابق تپ محرقہ کے ایک یقینی مریض میں ان کی تعداد 3000-4000 کے درمیان ہوتی ہے۔ اور حقیقت میں اتنی کم تعداد شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتی ہے البتہ کسی بھی مریض میں ان کی تعداد 9000 سے زیادہ نہیں جاتی۔ ان سفید دانوں کی متعدد اقسام ہوتی ہیں جن میں کچھ تبدیلیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ یہ ٹیسٹ DLC کہلاتا ہے۔ ذیل میں تپ محرقہ کے ایک مریض کے خون کے DLC کے TLC کا نتیجہ پیش ہے۔ اعداد و شمار میں جس تبدیلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اگر مطلق ان حدود تک بھی ہو تو اسے تپ محرقہ کا مریض ہی سمجھا جائے۔

**TOTAL & DIFFERENTIAL LEUCOCYTE COUNTING**  
**REPORT**  
**(TLC-DLC)**

**TOTAL LEUCOCYTE COUNT 7400/CUBIC mm**

(Variation from 5100 to 8950)

<b>PLOYMORPHS</b>	<b>68%</b>	<b>(Variation 48 - 75)</b>
<b>LYMPHOCYTES</b>	<b>27%</b>	<b>(Variation 18 - 38)</b>
<b>MONOCYTES</b>	<b>3%</b>	<b>(Variation 2 - 6)</b>
<b>EOSINOPHYLS</b>	<b>2%</b>	<b>(Variation 0 - 3)</b>

**BLOOD CULTURE** انگلستان کے کچھ ہسپتالوں میں تپ محرقہ کے جتنے مریض علاج کے لئے آئے ان کے خون کے معائنہ پر 84 فیصدی مریضوں کے خون سے تپ محرقہ کے جراثیم اس طریقہ سے مشاہدہ کئے گئے جب کہ ایک دوسرے تحقیقی موازنہ میں 69 فیصدی مریضوں کی بیماری اس طریقہ سے تشخیص ہوئی۔

اندازہ لگایا گیا ہے کہ 80 فیصدی مریضوں میں بخار کے پہلے دس دنوں کے دوران خون کو کلچر کر کے جراثیم دیکھے جاسکتے ہیں۔ لیکن تیسرے ہفتہ تک یہ شرح 40 فیصدی سے بھی کم ہو جاتی ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ بیماری کی طوالت کے ساتھ خون میں جراثیم کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس پیشاب اور پاخانہ میں جراثیم تین ہفتے تک موجود رہتے ہیں۔ مریض کے شفا یاب ہونے کے بعد پاخانہ کا کلچر اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ اگر اس کے جراثیم پاخانہ میں بدستور موجود رہتے ہیں تو نہ صرف اس مریض کو دوبارہ بیماری کا حملہ ہونے کا امکان موجود ہے۔ بلکہ یہ شخص اپنے جسم سے مسلسل جراثیم خارج کرنے کے باعث دوسروں کے لئے بھی خطرہ کا باعث بن رہے گا۔  
ذیل میں کلچر کا ایک مثال نتیجہ پیش خدمت ہے۔

REPORT OF CULTURE OF BLOOD/STOOLS/URINE  
POSITIVE FOR SALMONELLA TYPHI

WIDAL TEST تپ محرقہ کی تشخیص میں خون کا یہ ٹیسٹ بڑی شرت رکھتا ہے۔ اتفاق سے پاکستان اور بھارت کے واکٹر اس کے زیادہ گرویدہ ہیں اور مسلسل بخار کے تقریباً ہر مریض کا یہ ٹیسٹ رواج بن گیا ہے۔ جب کہ اس ٹیسٹ کو بیماری کے وجود کا پتہ چلانے میں کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ افریقہ میں بچوں کے ایک ہسپتال میں ایسے 100 بچوں میں جن میں خون یا پیشاب سے تپ محرقہ کے جراثیم پائے گئے تھے صرف 74 فیصدی میں اس ٹیسٹ نے بیماری کا سراغ دیا۔ اسی طرح کے دوسرے مطالعاتی مشاہدوں سے معلوم ہوا کہ یہ ٹیسٹ حتمی نہیں اور اس کے بحروسہ پر مریض کی تشخیص یا بیماری سے صحت یابی کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ وہ مریض جن کی علامات سے تپ محرقہ کا اندازہ ہوتا ہے مگر خون یا پیشاب یا پاخانہ کے کلچر پر جراثیم نہیں ملتے ان میں اس ٹیسٹ کا قدرے جواز موجود ہے۔

ذیل میں تپ محرقہ کے ایک مریض کے خون کے WIDAL TEST کا نتیجہ دیا جا رہا ہے۔ جس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کس قسم کا نتیجہ حاصل ہو تو اسے تپ محرقہ قرار دینا مناسب ہو گا۔

## BLOOD SEREOLGY

## WIDALS TEST

## DILUTIONS

(ANTIGEN)	1/20	1/40	1/80	1/160	1/320
AH	--	--	--	--	--
BH		-	-		-
TO	++	++	+	+	--
TH	++	+	+	+	--

## ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE

عام طور پر کئی بیماریوں کی تشخیص میں مددگار ہوتا ہے۔ خاص طور پر تپ دہی میں اسے بیماری کی تشخیص اور بہتری کی رفتار کا جائزہ لینے کے لئے کام میں لایا جاتا ہے۔ تپ محرقہ میں یہ ٹیسٹ کوئی خاص تشخیصی اہمیت نہیں رکھتا مگر کئی مریضوں میں اس کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تپ محرقہ کے ایک عام مریض کی رپورٹ درج ذیل ہے۔

## ERYTHROCYTES SEDIMENTATION RATE

(E S R) 24 m.m 1st hour

(WESTERGREEN METHOD) (Variation 12-40)

تپ محرقہ کی تشخیص کا بہترین طریقہ مریض کی علامات، بخار کا اسلوب اور کمزوری

ہے۔

علاج

بیسویں صدی کے نصف تک تپ محرقہ کا علاج ہر مریض کو قاتلہ اور قتل دے کر کیا جاتا تھا۔ تمام تر زرد بخار کی شدت کو کم کرنے پر ہوتا تھا۔ جو کبھی اسپرین وغیرہ ہے واقعی طور پر ٹوٹ جاتا تھا اور کبھی آسٹن کی سوزش میں اس سے اضافہ دیکھنے میں آ

جاتا تھا۔ مریض کو ہنسنے جلنے سے منع کرے میں معقولیت تھی کہ اس کے دل پر کم سے کم بوجھ پڑے گا اکثر مریضوں میں دل کی تکلیف ہی موت کا باعث بنتی تھی۔ سٹون میں سوراخ یا جراثیم کی زہریں چونکہ اضافی وجوہات ہیں اس لئے ان کو ششوں کی کامیابی مریض کی اپنی مدافعت پر منحصر رہتی تھی۔

بیسویں صدی کے وسط میں تپ محرقہ کے علاج میں ایک انقلابی واقعہ کلوروماکی شین کی ایجاد کی صورت میں ہوا۔ یہ دوائی اس کے جراثیم کو یقیناً ہلاک کر دیتی ہے اور مدقوں ڈاکٹروں کو اس پر بے پناہ اعتماد رہا۔ مگر دیت نام کی جنگ میں معلوم ہوا کہ جراثیم نے اب اپنے آپ کو اس سے بچانا سیکھ لیا اور کئی مریض معقول مقدار میں دوا دیئے جانے کے باوجود شغلیاب نہ ہوئے۔ میکسیکو، برطانیہ اور تھائی لینڈ میں متعدد ایسے مریض دیکھے گئے ہیں جو یہ دوا کھا کر بھی تپ محرقہ میں مبتلا رہے۔ اس دوائی میں حساسیت کے علاوہ ایک برا اثر یہ ہے کہ اس کو مسلسل دینے سے خون کے سرخ دانوں کی پیدائش رک جاتی ہے۔ یہ بیماری APLASTIC ANAEMIA کہلاتی ہے اور عام طور پر قابل علاج نہیں۔ مگر خوش قسمتی یہ ہے کہ ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے۔ ایسے اندیشوں کے پیش نظر کچھ اور دوائیں بھی آزمائی گئی ہیں جو نسبتاً محفوظ ہیں۔ لیکن ان میں فوائد کا وہ کمال نہیں جو کلوروماکی شین میں ہوتا ہے۔

جدید علاج میں مختلف ادویہ کی ترکیب یہ ہے۔

CHLOROMYCELIN اس کا کیپسول عام طور پر 250mg کا ہوتا ہے۔ 4 کیپسول ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد (دن-رات) اس وقت تک دیں جب تک کہ بخار کا زور ٹوٹ نہ جائے۔ (یہ ضروری نہیں کہ بخار بالکل ختم ہو جائے۔ اس کی شدت ختم ہونا کافی ہے) یہ مرحلہ 3.5 دن میں آتا ہے۔ اس کے بعد 250mg کے دو کیپسول ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد ایک ہفتہ۔ پھر خوراک نصف کر دی جائے یعنی ایک کیپسول ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔ اس طرح دوائی دینے کا کل عرصہ 4 دن کے قریب ہو جائے گا۔

ہماری ذاتی رائے میں ابتدائی مقدار خوراک قدرے زیادہ ہے۔ اگر 8 گھنٹوں کے بعد 4 کیپسول دینے کی بجائے 6 گھنٹوں کے بعد دو دینے جائیں تو عام حالات میں کافی



رہیں گے۔ البتہ تین دن میں بخار کی شدت کم نہ ہو تو اس وقت دوائی کی مقدار بڑھائی جاسکتی ہے۔

AMOXICILLIN یہ دوائی بازار میں AMOXIL کے نام سے ملتی ہے۔ اس کے 500mg کے دو کیپسول ہر 6 گھنٹے کے بعد 12-14 دن تک باقاعدہ دیتے جائیں۔ AMPICILLIN یہ اتنی اچھی اور مفید نہیں۔ لیکن عام طور پر بالائی دواؤں سے حساسیت کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی روزانہ مقدار 500mg کے 12 کیپسول ہے اور یہ اسی طرح 14 سے 12 دن تک دیئے جائیں۔

CO-TRIMOXAZOLE اس دوائی کے نقصانات عام طور پر دوسروں سے کم ہیں۔ اگرچہ اقاہت میں اتنی عمدہ نہیں۔ اس کا اصلی فائدہ یہ ہے کہ تشخیص میں اگر غلطی بھی ہوگئی تو یہ گزارا کر دیتی ہے۔ مثلاً لیبریا اور دوسری سوزشوں میں بھی اس کا دینا مفید ہے۔ حتیٰ کہ گردن توڑ بخار میں بھی یہ جان بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بازار میں یہ COTRI - NICOTRIUM BIOTRAN SOMATRAN

SEPTRAN - BACTERIUM کے نام سے ملتی ہے۔ SEPTRAN DS کی ایک گولی صبح، شام تپ محرقہ کے علاج کے لئے عام طور پر 14 دن دی جاتی ہے اور عام طور پر اتنی مقدار کافی رہتی ہے۔ اس کا اہم اندیشہ پیشاب میں رکاوٹ یا گردوں پر بعض اثرات ہیں۔ اس سے بچاؤ کے لئے پانی کی معقول مقدار پلائی جائے۔

حال ہی میں بعض استاد کلوروماکسین کے ہمراہ کورنی سون کے مرکبات شامل کرنے کی تجویز کر رہے ہیں۔ یہ دوائی پہلے بھی کبھی آزمائی گئی تھی۔ مگر ناکام رہی۔ اب اسے پھر سے آزمایا جا رہا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ جراثیم کش ادویہ اس سے پہلے شروع کر دی جائیں۔ ان کے پاس جو بھی مصلحت ہو اس کے مقابلے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ کورنی سون مریض کی اپنی قوت مدافعت کو کمزور کر کے صورت حال میں بہترین کی غلط امید پیدا کرتی ہے جس سے بعد میں افسوس ناک حادثات پیش آ سکتے ہیں۔

تپ محرقہ کے علاج میں جو بھی دوائی استعمال کی جائے اس کے ساتھ وٹامن

”ب“ مرکب کا استعمال نہایت ضروری ہے۔ ایسی گولیاں زیادہ مفید رہتی ہیں جن میں POLYBION-C -SURBEX-T VITAMIN-C صبح شام ایک گولی کافی رہتی ہے۔

ایک عام اصول ہے کہ آنتوں کے زخم VITAMIN-B12 کی موجودگی میں زیادہ اچھی طرح ٹھیک ہوتے ہیں۔ اتفاق سے اس وٹامن میں مریض کی عام صحت کو بحال کرنے صلاحیت کے علاوہ خون کی کمی کا علاج بھی ہے۔ اس لئے حالات خواہ کچھ بھی ہوں۔ CYTAMEN-1000/CYANOCOBALMINE 1000 کا ٹیکہ دس بارہ دن روزانہ گوشت میں لگا لیا جائے۔

### تپ محرقہ کا دوسرا حملہ

اکثر اوقات مریض کو تندرست ہونے کے بعد دوبارہ بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو بیماری کے دوران کا نامکمل علاج ہے اور دوسری وجہ تندرستی کے بعد غذا میں پہلے جیسی غفلت ہوتی ہے۔ عام خیال یہی ہے کہ بیماری کے دوران دواؤں کی مقدار اگر کم ہو یا علاج جلد بند کر دیا جائے تو دوسرا حملہ ہونے کا امکان ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جن مریضوں کا علاج میں CHLOROMYCETIN دی جائے ان کو دوبارہ حملہ کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جن مریضوں کا علاج AMOXIL سے کیا گیا ہو ان کو دوسرا حملہ نہیں ہوتا۔

جدید ایجاد CIPROXICIN کے 500 mg کا ایک کیپسول صبح شام عام مریضوں کے لئے کافی رہتا ہے۔ حالات اگر خراب ہوں تو مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس دوائی کے ذیلی اثرات بہت کم ہیں۔ یہ کسی بھی دوسری دوائی سے زیادہ موثر اور مفید ہے۔ اس کے بعد دوبارہ بخار کا اندیشہ نہیں ہوتا اور یہ پیرائٹن فانیڈ میں بھی مفید ہے۔ یہ TARAVID کے نام سے بھی ملتی ہے۔

### PARATYPHOID FEVER

تپ محرقہ ہی کے خاندان سے یہ ملتا جلتا بخار بھی اسی طرح عام ہے۔ بعض

ممالک میں اس کی شرح تپ محرقہ سے زیادہ ہے اور بعض میں کم۔ اس کی علامات تقریباً تپ محرقہ کی سی ہوتی ہیں۔ البتہ بغیر علاج کے عرصہ علالت کم ہوتا ہے۔ لیکن چچید گیوں اتنی ہی ہوتی ہیں۔ اس کا علاج بھی تپ محرقہ کی مانند کیا جاتا ہے۔

### چچید گیوں کا علاج

تپ محرقہ کے ایک عام مریض کا گھر پر علاج کیا جا سکتا ہے۔ البتہ مریض کو مسلسل مشاہدہ میں رکھنا چاہئے۔ اگر کوئی چچید گی پیدا ہو جائے تو اس باب میں کسی قسم کا کوئی خطرہ قبول کرنا درست نہیں۔ مریض کو فوراً ایسے ہسپتال میں داخل کروایا جائے جہاں پر ہیٹ کے آپریشن کرنے کا انتظام موجود ہو۔ آنکھوں میں رسنے والے خون کے علاج میں لوگ خون کی بوتلیں اور بعض اوروں دے کر علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ کام بھروسے کا نہیں اور اگر سوراخ ہو جائے تو فوراً آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔

چچید گیوں میں سے ہر ایک جان لیوا ہو سکتی ہے۔ اس باب میں معمولی لغزش یا لاپرواہی ملک نتائج کا باعث ہو سکتی ہے۔

### تپ محرقہ کا ٹیکہ

اس غرض کے لئے اب تک جتنے بھی ٹیکے دستیاب ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی بیماری سے بچانے کی استعداد نہیں رکھتا۔ اکثر لوگوں کو اس ٹیکے سے بخار ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود یہ تپ محرقہ سے نہیں بچاتا۔

کچھ لوگوں نے ایسی گولیاں تیار کی ہیں جن کو کھانے سے یہ بخار نہیں ہوتا۔ یہ گولیاں ابھی تک تجرباتی مرحلہ میں ہیں اور ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔

ہم نے یہ ٹیکہ لاکھوں مریضوں کو لگوا دیا۔ ذاتی مشاہدات کی بناء پر وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل بیکار اور فضول ہے۔

## طب نبوی

- 1- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو جنم کی بجگہ قرار دے کر فرمایا کہ اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ تیز بخار کے لئے مریض کے جسم پر نلکے کا پانی پھیلا جائے۔ کپڑے کو پانی میں تر کر کے ماتھے اور پیروں پر بار بار پھیرنے سے بخار کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ بخار اگر زیادہ ہو اور موسم سرد نہ ہو تو یکی کپڑا بدن پر بھی پھیلا جائے۔
  - 2- مریض کی قوت مدافعت قائم رکھنے کے لئے اس کی غذا پر توجہ دی جائے۔
  - 3- جو امال کر چھان کر یہ پانی دن میں بار بار پلایا جائے۔
- اسے پانی میں شد ملا کر مریض کو دن میں کئی بار پلایا جائے۔ اگر بارش کا پانی میسر ہو تو وہ ابلے پانی سے بہتر ہے۔

اگر جو کے پانی میں شد ملا کر پیا جائے وہ سب سے بہتر ہے شد ایک مکمل غذا ہے۔ یہ جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ شد مکمل طور پر جراثیم کش ہے۔ اسے پلانے سے ہیٹ کے زخم مندمل ہوتے ہیں۔ شد پینے والے کی آنٹوں میں سوراخ نہیں ہوتا۔ دل اور ہض کی کمزوری کے لئے شد ایک مقوی دوا ہے۔ طب یونانی میں کمزور کر دینے والی بیماریوں میں خمیرہ گاؤ زبان غبری جواہر والا اور جواہر صوا تقویت قلب کے لئے دیئے جاتے ہیں۔ شد ان دونوں سے زیادہ طاقت دینے والا قابل اعتنا ہے۔

- 3- تپ محرقہ کے علاج کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مریض کو ایسی غذا میں دی جائیں جن میں پھوک کم از کم ہو تاکہ ہضم ہونے کے بعد وہ آنٹوں پر وزن نہ ڈالیں کیونکہ ایسا ہونے سے آنٹوں کے زخم پھٹ سکتے ہیں یا ان میں سوراخ ہو سکتا ہے۔ اس لئے گوشت کھانا سب سے آسان نسخہ ہے۔ لیکن یہ گوشت ایسا ہو جو ثقیل نہ ہو اور اس میں سفید ریٹے اور چربی نہ ہو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مریض کو مہموشت کی بخنی یا باریک کر کے مصالحوں کے بغیر قیہ بنا کر دیا جائے۔

6۔ قسط البحرى کو جراثیم کے ہلاک کرے اور سوزشوں کے خلاف جسم کی قوت مدافعت بڑھانے کا ملکہ حاصل ہے۔ ہم نے

قسط البحرى \_\_ 80 گرام

برگ مندى \_\_ 20 گرام

کو پیس کر ملا کر پھونکا پیچ صبح، شام دیا۔ جن مریضوں کو بخار ایک مرتبہ اترنے کے بعد دوبارہ پڑھا تھا ان میں سے ہر ایک ہفتہ میں شفا یاب ہو گیا۔

7۔ علاج نبوی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر جدید علاج بھی شامل کر لیا جائے تو اس کا کوئی مضائقہ نہیں۔

## آنتوں کے زخم

### (ULCERATIVE COLITIS)

بڑی آنت میں سوزش کے بعد بہت سے زخم نمودار ہوتے ہیں۔ جن کی نوعیت لوگوں کو ابھی تک معلوم نہیں۔ کبھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جراثیمی سوزش ہے۔ کسی نے مختلف غذاؤں سے حساسیت کو اس کا باعث قرار دیا اور کسی کو وائرس پر شبہ ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اسے کینسر کی ابتدائی شکل قرار دیتے ہیں، خاص طور پر اس لئے کہ دس سال تک اس میں جٹلا رہنے والوں کی اکثریت کینسر کا شکار ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس میں شرح اموات 40-60 فیصدی کے درمیان پائی گئی ہے۔

سوزش سے پہلے ہونے والے آنتوں کے زخم اگر صرف بڑی آنت میں ہوں تو ان کو ULCERATIVE COLITIS کہتے ہیں اور اگر یہ زخم چھوٹی اور بڑی آنتوں میں ہوں تو ان کو CROHN'S DISEASE کہتے ہیں زخم یوں تو معدہ میں بھی ہوتا ہے اور چھوٹی آنت کے ابتدائی حصے کے زخم PEPTIC ULCERS کہلاتے ہیں۔ لیکن ان دونوں زخموں میں بنیادی فرق سوزش کا ہے۔ ان میں سوزش اس سال اور اجابت میں خون ہوتا ہے۔ ہماری ذاتی رائے میں یہ زخم دق کی کوئی غیر مصروف قسم ہیں۔ ماہرین اس کے اسباب کی تلاش کرتے تھک گئے ہیں۔ خاص طور پر جب کہ یہ ایسی خطرناک بیماری ہے جو مریض کو کمزوری، اس سال اور اس کے بعد کینسر پیدا کر کے تباہ کر دیتی ہے۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خوراک کے کچھ اجزاء کی وجہ سے کھانے میں بعض چیزوں کے نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہے تو اس کا بڑا ثبوت اس کی

یورپ اور امریکہ میں فراوانی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ ان علاقوں میں ہر 1500 افراد میں سے کم از کم ایک اس میں مبتلا ہے۔

جنوبی افریقہ میں سفید فام آبادی میں اس کی شرح یورپی اقوام کے تقریباً برابر ہوتی ہے جب کہ وہیں کی سیاہ فام آبادی میں یہ کبھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ اب کبھی کبھار اکا و کا مریض دیکھنے میں آ جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں سفید فام آبادی کا حال بھی جنوبی افریقہ سے مختلف نہیں رہا اور وہاں کے قدیم باشندے اس سے ماسون ہیں۔

برصغیر ہند و پاکستان میں یہ ہمارے اطباء قدیم کو کبھی نظر نہیں آئی اور اسی لئے پرانی طبی کتابوں میں اس کا نہ تو کوئی تذکرہ موجود ہے اور نہ حکماء نے اس کو کوئی نام دیا۔ اور اب دوسرے تیسرے ایک آدھ مریض دیکھنے میں آتا رہتا ہے۔ ان مشاہدات سے ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ جدید طرز کے مشدّد معاشروں میں جو خوراک کھائی جاتی ہے وہ زیادہ مصفا یا اجزاء کے اعتبار سے ایسی چیزوں پر مشتمل ہے جن سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے یا اس غذا میں کچھ ضروری چیزوں کی کمی ہے جو ایک غریب آدمی کی غذا میں موجود نہیں ہوتی۔ ہمارے خیال میں سب سے بڑا فرق چھنے ہوئے اور سفید آنے کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنا ہوا اور سفید آٹا پابند فرمایا اور یہی فرق امیر اور غریب کی خوراک کا ہے۔ غریب لوگ اور خاص طور پر مسات میں چلی کا پسا ہوا آٹا کھاتے ہیں جب کہ شہروں میں سفید اور باریک آٹا پسند کیا جاتا ہے۔ ریٹے دار غذائیں پیٹ اور دل کو بیماریوں سے بچاتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بغیر ریٹے کے نرم اور نفیس غذائیں کھانے والوں کو پیٹ اور دل کی بیماریاں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک ہی خاندان کے متعدد افراد اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ شاید اس لئے کہ ان کا رہن سہن اور خوراک کا انداز یکساں ہوتا ہے۔

اسباب

لوگ نرم و راز سے اس کا سبب تلاش کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے ہیں۔ لیکن ابھی تک ایسی کوئی یقینی بات سامنے نہیں آئی جسے اس کے پیدائش کا باعث قرار دیا جاسکے۔ ہمالیہ بیماری کی شکل و صورت اور خوردبینی کا تعلق ہے یہ

ایک عام سی سوزش معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ لوگوں نے پیش پیداکرنے والے جراثیم کی مختلف اقسام کا باعث بھی قرار دیا ہے۔ زخموں کے مواد سے متعدد اقسام کے جراثیم بلکہ وائرس بھی حاصل کئے گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جراثیم اس بیماری کا باعث تھے؟

تجرباتی جانوروں میں ان جراثیم کو آنتوں میں داخل کر کے اسی قسم کی صورت حال پیدا نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے امکان ہو سکتا ہے کہ جراثیم زخم بننے کے بعد حملہ آور ہوئے۔

ڈاکٹر MURRAY نے ذہنی پریشاندوں اور نفسیاتی وباؤ کے متعدد مریضوں میں اس بیماری کے آثار دیکھے ہیں۔ جس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید ذہنی وباؤ ہی اس کا باعث ہو۔

امریکی ڈاکٹر اینڈرسن نے اس بیماری کے زخموں کو 'سیدے' ان کے خوردبینی مطالعہ اور مریضوں کے خون کے امتحانوں کے بعد نظریہ قائم کیا ہے کہ یہ اصل میں حساسیت کی قسم ہے جو کہ آنتوں پر اسی طرح نظر انداز ہوتی ہے جیسے کہ جلد پر حساسیت سے دانے نکلتے ہیں۔ یہ حساسیت زیادہ طور پر غذا میں موجود اجزاء سے پیدا ہوتی ہے اس نظریہ کو تسلیم کرنے والے کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ آج کل کی اکثر غذائیں ذہن میں بند آتی ہیں۔ ان کو محفوظ کرنے کے لئے یا ان میں خوشبو پیدا کرنے کے لئے یا ان کو دلفریب شکل دینے کے لئے جو کیمیاوی رنگ اور خوشبو استعمال کئے جاتے ہیں یہ ان کے رد عمل میں پیدا ہوتی ہے۔

بسکٹ ایک روزمرہ کے استعمال کی چیز ہے اور زمانہ قدیم سے مختلف شلوں میں بننے آئے ہیں لیکن دور حاضر کے بسکٹوں میں بھی مصنوعی رنگ اور خوشبو شامل کئے جاتے ہیں۔ سرخ مرچ کا اپنا ایک رنگ ہے۔ لیکن بازار میں ڈبوں میں بند "خالص مرچ" کے نام سے ملنے والے سفوف میں طحیہ سے رنگ ملائے جاتے ہیں۔ اگر یہ رنگ نہ ہوں تو خواتین پسند نہیں کرتیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مرچ نے مانس کو رنگ نہیں دیا۔ اور وہ رنگ جو مرچیں دیتی ہیں وہ مرچ کا نہیں بلکہ پوش نیپنی کا ہوتا ہے۔



اسی طرح فروٹ جوس، لڈو، طبیی، جیسی روزمرہ کی مٹھائیاں بھی کیمیادی رنگوں سے برز ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب اس قسم کے زخم ستنوں میں زیادہ تعداد میں دیکھے جا رہے ہیں۔

### علامات

یہ بیماری ابتدائے بلوغت سے لے کر بڑھاپے تک کسی بھی عمر میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ عام طور پر 20 سال کی عمر کے بعد معمولی سے اسہال اور اس میں خون کی آمیزش سے ابتدا ہوتی ہے۔ کچھ مریض خالص خون بھی خارج کرتے ہیں جس سے کبھی پواسیر کا شبہ بھی پڑ جاتا ہے۔ پاخانہ میں لیس کی مقدار کافی ملتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اسہال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں خون کی آمیزش روزمرہ کا معمول بن جاتا ہے۔ خون کی آمد بذات خود ایک دہشت کا پیش خیمہ ہے۔ جب مریض کو ہر وقت خون آنے لگتا ہے تو اس کے ذہن میں ہر قسم کے خدشات نمودار ہوتے ہیں۔ اور اس سے یہ توقع کرنی کہ وہ مسئلے کو تحمل اور بردباری سے قبول کرے، ممکن نہیں رہتا۔

ماہرین نے بیماری کو شدت کے لحاظ سے ان قسموں میں بیان کیا ہے۔  
معمولی بیماری میں روزانہ چار سے زیادہ دست نہیں آتے جن میں خون کی مقدار بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔

متوسط درجہ کی بیماری میں تکلیف درمیانہ درجہ کی ہوتی ہے۔ شدید حملہ میں روزانہ چھ سے زیادہ دست آتے ہیں۔ جن میں کافی مقدار میں خون بھی شامل ہوتا ہے۔ خون کے اس قدر اخراج اور بار بار کی اجابت سے جسم میں شدید قسم کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ خون کے سفید دانے بڑھ جاتے ہیں۔ ESR بڑھتا ہے۔ بخار رہنے لگتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے اور وزن کم ہونے لگتا ہے۔ ایسے مریض بھی دیکھے گئے گئے جن کو 20 سے زیادہ دست آتے ہیں جو بالکل پتے خون اور لیس سے عبارت ہوتے ہیں۔

بیٹ کے بائیں جانب درد ہوتا ہے۔ اور مروڑ اٹھتا ہے۔ اس تکلیف کو اجابت

کے بعد سکون مل جاتا ہے۔ جلد اور منہ کے اندر سرخ دانے نمودار ہوتے ہیں۔ آنکھوں میں جلن اور سرخی 'کمرش درد' پیشاب میں کمی اور چہرے پر سوجن اکثر نظر آتے ہیں۔

بڑی آنت پھول جاتی ہے۔ خون بہنے اور زخموں کی وجہ سے سوراخ ہو سکتا ہے۔ بڑے جوڑا کر جاتے ہیں اور ان پر بوجھ نہیں پڑتا۔

### تشخیص

سب سے پہلا پانڈائیٹس کرنا ہے۔ اگرچہ اس ٹیسٹ میں بیماری کی کوئی خاص علامت موجود نہ ہوگی۔ لیکن اس ذریعہ سے آنتوں کی دوسری سوزشوں اور خاص طور پر ایبیا کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔

BARIUM X RAYS مریض کو ہیریم کا انیادے کر ایکسریے کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ بڑی آنت کی لمبائی میں کمی آگئی ہے۔ جب کہ وہ پھیل بھی گئی ہوگی۔ مچیلوں پر زخم اور کہیں کہیں ان پر زخموں کے سے نظر آتے ہیں۔

SIGMOIDOSCOPY اگرچہ اس کی اپنی کوئی مقررہ حالت نہیں ہوتی۔ لیکن اس طرح دوسری بیماریوں کا خدشہ دور ہو جاتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر کسی سے کوکائٹ کر خوردبینی معائنہ کے لئے باہر نکالا جا سکتا ہے۔

اس بیماری کا انجام کینسر ہوتا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے خون کی کمی 'معدنیات کی کمی اور کمزوری سے موت واقع ہو سکتی ہے۔

BIOPSY اس بیماری میں اکثر ٹیسٹ بے کار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آنت کا کوئی ٹکڑا SIGMOIDOSCOPY یا آپریشن کے دوران نکالا جا سکے تو خوردبینی معائنہ پر حتمی تشخیص ممکن ہو سکتی ہے۔ اس قسم کے ایک ٹکڑے کو جب پروفیسر غلام رسول قریشی نے معائنہ کیا تو اس کی رپورٹ یہ رہی۔

This is a segment of small intestine.

It shows multiple ulcers with normal mucosa, in between.

There are a few pseudo-polyps.

Ulcers have haemorrhagic surface with areas of haemorrhage.

This is a case of ULCERATIVE COLITIS.

اس رپورٹ سے مسئلہ واضح اور تشخیص یقینی ہو گئی۔

### علاج

مریض کو زیادہ سے زیادہ آرام دیا جائے۔ شدید اسہال کے دوران پانی کے علاوہ کچھ بھی نہ دیا جائے۔ لیکن دست قابو میں آجائیں تو سبزیاں، پھل، موٹے آلے کی روٹی، گوشت (بغیر چکنائی) دیا جاسکتا ہے۔ دودھ سے پرہیز کیا جائے۔

پانی کی کمی کے لئے درید میں گھوکوس اور نمک کے محلول کا حالات کے مطابق DRIP اور خون کی کمی کے لئے خون کی بوتل لگائیں۔ اگر منہ کے راستے آسانی سے پانی دیا جاسکتا ہو تو بوتل لگانے کی ضرورت نہیں۔

CORTICOSTEROIDS اس بیماری کے علاج میں اس دوائی کو بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ ابتدا میں HYDROCORTISONE SUCCINATE کے 100mg کا ٹیکہ صبح، شام پانچ دن لگاتار لگانے سے علاج شروع کیا جاتا ہے۔ پھر ACTH GEL 40.I.U کا ٹیکہ صبح، شام۔ کہتے ہیں کہ اس ترکیب سے شدید حملہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعد میں انہی میں سے کسی مناسب دوائی کی گولیاں مدتوں تک دی جاتی ہیں۔

SALAZOPYRIN اس کی دو گولیاں دن میں چار مرتبہ دی جاتی ہیں۔ عام طور پر یہ دوائی شدید حملہ میں مفید نہیں ہوتی۔ لیکن دو حملوں کے درمیان اسے تھکدہ کی پیش بندی کے طور پر بڑی شہرت حاصل ہے۔ ابتدا میں آٹھ گولیاں روزانہ کے بعد مقدار چار گولیاں روزانہ کر دی جاتی ہے۔ جو کافی عرصہ دی جاتی ہیں۔

دوائی کی زیادہ مقدار سے مٹی، قے، سردرد خون کی کمی اور جسم پر دانے نمودار ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ دوائی اس بیماری کے لئے بنی ہے اور اسی کے لئے مقبول عام ہے۔

AZOTHIAPRINE یہ ایک نئی دوائی ہے جسے صرف ان مریضوں میں

استعمال کیا جاتا ہے جن پر دوسری ادویہ کا اثر نہ ہو۔

خون کی کمی کے لئے فولاد کے مرکبات اس صورت میں دیئے جاتے ہیں جب مریض کا معدہ ان کو قبول کرے۔ ہم نے ان کی جگہ ہڈیوں کی تھنی دے کر فائدہ اٹھایا۔ ورنہ فولاد کے مرکبات میں FERROUS GLUCONATE زیادہ قابل قبول ہوتا ہے۔

بخار کی صورت میں FLAGYL 400mg کی پانچ گولیاں روزانہ پانچ دی جاسکتی ہیں۔

## آنتوں کے سوزشی زخم

### REGIONAL ILEITIS CROHN'S DISEASE

علامات کے لحاظ سے یہ آنتوں کی زخموں والی بیماری سے قریب ترین ہے۔ اس کا بھی ابھی تک سبب معلوم نہیں ہونکا۔ البتہ اس کے زخموں کی نوعیت سوزش والی ہے۔ علاج بھی وہی ہے جو زخموں کی دوسری بیماری میں کیا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ شدید حملہ کے دوران جراثیم کش ادویہ استعمال ہوتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر چھوٹی آنت کی بیماری ہے لیکن کبھی کبھی بڑی آنت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔

#### علامات

یہ بیماری عام طور پر 20-60 سال کی عمر کے افراد کو لوٹ کرتی ہے۔ اگرچہ بچے بھی قابو میں آ سکتے ہیں۔ پیٹ میں درد کے بار بار دورے پڑتے ہیں۔ کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اسہال ہوتے ہیں۔ ہمار چڑھتا ہے اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ پانخانے میں خون اکثر نہیں ہوتا۔ پیشاب میں سکیلیٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ انہی سے گردوں میں پتھری بن سکتی ہے۔ گردوں میں سوزش کے علاوہ ان میں پھیلاؤ HYDRONEPHROSIS اکثر ہو جاتا ہے۔ جو نئے مسائل کو جنم دیتا ہے۔

#### تشخیص

بیریم دے کر ایسے کرنے پر چھوٹی آنت کی طرح سکڑی ہوئی نظر آتی

ہے۔ SIGMOIDOSCOPE کے ذریعہ دیکھنے سے مچلیوں میں سوزش جو کہ معقد تک ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار مرجھائے ہوئے زخم بھی نظر آتے ہیں۔  
 BIOSPY یہ ایک قابل اعتماد طریقہ ہے۔ بالائی طریقہ سے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آنت کا ایک ٹکڑا کٹ کر خوردبینی معائنہ کے لئے بھیجا جائے۔ اس قسم کے ایک مریض کی یہ رپورٹ میسر آئی۔

Recieved a small portion of ileum for biopsy.

The specimen shows multiple fistulae. The wall of the ileum is markedly thickened and a few ulcers are also seen on the mucosal surface.

The specimen shows regional ileitis.

#### (CROHN'S DISEASE)

یہ رپورٹ بھی پروفیسر غلام رسول قریشی کی ہے۔ انہوں نے آنت کے خوردبینی معائنہ کے بعد علاج کرنے والوں کو مرض کی نوعیت کی واضح رپورٹ مہیا کر کے تشخیص کا اہمام دور کر دیا۔

#### علاج

اس کے لئے وہی کچھ کیا جا سکتا ہے جو آنتوں کی دوسرے زخموں والی بیماری میں کیا جاتا ہے۔ FLAGYL سے بہت آرام آتا ہے۔ SALAZOPYRIN مفید ہے۔ غذا میں لحمیات، دھامن زیادہ دیئے جائیں۔ ریٹھ دار غذاؤں اور چکنائی سے پرہیز کریں۔ کمزوری کے لئے VITAMIN B-12 کے انجیکشن مفید ہیں ان دونوں زخم پیدا کرنے والی بیماریوں کا فرق درج ذیل ہے۔

CROHN'S DISEASE      ULCERATIVE  
(REGIONAL ILEITIS)      COLITIS

کبھی کبھی	اکثر ہوتے ہیں	خونی اسہال
اکثر ہوتا ہے	شاز و نادر	پیٹ میں گولہ
اکثر ہوتی ہے	کبھی کبھی	مقعد میں سوزش
اکثر ہوتی ہے	کبھی نہیں	غذا کے ہضم میں رکاوٹ
اکثر ہوتی ہے	شاز و نادر	آنٹوں میں رکاوٹ

## طب نبوی

طب جدید نے ان دونوں بیماریوں کو یکجا کیا ہے۔ اگرچہ ان کے اسباب معلوم نہیں لیکن ان کی ماہیت سوزش کی سی ہے۔ اس لئے ان کے علاج میں جو بھی طریقہ استعمال ہو گا اس میں دافع سوزش ادویہ کی شمولیت ضروری ہے۔

ان بیماریوں میں شدت کے اسہال اور ان میں خون کی وجہ سے شدید کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ جس کا رفع کرنا ایک اہم ترین ضرورت بن جاتی ہے۔

جدید علاج میں زیادہ زور کوئی سون پر اس امید پر دیا جاتا ہے کہ وہ حساسیت کے عنصر کو دباتی ہے۔ حالانکہ یہ جسم کے اپنے دفاع کو کمزور کرتی ہے۔ اس کے زیادہ دیر استعمال سے جسم پر درم آ جاتا ہے۔ گردوں کی کارگزاری متاثر ہوتی ہے اور چہرے کی ہڈیاں باہر نکل آتی ہیں۔ معقولیت کا تقاضا ہے کہ ایسی خطرناک دوائی کے بدلے میں کوئی بے ضرر دوائی حلاش کی جائے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا ارشاد کرای تھا۔

نہی عن الدواء الخبیث (ترمذی، ابوداؤد، احمد)

(انہوں نے تکلیف اور ضرر دینے والی ادویہ کے استعمال سے منع فرمایا)

آنتوں کے زخموں کی بدولت چار اہم مسائل پیدا ہوتے ہیں۔

اسہال

پیش

سوزش اور اس کے نتیجہ میں کمزوری

اسہال کے لئے ابتدائی طور پر بھی دانہ کا لعاب شد ملا کر دینا کافی رہتا ہے۔ ایک چمچہ بھی دانہ کو ایک پاؤ پانی میں پھیٹ کر لعاب نکال کر شد ملا کر مریض کو گلاس بھر کر دے دیا جائے وہ سارا دن گھونٹ گھونٹ پیتا رہے تو اسہال ختم ہو جائے گا۔ اس کی بجائے اگر خالص بھی کا شربت یا مرہ دستیاب ہو جائے تو وہ بہت بہتر ہے۔ بلکہ خشک بھی کو پیس کر اس کا سفوف بھی مفید ہے۔

زخموں کو مندمل کرنے اور سکونا دینے کے لئے زیتون کا تیل بہترین نسخہ ہے۔ لیکن یہ تیل اس وقت دیا جائے جب مریض کا پیٹ خالی ہو۔

زخموں کو بھرنے کے سلسلہ میں شد کے اثرات کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے غلام تابعؓ بیان کرتے ہیں۔

”کان لا يشكووا قرحته ولا شينا الا جعل عليه عسلا حتى

الدميل ، اذا كان به طلاء عسلا لقنا له تداوى الدميل

بالعسل؟ فقال اليس يقول الله فيه شفاء للناس“

(ذبحہ سیوطی۔ روین)

(ان کو جب بھی کوئی زخم ہو یا کوئی اور چیز ہوتی تو وہ اس شد لگاتے رہتے تاکہ وہ مندمل ہو جاتا۔ حتیٰ کہ پھوڑے پھنسیوں پر بھی شد لگاتے تھے اور ہم نے ان سے متعجب ہو کر پوچھا کہ آپ پھنسی پر شد لگائیں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ ”اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے۔“)



شد زخموں کو مندرجہ کرتا اور کمزوری کا علاج ہے۔

قرآن مجید نے کمزوری کے لئے کھجور تجویز فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعجاز کے اتنے قائل تھے کہ وہ نوزائیدہ بچوں کو اس کی تھنی دیتے تھے۔ یہ جگر کی اصلاح کرتی اور اس کو زہروں کے اثرات سے بچاتی ہے۔ بھارتی ماہرین نے کھجور میں PECTIN دریافت کی ہے جو اس سال کی موثر دوا ہے۔ اس میں 1.62 فیصدی فولاد ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی نامیاتی شکل میں ہے جو آنتوں میں خراش پیدا نہیں کرتی۔ اس لئے کھجور تن تنہا بھی آنتوں کے زخموں کے جلد مسائل کے حل کرنے کی استعداد رکھتی ہے۔

عام حالات میں بھی 'کھجور' زخموں اور شد کے بعد کسی اور دوائی کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہم نے چند ایک مریض اتنی کوشش سے ہی تندرست ہوتے دیکھے ہیں۔ اگر سوزش اور جریان خون کا علیحدہ سے علاج کرنا ضروری ہو تو اس کے لئے کلونچی، قسط البحری اور مندی یا برگ کاسنی کا مرکب حالات کے مطابق اوزان میں تبدیلیوں کے ساتھ دیا جاسکتا ہے۔

طب جدید میں باقاعدہ طور پر مستند ہونے اور جدید ادویہ سے کماحقہ واقفیت رکھنے کے باوجود ہمیں بارہ سال کے طویل عرصہ میں آنتوں میں زخموں کے کسی بھی مریض کو کوئی سون کے مرکبات یا وریڈ کے ذریعہ انجکشن دینے کی کبھی ضرورت پیدا نہیں ہوئی حالانکہ ہم ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔

ایک عام مریض کے لئے یہ نسخہ کافی رہا۔

1- ابلے پانی میں 1-2 بڑے چمچے شد، نماد منہ اور اس کے ساتھ 4-6 کھجوریں۔

2- 13 بجے دن اور سوتے وقت 1-2 بڑے چمچے زخموں کا تیل

3- قسط البحری 40 گرام

کلونچی 50 گرام

برگ کاسنی 10 گرام

اس مرکب کا چھوٹا چمچ صبح، شام کھانے کے بعد۔

اگر سوزش ہو یا بخار ہو تو قسط کی مقدار بڑھا دی جائے۔ اسال کی صورت میں کلونجی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔  
 بیماری جب قابو میں آ جائے تو تیل ایک مرتبہ کافی ہے جب کہ کنزوری میں اضافہ کی صورت میں شد کی مزید مقدار عصر کے وقت دی جائے۔

## آنتوں کی دق

### INTESTINAL TUBERCULOSIS

متعدی بیماریوں میں تپ دق ہمیشہ سے نسل انسانی کے لئے دہشت کا سرچشمہ رہی ہے۔ یہ بیماری ایک سے دوسرے تک مریض کی سانس 'استعمال کے برتنوں کے ذریعہ پھیلتی ہے۔ اگرچہ اس بیماری کے طبی نام اور ہیں لیکن اس کی علامات اور اذیت رسائی کی بناء پر لوگوں نے اس کو ایسا صفاتی نام دیا ہے کہ اب اسی نام سے مشہور ہو گئی ہے۔ چونکہ اس میں تغار ہوتا ہے اور مریض کی زندگی اجیرن بنا دیتی ہے۔ اس لئے تپ اور دق کے نام سے پکاری جاتی ہے۔

اب تک لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بھہڑوں کی بیماری ہے جو صرف غریب لوگوں کو ہوتی ہے۔ یہ خیال قدرے درست بھی تھا۔ کیونکہ جس جسم کی قوت مدافعت ماند پڑتی ہے وہاں یہ بیماری حملہ آور ہو کر اپنے پاؤں جما لیتی ہے۔ قوت مدافعت میں کمی انہی لوگوں میں ہوتی ہے جن کی خوراک تھوڑی یا جسمانی ضروریات سے کم ہو۔ جیسے کہ صبح کے ناشتہ میں رس بکٹ اور چائے کی پیالی سے جسم کو اس کی ضروریات کے مطابق توانائی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ کیفیت معاشی بد حالی کے شکار گھرانوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ پھر یہ لوگ اپنی غذا میں لحمیات کے اہم ذریعہ گوشت کو کھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ دان کو گوشت کا متبادل قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی اب ارزاں نہیں رہی اور اس سے حاصل ہونے والی توانائی معیار کے لحاظ سے گوشت کا نعم البدل نہیں ہوتی۔ بیماریوں کے پھیلاؤ کے سلسلہ میں قوت مدافعت یا

IMMUNITY کا سب سے اہم انکشاف حضرت انس بن مالکؓ، حضرت ابو الدرداءؓ، حضرت ابی ریحانؓ اور حضرت علیؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔  
**اصل کل داء البرد۔ (دار تقنی، عقیلی، ابن مساک)**  
 (ہر بیماری کا اصل باعث جسم کی ٹھنڈک ہے)

تپ دق کے جراثیم ہمارے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں۔ مثلاً دق کا کوئی مریض جب بھی سانس لیتا ہے تو اس کی سانس کے ساتھ ہزاروں جراثیم خارج ہوتے ہیں اور آس پاس پھیل جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس کے قریب ہوتے ہیں جراثیم براہ راست ان کی سانسوں کے ساتھ جسم میں داخل ہو کر ان کو بیمار کر سکتے ہیں۔ تنگ و تاریک مکانوں میں رہنے والوں میں سے کسی مریض کو جب کھانسی آتی ہے تو وہ جراثیم کی اچھی خاصی کھپ اپنے کمرے میں پھیلا دیتا ہے۔ اگرچہ دھوپ ان جراثیم کو مار سکتی ہے مگر دھوپ اور ہوا سے محروم تنگ گلیوں اور بوسیدہ مکانوں میں یہ جراثیم مدتوں زندہ رہتے ہیں۔ اور اس طرح ایک مریض کی بدولت اسی گھر کے کئی افراد مرض کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تپ دق کے ہسپتالوں کا عملہ اور ڈاکٹر سارا دن ان مریضوں کے جراثیم کی زد میں رہتے ہیں۔ مگر عام طور پر بیمار نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جو بچ جاتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں اس بیماری کے خلاف قوت مدافعت موجود تھی اور اب اسی صلاحیت کو مصنوعی طور پر پیدا کرنے کے لئے بچوں کو اس سے بچاؤ کا ٹیکہ BCG لگایا جاتا ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ تپ دق ایک مریض کے منہ سے نکلنے والے جراثیم کی مدد سے دوسرے تندرست افراد کو ہوتی ہے۔ اس لئے کہا جا رہا ہے کہ مریض سے کم از کم ایک میٹر کا فاصلہ رکھا جائے۔ یہ بات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت توجہ میں نہ آئے۔ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

**کلم المجدوم ینک وینہ قدر مسح او رمحین**

(ابو نعیم، ابن السنی)

(جب تم کوڑھی سے بات کرو تو اپنے اور اس کے درمیان ایک سے دو تیر کے برابر فاصلہ رکھا کرو)

جراثیم کی نوعیت کے لحاظ سے کوڑھ اور تپ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر وہ دوائی جو کوڑھ پر اثر انداز ہوتی ہے وہ تپ کا بھی علاج ہے۔ صرف کوڑھ پر موقوف نہیں بلکہ خسرو، چچک، انفلوئنزا، زکام اور کئی دوسری بیماریاں بھی اسی طرح سانس کے ذریعہ پھیلتی ہیں۔ پس اگر سرکار مدینہ کے عطا کردہ اس اصول کی پیروی کی جائے تو کتنی ہی بیماریوں سے جان بچ سکتی ہے۔

تپ تپ صرف مہسوزوں کی بیماری نہیں یہ جسم کے کسی حصے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اس طرح آنٹوں پر تپ کا حملہ اچھی خاصی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔

### بیماری کا سبب اور ذریعہ

اگرچہ جسم کا کوئی حصہ بھی تپ سے محفوظ نہیں لیکن آنٹوں پر اس کا حملہ ابھی تک بحث کا باعث بنا ہوا ہے۔ تپ تپ کے جراثیم کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔

HUMAN	TUBERCULOSIS	انسانی قسم
BOVINE		مویشیوں کی قسم
AVIAN		پرندوں کی قسم

انسانی قسم کے جراثیم انسانوں کے لئے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جب کہ مویشیوں اور پرندوں والی اقسام کے جراثیم انسانوں کے لئے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے۔ خیال کیا جاتا تھا کہ مویشیوں میں تپ تپ عام ہے۔ انگلستان میں جس گائے کو تندرستی کا اول انعام ملا وہ بھی تپ کا شکار پائی گئی۔ ایسے بیمار جانوروں کا دودھ پینے سے تپ تپ کے جراثیم آنٹوں میں جا کر تپ کی بیماری پیدا کرتے ہیں۔

پروفیسر عبدالجید خاں نے لاہور میں آنٹوں کی تپ کے 300 مریضوں کے پاخانوں سے تپ کے جراثیم حاصل کر کے مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ انسانی قسم کے تھے۔ میوہپتال میں تپ کے پروفیسر عبدالعزیز نے بھی تپ کے سینکڑوں مریضوں کے معائنہ

کے بعد یہی معلوم کیا کہ انسانوں میں آنٹوں کی دق عام طور پر مویشیوں والی اقسام سے نہیں ہوتی۔

انسانوں میں آنٹوں کی دق عام طور پر ~~بھڑک~~ بھڑکوں کے متاثر ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ مریض جب اپنا جراثیم آلود تھوک لگتا ہے تو عجز جراثیم آنٹوں میں جا کر ان کو بھی لپسٹ میں لے لیتے ہیں۔ وہ ادویہ جو ~~بھڑک~~ بھڑکے کے علاج کے لئے دی جاتی ہیں وہی آنٹوں کا علاج بھی کر دیتی ہیں۔ البتہ ایسے مریض بھی دیکھے گئے ہیں جن میں جراثیم اندر داخل ہوئے ان کو ~~بھڑک~~ بھڑکوں کی قوت مدافعت کی وجہ سے وہاں پر تو موقع نہ ملا مگر وہ آنٹوں میں جا گزریں جو گئے اور ~~بھڑک~~ بھڑکے تندرست ہونے کے باوجود آنٹوں میں دق ہو گئی۔

تپ دق کے مریض کی حالت جب خراب ہونے لگتی ہے تو عام طور پر اسے اسہال اور پیٹ میں دوسری شکایات محسوس ہونے لگتی ہیں۔ پرانے زمانے میں اس مرحلہ کو زندگی کے انجام کا آئینہ دار سمجھا جاتا تھا۔ ایسے مریض بھی دیکھنے میں آتے ہیں جن کی صرف آنتیں متاثر ہوتی ہیں۔

چند سالوں سے تپ دق سے بچاؤ کے لئے BCG کا ٹیکہ ایجاد ہوا ہے۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ یہ لاہور میں خاکسار کی نگرانی میں لگائے گئے۔ نوزائیدہ بچوں کو کسی بھی مرحلہ پر لگایا جاسکتا ہے۔ جب کہ بہتر یہ ہے کہ 8 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو دوبارہ ٹیسٹ کئے بغیر نہ لگایا جائے۔ ہم نے 1980ء میں لاہور کے سکولوں میں پڑھنے والے چھٹی جماعت تک کے ہر بچے کو یہ ٹیکہ لگا دیا تھا۔ اس سے یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ آئندہ نسل دق سے محفوظ ہوگی۔ ملک میں بچوں کو چھ متعدد بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کے یہ مراکز بڑی اہمیت رکھتے ہیں کہ یہ قوم سے تپ دق کو ختم کرنے کا ذریعہ ہوں گے۔

خوراک میں حیاتین اور لمبیات دق کے خلاف قوت مدافعت مہیا کرتے ہیں۔ یہ حیاتین تازہ سبزیوں، سبج والی غذاؤں، گاجروں اور ساگ میں پائی جاتی ہے۔ وہ جانور جن کی خوراک میں سبز چار شامل ہو ان کے دودھ میں حیاتین موجود ہوتی ہے۔ لیکن

دودھ کو اگر کھلے برتن میں زیادہ دیر تک ایلا جائے تو اس کی حیاتیات ضائع ہو جاتی ہے۔

حیاتیات A کا سب سے بڑا خزانہ مچھلی اور اس کے تیل میں ہوتا ہے۔ برفانی سمندر کی مچھلیوں میں قدرت نے ٹھنڈک کو برداشت کرنے کی جو طاقت رکھی ہے وہ ان کے جگر کے تیل میں موجود رہتی ہے۔ ان مچھلیوں کے جگر کا تیل حیاتیات میا کرنے کے علاوہ نزلہ، زکام، کھانسی کے علاج میں اہمیت رکھتا ہے۔ بازار میں یہ تیل بڑی مناسب قیمت پر مل جاتا تھا۔ پھر بند ہو گیا اور اب کسی کی فلی بھگت سے ایک کمپنی نے یہ تیل درآمد کیا ہے جس کی چار اونس کی شیشی 115 روپے میں فروخت ہوتی ہے۔ یہ عوام پر ظلم ہے۔ جو لوگ برداشت کر سکتے ہیں وہ بچوں کو SEVEN SEAS COD LIVER OIL کے چند قطرے پینے میں 2-3 مرتبہ پلا دیا کریں تو یہ بچے متعدی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔

تپ دق کے جراثیم ایلانے سے نہیں مرتے۔ مریض کے کپڑے، قمیص، دان اور دوسری آلودہ چیزیں اگر دو گھنٹے دھوپ میں رکھ دی جائیں تو جراثیم مرجائیں گے۔ قدرت نے ان سخت جراثیم کو مارنے کی آسان صورت سورج کی شعاعوں میں رکھ دی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ رہائشی کمروں میں براہ راست دھوپ آئے۔ سردی کے موسم میں بھی دن کے کسی حصے میں کمروں کے دروازے کھڑکیاں کھول دی جائیں تاکہ کھلی ہوا ان میں گردش کرے اور دھوپ سے ان میں موجود جراثیم مرجائیں۔

تپ دق متعدی بیماری ہے۔ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ اس لئے مریض کو تندرست افراد سے علیحدہ دوسرے کمرے میں رکھا جائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اسے ہسپتال میں داخل کروا دیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم از کم اس کا بستر، کپڑے اور برتن علیحدہ ہوں اور ان کو روزانہ دھوپ لگوائی جائے۔ تندرست افراد کو BCG کا ٹیکہ لگے اور دیگر اہل خانہ کی غذا میں حیاتیات الف یا A کو مچھلی کے تیل یا اس کی گولیوں ADEXOLIN کی صورت میں یا حیاتیات والی غذاؤں جیسے کہ ساگ اور گاجر کو شامل کیا جائے۔

بہتر یہ ہے کہ ٹنکہ بچے کے دائیں کندھے سے ذرا نیچے بازو پر لگایا جائے مگر دوائی تازہ ہو۔ دوائی کو تیار کرنے کے بعد اگر اسے دو گھنٹوں میں استعمال نہ کیا جائے یا اسے دھوپ لگ جائے یا خراب ہو جاتی ہے۔

اندازہ لگایا گیا ہے کہ جن بچوں کو BCG کا ٹنکہ لگ چکا ہے ان میں سے 80 فیصدی دق کی ہر قسم سے محفوظ رہیں گے۔

### علامات

پیٹ میں دق متعدد صورتوں میں ہوتی ہے۔ مثلاً چھوٹے بچوں میں جب سوکھا وغیرہ بیماریوں کی وجہ سے بچے کو شدید کمزوری لاحق ہوتی ہے تو اس دوران اگر اس پر دق کا حملہ ہو تو اس کے سارے اندرونی اعضاء پر مسور کی دال کے دانوں کی طرح چھوٹے دانے ٹپکتے ہیں جن کے وسط والا حصہ گھا ہوتا ہے۔ یہ دانے سانس کی ٹالیوں 'گھا' آنتوں حتیٰ کہ آنکھوں کی اندر اور دماغ میں بھی ہوتے ہیں اور یوں چند دنوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ دق میں موت اتنی جلدی نہیں ہوتی۔ اسے ACUTE MILIARY TUBERCULOSIS کہتے ہیں۔ بخار، کمزوری، کھانسی، اسہال اس کی عمومی علامات ہیں جو کسی جگہ کی دق سے ہو سکتی ہیں۔

آنتوں کی دق زیادہ طور پر 20-40 سال کی خواتین کو ہوتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی زیادہ شکار خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ مسئلہ ہمارے لئے ہمیشہ حیرت کا باعث رہا کہ یہ بد صورت عورتوں کو کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال ایک مرتبہ پروفیسر زاہد میر سے کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ تپ دق کے جراثیم ایک کیسیاوی ذہر پیدا کرتے ہیں جو چہرے کو نکھارتی ہے۔ ان خواتین کے چہروں کی بشارت دق کی زہروں سے پیدا ہوتی ہے۔

سب سے بڑی علامت پیٹ میں درد ہے۔ یہ درد کھانے کے بعد زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر ناف سے نیچے اور پیٹ کے دائیں طرف ذرا نیچے کی سمت ہوتا ہے۔ درد کے دوران اوجابت ہو جائے یا قے آجائے تو درد میں کمی آ جاتی ہے۔ عام مریضوں کو یہ درد کبھی قوتیج کی صورت میں ہوتا۔ لیکن زخموں کی وجہ سے اگر آنتوں میں رکاوٹ



پیدا ہو جائے تو پھر درد کی شدت بڑھتی ہے اور قویٰ جیسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔  
مریض کو اسہال ہوتے ہیں۔ پاخانہ سخت بھی ہو سکتا ہے اور پتلا بھی۔ اس میں  
عام طور پر خون اور پیپ نہیں ہوتے البتہ لیس اور چکنائی کافی ہوتے ہیں۔ روزانہ  
تین سے چھ پاخانے آنا معمولی ہے۔

چونکہ مریض کو کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں درد ہوتا ہے یا ہر کھانے کے بعد  
ایک اجابت ہو جاتی ہے۔ اس لئے بھوک اڑ جاتی ہے۔ اسے خوراک سے دہشت  
ہوتی ہے۔ سب دن جسم کے کسی بھی حصے میں ہو اس کی دو اہم علامات ضرور ہوتی  
ہیں۔ بھوک کا کم ہونا اور وزن کا کم ہونا۔ آنتوں کی دق میں یہ دونوں علامات زیادہ  
نمایاں ہوتی ہیں۔

مرض کی باقی علامات کا تعلق دق کی نوعیت سے ہے۔ جس شخص کو پہلے سے  
بخار، کھانسی، بلغم اور اس کے ساتھ ہچھڑوں میں سوراخ ہو اس کی آنتوں کا متاثر  
ہونا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ ایسے میں آنتوں کی علامات کے ساتھ چھاتی کی علامات بھی  
شامل ہو جائیں گی۔ ان کے بخار کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔

جن مریضوں کو دق جراثیم سمیٹاؤدہ خوراک کے ذریعہ حاصل ہوئی ان کی علامات  
پیٹ درد، اسہال اور کمزوری تک محدود رہتی ہیں۔ یہ جلدی تھک جاتے ہیں اور بخار  
باقاعدگی سے نہیں ہوتا۔ زیادہ تر شام کو درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ جب آنتوں کا  
زیادہ حصہ متاثر ہو جائے تو پھر ہر وقت کا بخار شامل ہو جاتا ہے۔ جس پر اکثر طیریا کا  
مغالطہ ہوتا ہے۔

کچھ مریضوں کے پیٹ کے نچلے حصہ میں گولہ محسوس ہوتا ہے۔ جسے کینسر سمجھا جا  
سکتا ہے۔ لیکن اس کو دبا نہیں تو درد ہوتا ہے جو کہ کینسر کا خاصہ نہیں۔

ایک خاتون کے پیٹ میں دائیں طرف ایک گولہ تھا۔ کسی نے اسے  
کینسر بتایا۔ اس کی علاوہ چھاتی میں کوئی تکلیف نہ تھی۔ معلوم ہوا کہ انہوں  
نے بھینس رکھی ہوئی ہے اور ان کو کچا دودھ پینے کا شوق ہے۔ خون کا  
ESR کیا گیا تو وہ 90 ملی لیٹر تھا۔ اسے دق قرار دے کر علاج کیا گیا ایک ماہ

میں یہ "کینسر" ٹھیک ہو گیا۔

آنتوں کی دق کا شبہ علامات کی بجائے معالج کی اپنی فراست سے ہوتا ہے۔ ایسے درجنوں مریض دیکھے گئے ہیں جن کے بارے میں کسی نے دق کا خیال نہ کیا اور وہ مدتوں پیچش وغیرہ کی دوائیں کھاتے رہے۔

تشخیص

عام حالات میں شبہ ڈالنے والی علامت کے ساتھ جب خون کا ESR کیا جائے تو اس کا نتیجہ مردوں میں 25 ملی میٹر سے اوپر اور عورتوں میں 35 سے زیادہ ہو تو اسے دق قرار دینے کا سوچنا چاہئے۔

MONTAUX'S TEST دق کے خصوصی ہسپتالوں میں مشتبہ مریضوں کی کلائی اور کبھی کے درمیان سامنے کی طرف جلد کی موٹائی میں OLD TUBER CULIN کا ایک قطرہ ٹیکہ کی صورت میں داخل کیا جاتا ہے۔ دو دن کے بعد ٹیکہ والی جگہ کے ارد گرد سرخی اور ورم کو فیتے سے ماپ لیا جاتا ہے۔ اگر یہاں سرخی نہ ہو تو مریض کو چھپ دق تو نہیں لیکن اس کے ساتھ بیماری کا مقابلہ کرنے کی استعداد بھی نہیں۔ ایسے شخص کو BCG کا ٹیکہ لگا دینا چاہئے۔ اگر وہاں پر سرخی کی لمبائی 4 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو تو یاد رکھا جاتا ہے کہ اس کے جسم میں دق کا مادہ موجود ہے۔

CULTURE مریض کے پاخانہ یا آنتوں سے اوزار ڈال کر وہاں سے برآمد کئے مواد کو خصوصی نوعیت کے کیمیائی مرکبات کی ہلیٹوں پر لگا کر خصوصی لیبارٹریوں میں ہفتوں تک ایک خاص درجہ حرارت پر رکھ کر توقع کی جاتی ہے کہ اگر دق کے نیم اس مواد میں موجود ہوں تو وہ اپنے پسندیدہ حالات میں خوب پھولیں گے اور سطح اپنی زیادہ تعداد کی وجہ سے پہنچانے جائیں گے۔

یہ طریقہ عام طور پر یقینی سمجھا جاتا ہے لیکن تین سے چھ ہفتوں تک نتائج کا نام ممکن نہیں ہوتا۔ اخراجات اور طوالت کی وجہ سے زیادہ مقبول نہیں۔

ANIMAL INOCULATION مریض کے جسم سے خارج ہونے والے گوشتی اور اسی قسم کے دوسرے جانوروں کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ پچھ ہفتے بعد

جانور کو ہلاک کر کے اس کا پوست مارا لیا جاتا ہے۔ اندرونی اعضاء پر اگر دق کے نشانات موجود ہوں تو دق کی تشخیص ہو جاتی ہے۔

**ZIEHL NELSON TEST** مریض کے جسم سے برآمد کئے گئے مواد (تھوک - پیپ) کو شیشے کی سلائیڈ پر لگا کر خاص قسم کی دواؤں اور تیزابوں سے گزارا جاتا ہے۔ ان افعال سے دق کے جراثیم رنگین ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سلائیڈ جب خوردبین میں دیکھی جاتی ہے تو اس میں دق کے جراثیم آسانی سے شناخت ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ عام طور پر **BOISPY** کی بیماری کی تشخیص کے لئے بلغم پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بلغم میں بھی جراثیم اس وقت نظر آتے ہیں جب بیماری بڑھ چکی ہو یا **BOISPY** میں پھوڑا بن چکا ہو۔ اگرچہ دق کے ہر مریض میں جراثیم نظر نہیں آتے لیکن جن میں آتے ہیں ان میں کسی مغالطہ کی گنجائش نہیں رہتی۔

**SIGMOIDOSCOPY** بڑی آنت کی دوسری بیماریوں کی طرح اس میں بھی اس اوزار کی مدد سے بڑی آنت کو براہ راست دیکھا جاسکتا ہے۔ پھر وہاں پر دیکھے جانے والے زخموں سے مواد حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو وہاں سے کسی جملی کا ٹکڑا بھی کاٹ کر نکالا جاسکتا ہے۔ ایسے ٹکڑوں کو خصوصی لیبارٹریوں میں **BIOPSY** کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ جہاں جسم انسانی کی جھلیوں کے ماہر **HISTO PATHOLOGIST** ان کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ وہاں پر کونسی بیماری پائی ہو ہے۔ یہ بیماری دق یا کینسر وغیرہ میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عام حالات میں ا حضرات کی رائے یقینی اور تشخیص حتمی سمجھی جاتی ہے۔ **BIOSPY** کا نتیجہ معا کرنے والے کی علمی صلاحیت کے ساتھ ساتھ عملی تجربہ پر منحصر ہے۔

**BOISPY** بذات خود ایک قابل اعتماد طریقہ ہے۔

کے ذریعہ آنت کا ٹکڑا حاصل کر کے یا آپریشن کے دوران آنت کا ایک ٹکڑا نکڑا اس کی نوعیت جاننے کے لئے علم الامراض کے ماہرین کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ کو مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد اس کا خوردبینی معائنہ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ کونسی بیماری کا شکار ہے۔ اس قسم کا ایک ٹکڑا خوردبینی تشخیص کے لئے پروا

رسول قریشی کے پاس جب گیا تو انہوں نے یہ نتیجہ دیا۔

Received a segment of small and large intestine (coecum)

There is a necrotic mass at the ileo coecal junction.

The cut surface reveals areas of caseation necrosis.

The serosa has multiple lymph nodes, having caseation necrosis.

The specimen shows INTESTINAL TUBERCULOSIS.

اس رپورٹ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مریض کو آنتوں کی دق ہے اور اس طرح مرض کی حتمی تشخیص میسر آ جاتی ہے۔

### علاج

طب جدید کو دق کا علاج حال ہی میں میسر آیا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے زیادہ تر پھل کے تیل پر دارودار ہوتا تھا۔ دق کے اسپتالوں میں مریضوں کو کیکر کی گوند ملا کر پھل کے تیل کا کچھر T.B. TONIC کے نام سے پلا کر توقع کی جاتی تھی کہ وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اچھی غذا اور کھلی ہوا کے ساتھ ان کو زیادہ سے زیادہ آرام کرنے دیا جاتا تھا۔ اس طرح جسم کی توانائی بچا کر اس کی قوت مدافعت بڑھاتے تھے۔ ہسپتالوں میں آکسیجن داخل کرنے کا ایک لمبا سلسلہ ہوتا تھا اور آخر میں مریض کا مزید علاج کرنے کی بجائے اسے اکثر بھگا دیتے تھے۔ کیونکہ اس کی موت اگر شفاخانہ میں ہو تو وہ اپنی بہترین کارکردگی کا ریکارڈ خراب کر لیں گے۔

متحدہ ہندوستان میں تب دق کے اسپتالوں کو ہر سال عموماً کارکردگی کے انعامات ملتے تھے۔ انعام حاصل کرنے کی ترکیب یہ تھی کہ ایسے مریض داخل کئے جائیں جن کی بیماری ابتدائی مراحل میں ہو اور اگر حالت خراب ہونے لگے تو یہ اندراج ہوتا تھا۔

”مریض معالج کے مشورہ کے خلاف اپنی مرضی سے چلا گیا۔“

لکھ کر اپنے ریکارڈ میں موت کے اندراج سے بچ جاتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ ہندوستان کے سب سے زیادہ انعام حاصل کرنے والے سینی نوریم میں داخل

تھے۔ جب ان کو شبہ ہوتا کہ مریض کی حالت خراب ہونے لگی ہے تو اسے چلا کر دیتے۔ حالانکہ وہ دق ہی کے ڈاکٹر تھے مگر ریکارڈ کو شاندار رکھنے کے لئے انہیں مزید علاج سے محروم کر دیا گیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ شفا دینے والی ذات اوپر ہے اور اس نے ان کو شفا کا راستہ دکھا دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک دق کے علاج کے اصول تبدیل نہیں ہوئے۔ ہسپتال میں صرف ابتدائی مرحلہ کے مریض داخل کئے جاتے ہیں۔ جن کی حالت ذرا بھی خراب ہونے لگے اسے بھگا دیا جاتا ہے۔

### اصول علاج

1۔ غذا میں دودھ، انڈا، گوشت، مکھن، پھل اور سبزیاں دی جائیں۔ اکثر مریض یہ فرست برداشت نہیں کر سکتے اس لئے وہ ہسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں۔ لاہور کے اکثر ہسپتال یہ غذا میا کرتے ہیں۔ بلکہ دیکھا گیا ہے کہ کئی غریب مریض اپنے راشن میں سے کچھ بچا کر اپنے گھر والوں کو بھی روانہ کر دیتے ہیں۔

2۔ اگر اسہال ہوں تو مکھن نہ دیا جائے۔

3۔ وٹامن خوب دی جائے خاص طور پر A-D-C اب کمزوری اور بھوک کے لئے B بھی شامل ہو گئی ہے۔

4۔ بھوک بڑھانے کے لئے MOSEGAR-PERJACTIN دی جائے۔ یہ دونوں فیند بھی لاثی ہیں۔

5۔ سوزش کا علاج کیا جائے۔

6۔ کمزوری کے لئے اضافی خوراک سے بنی ہوئی ادویہ از قسم COMPALAN اور خون کی کمی کے لئے فولاد کے مرکبات۔

7 رافع دق ادویہ۔

### دافع دق ادویہ

اس سلسلہ کی ابتدا STREPTOMYCIN-PAS-INH سے ہوئی ہے اور اب اس میں چند ایک اور ادویہ بھی شامل ہو گئی ہیں۔ آج کا جدید فرست میں

THIOCETAZONE - PYRAZINAMIDE - VIOMYCIN  
 - PAŞ - INH - CYCLOSERINE - ETHAMBUTOL - RIFAMPICIN  
 KANAMYCIN شامل ہیں۔

عام طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک دوائی دینے کی بجائے ایک اثر کی دوا اس سے زیادہ دوائیں ملا کر دی جاتی ہیں۔ جیسے لیڈرلے کمپنی نے MYAMBUTOL INH LEDERNIFF میں دو دوائیں یکجا کر دی ہیں۔ اسی طرح RIFINH-LEPLIT میں RIFAMPICIN: 300mg اور INH 150mg ہوتی ہے۔ سیسا کمپنی کی REMACTIZID مشہور دوائی ہے جس میں INH کی مقدار 150mg اور RIFAMPICIN 100mg ہوتی ہے۔ بائیر کمپنی کی THIOCETAZONE INH میں THIOCETAZONE کو بنیاد بنا کر INH کو امدادی کے طور پر شامل کر لیا جاتا ہے۔ جرمن استاد اب بھی THIOCARBIZONE کو پسند کرتے ہیں اور اس کا تمام دوائیاں اسی بنیاد پر INH کے ساتھ ہوتی ہیں۔

### دق کے علاج کے تجزیاتی افادات

دق کے علاج کے لئے اب دواؤں کی کثیر تعداد موجود ہے کسی معالج کے لئے ان میں سے صحیح دوائی کا انتخاب اور اسی سے پیدا ہونے والے مسائل سے پوری واقفیت حاصل کئے بغیر ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں۔ سنی سنائی دواؤں کا استعمال خطرات کا باعث ہوتا ہے۔ اس لئے ہم نے اس کتاب کی غرض سے تپ دق کے تین ماہروں سے رجوع کیا۔ ڈاکٹر سید آغا طاہر زیدی مختلف سرکاری اداروں میں 40 سال دق کا علاج ان دنوں سے کر رہے ہیں کہ جب مریضوں کے پیٹ اور ہسپتالوں میں ہوا بھری جاتی تھی اور جب مریض بہتر نہ ہو تو اسے کسی ٹھنڈے مقام پر جانے کی ترکیب بتا کر اپنی جان چمڑانے کا رواج تھا۔ ڈاکٹر زیدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اب بھی اس پرانے نسخے کا قائل ہوں۔

1-STREPTOMYCIN

1/2 Gm 150 im نیچے

2- INH 100 mg tablets

ایک گولی صبح، دوپہر، شام 9 ماہ

3- THIOISEMICARBIZONE tablets

ایک گولی صبح، دوپہر، شام

نمبر 2 اور تین اکٹھی دی جاسکتی ہیں۔ کھانے کے بعد دینے سے پیٹ میں خراش کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔

نمبر 1 ٹیکوں سے اعصاب میں سوزش اور کان کے اعصاب پر ناپسندیدہ اثرات کی وجہ سے سماعت خراب ہو سکتی ہے یا چکر آتے ہیں۔ ایسی صورت میں یہ دوائی بند کر کے اس کی جگہ کوئی دوسری چیز دے دی جائے۔

مریض کی بہتری کو باقاعدگی سے وزن کرنے، خون کا ESR کرتے ہوئے توجہ میں رکھنا چاہئے۔

جدید اضافوں کی روشنی میں ان کا پسندیدہ علاج یہ ہے:

1- RIFAMPICIN tablets

300 mg روزانہ

2- INH 100 mg tablets.

ایک گولی صبح، دوپہر، شام

3- Myambutal 400 mg

ایک گولی صبح، شام

یہ نسخہ حق کی جملہ اقسام کے لئے بڑا مفید اور تیرہ ہدف ہے۔ لیکن اس کے اجزاء سے کچھ خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ رہے گا۔ اس لئے علاج کے دوران مریض کے خون اور پیشاب کو یہ کان کے خطرہ کی پیش بندی کے لئے چیک کرتے رہیں۔ کیونکہ نمبر 1 جگر کو خراب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ شبہ کی صورت میں خون کا SGOT ٹیسٹ بھی ہر تین ماہ کے بعد کر لیا جائے۔ نمبر 2 سے اعصابی سوزش ہو سکتی ہے۔ جس کا اظہار مختلف مقامات پر درروں کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس لئے علاج کے

ساتھ VITAMIN-B کی کسی اچھی کمپنی کی گولیاں شامل رکھی جائیں۔

نمبر 3 آنکھ کے پچھلے حصہ RETINA کو خراب کر سکتی ہے۔ بدھستی سے یہ جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جس کے لئے نہ کوئی موثر دوائی موجود ہے۔ اور نہ ہی اس کا عام حالات میں آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ لاہور میں پروفیسر سید واصف محی الدین قادری نے لیزر شعاعوں کی مدد سے اس کے کچھ کامیاب آپریشن کئے ہیں لیکن جو حصہ ایک مرتبہ ٹھس جائے اس کی جگہ نیا پیدا کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس لئے علاج کے دوران مریض کی بصارت پر نظر رکھی جائے اور معمولی تکلیف میں امراض چشم کا کوئی ماہر مریض کی آنکھ کا FUNDUS دیکھے۔ تاکہ خرابی مستقل شکل اختیار کرنے سے پہلے روک لی جائے۔

علاج کے دوران خون کے ضروری ٹیسٹ کرنے کے علاوہ HB% TLC-DLC بھی باقاعدہ ہوتے رہیں تاکہ اگر کوئی گریڈ ہونے کو آئے تو اس کا بروقت پتہ چل جائے اور صحیح وقت پر نقصان دینے والی دوائی بند کر دی جائے۔

ڈاکٹر سید اختر علی بخاری سید مٹھا بازار میں بی بی انفنیٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں اور ان کو تپ دق کے علاج میں 25 سالہ تجربہ ہے۔ ان کی رائے میں:

1- STREPTOMYCIN

1 GM \_\_\_\_ ایک ٹیکہ روزانہ 3 ماہ

2- INH 300 mg Tablets

ایک گولی صبح، دوپہر، شام

3- MYAMBUTOL 400 mg Tablets

ایک گولی صبح، شام

4- POLYBION - C Tablets

ایک گولی صبح، شام

ڈاکٹر بخاری صاحب کو PYRAZINAMIDE بالکل پسند نہیں۔ کیونکہ یہ جگر پر برے اثرات رکھتی ہے۔ جب اس سے بہتر اور محفوظ ادویہ موجود ہیں تو پھر خطرہ



مول لینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

ڈاکٹر طاہرہ بٹ کارپوریشن کے ہسپتال برائے قلب کی میڈیکل سپرنٹنڈنٹ اور قلب کے علاج کے دوسرے مراکز میں علاج کا 25 سالہ تجربہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابتدائی قلب میں یوں علاج کیا جائے۔ دو ماہ کے لئے یہ پروگرام ہو۔

#### 1- STREPTOMYCIN 1 GM

ایک ٹیکہ روزانہ 1/m

#### 2- INH 100 mg Tablets

ایک گولی صبح، دوپہر، شام

#### MYAMBUTOL 400 mg

ایک صبح، دوپہر، شام

دو ماہ کے بعد مریض تندرستی کی سمت گامزن پایا جائے تو پھر سات ماہ کے لئے اسی نسخہ میں سے کوئی دو دوائیں دی جائیں۔ ڈاکٹر بٹ کہتی ہیں کہ میں بہتری کی جانب جانے والے مریضوں کے لئے چھ ماہ کا یہ کرش پروگرام زیادہ پسند کرتی ہوں۔

#### 1- RIFAMPICIN tablets

450 ملی گرام روزانہ

#### 2- INH 100 mg tablets

تین گولیاں روزانہ

#### 3- MYAMBUTOL 400 mg tablets

ایک صبح، دوپہر، شام

اس نسخہ میں نمبر 3 کی بجائے STREPTOMYCIN کے ٹیکے اگر تین ماہ کے لئے شامل کر کے پھر چھوڑ دیئے جائیں تب بھی ٹھیک رہے گا۔

ان تمام نسخوں کو توجہ دیں تو ان تجویز کرنے والوں کے پاس نہ صرف کہ مشاہدات کی ایک لمبی دولت ہے بلکہ ان کے یہاں روزانہ 400 مریضوں سے کم نہیں آتے۔ ان کے یہاں باہر سے علاج کروا کر جانے والے مریضوں کے علاوہ ہر وقت

200 مریض ہسپتال میں داخل رہتے ہیں۔ جن پر ادویہ کے اثرات، فوائد اور نقصانات ان کی توجہ میں رہتے ہیں۔ اگرچہ یہ سب حضرات علاج کے ہمہ گیر ہونے کے دعوے دار ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی عرصہ علاج کو 9 ماہ سے کم قرار دینے کو تیار نہیں اور اگر مرض اس سے پرانا ہو تو پھر عرصہ علاج 18-12 ماہ تک ہو سکتا ہے۔ کیونکہ مریض کے ظاہری طور پر تندرست ہو جانے بلکہ تمام ٹیسٹ ٹھیک ہونے کے باوجود کچھ عرصہ بعد بیماری پھر سے آن لیتی ہے۔ مریض جہاں بھی کمزور ہوا دق کے چھپے ہوئے جراثیم اسے آن گھیرتے ہیں۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ ظاہری طور پر تندرست ہونے کے باوجود مریض اپنا علاج جاری رکھیں۔

علاج میں استعمال ہونے والی ہر دوا کے مضر اثرات کی فہرست اچھی خاصی ہے۔ اس لئے ہر ماہ متعدد قسموں کے ٹیسٹ کر کے جسم کا پتہ چن رہنا چاہئے۔ اگرچہ حکومت پاکستان کی کوشش سے دق کی ادویہ کی قیمتیں خاص طور پر کم کر دی گئی ہیں لیکن جو بھی علاج کیا جائے وہ روزانہ کے 55 روپے سے کم نہیں پڑے گا۔ نیست، معالج کی نہیں اور ضروری غذا اس سے علاوہ ہیں۔

دق کی بیماری کی وجہ سے آنتوں میں گرہیں پڑ جاتی ہیں یا زخموں کے ٹھیک ہونے کے بعد آنتوں کے بعض حصے سکڑ جاتے ہیں یا آس پاس کی چیزوں سے چپک جاتے ہیں۔ ان حالات میں کوئی دوائی مریض کی دھگیری نہ کر سکے گی۔ آنتوں میں رکاوٹ یا پیٹ کے ایک طرف جھک جانے یا مسلسل درد کا شافی علاج آپریشن ہے آپریشن کی مدد سے خرابی دور ہوتی ہے لیکن دق کا باقاعدہ علاج اس کے بعد بھی پورا کرنا ہو گا۔

## طب نبوی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تپ دق کے علاج میں جو قابل قدر تحائف عطا کئے ہیں۔ ان کا شمار میں لانا محال ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کوڑھ کی مثال سامنے رکھتے ہوئے مریض سے ایک میسر کا فاصلہ رکھنے پر متوجہ کیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جسم

میں قوت مدافعت کی کمی بیماری کا باعث ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مریض کا علاج کرو تو اس کی قوت مدافعت پر بھرپور توجہ رکھی جائے۔ ورنہ علاج بے کار ہو گا۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

**كلوا الزيت و ادنوا به فان فيه شفاء من سبعين داء منها  
الجنم**

(ابو نعیم)

(زیتون کا تیل کھاؤ اور اس کی مالش کرو کیونکہ اس میں ستر بیماریوں

سے شفا ہے جن میں سے ایک کوڑھ بھی ہے)

سائنس کے ایک طالب علم کے لئے یہ اشارہ کافی ہے کیونکہ کوڑھ اور دق کے جراثیم ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو دوائی دق میں مفید ہے وہ کوڑھ میں بھی مفید ہے۔ زیتون کا تیل جب کوڑھ میں شفا دیتا ہے تو اسے لازماً دق میں بھی موثر ہونا چاہئے۔ مگر انہوں نے بیماری کی اہمیت کے پیش نظر اس بات کو مزید وضاحت عطا فرمائی۔ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں۔

**امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتداوی ذات الجنب  
بالقسط البحری والزیت**

(احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

(ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ذات الجنب کا

علاج قسط البحری اور زیتون کے تیل سے کیا کریں)

اسی مسئلہ پر حضرت زید بن ارقم دوسرے نسخے سے یوں آگاہ کرتے ہیں۔

**کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمنع الزیت والورس من  
ذات الجنب**

(ترمذی، ابن ماجہ، احمد)

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الجنب کے علاج میں زیتون کے

تیل اور درس کی تعریف فرمایا کرتے تھے)

ذات الجنب پھیڑوں کو دھانپنے والی پھلیوں کی سوزش کو کہتے ہیں۔ یہ صرف سوزش بھی ہو سکتی ہے اور اس میں پانی بھی پڑ سکتا ہے۔ جسے طب جدید میں PLEURISY کہتے ہیں۔ لعاب دار پھیڑوں میں مزمن سوزش کی وجہ سے ان میں درم آتا ہے اور پانی جمع ہو جاتا ہے یہ کیفیت اطباء کے نزدیک PLEURISY WITH EFFUSION ہے۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ بیماری دق کی قسم ہے۔ اس لئے پلوری کا علاج دق کی دواؤں سے کیا جاتا ہے۔ یہ جواب بیسویں صدی میں حاصل ہوا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی توضیح اور ذات الجنب کی تشریح میں امام محمد بن عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں۔

ان الذات الجنب سل

(ذات الجنب اصل میں دق اور سل ہے)

اور یہی کچھ جدید ترین تحقیقات کا نچوڑ ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دق کے علاج میں زیتون کا تیل، قسط البحری اور درس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ایک روایت میں قسط یا درس یا قسط اور درس بھی ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی بات کی دو دواؤں اگر جمع کر لی جائیں تو فائدہ بڑھ جاتا ہے جسے آج کی طب میں SYNERGISM کہتے ہیں۔ طب یونانی میں تو یہ بات اطباء کو عرصہ سے معلوم تھی اس لئے نسون میں ایک ہی اثر کی متعدد ادویہ شامل کی جاتی تھیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے قدردان پیشہ سے ایک دوا کی کے قائل تھے مگر اب جرمنی اور امریکہ سے متعدد دواؤں ایسی آ رہی ہیں جن میں کئی عناصر شامل ہوتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دوائی زیتون کا تیل ہے۔ جس کے بارے میں خان بہادر ڈاکٹر سعید احمد خاں صاحب ایک دلچسپ واقعہ بیان بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر سعید احمد خان سرحد گورنمنٹ ہسپتال سنی ٹوریم ڈاؤر کے چالیس سال تک میڈیکل سپرنٹنڈنٹ رہے ہیں اور متحدہ ہندوستان میں بھی ان کی مسیحا کی شہرت تھی۔

ایک ڈاکٹر کو تپ دق ہوئی تو وہ علاج کے لئے مدراس کے ہسپتال سنی ٹوریم میں داخل ہو گیا۔ ہسپتالوں کو سیکڑے کے لئے انہوں نے ایک آپریشن کے ذریعہ ان کی چھ پسلیاں نکال دیں۔ چھاتی کی تکلیف میں کمی آ رہی تھی کہ جراثیم آلود تھوک نکلنے کی وجہ سے دق کا اثر آنٹوں پر ہو گیا۔ مریض کو جب اس سال شروع ہوئے تو ڈاکٹروں نے محسوس کیا کہ اب یہ بچنے کے نہیں۔ اس لئے انہوں نے ان کو مختلف طریقوں سے ہسپتال سے بھاگنے کی صورت بتائی شروع کی۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے کہ اب یہ لوگ علاج سے عاجز ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا کوئی مریض ہسپتال میں مرکز ان کا دیکارڈ خراب کرے۔

ڈاکٹر صاحب نے مایوسی کے اسی عالم میں اپنے پروردگار سے فریاد کی جس نے ان کو خواب میں ایک دوائی 'زیتون کا تیل اور الزاوائیٹ شعاعوں کی بشارت دی۔ دوائی تو یہ بھول گئے (غالباً قسط ہو گئی) اور زیتون کا تیل بازار سے منگوا کر ہر صبح سگڑے کے عرق میں ملا کر اس کے دو اونس چنا شروع کر دیا۔ ہسپتال والے الزاوائیٹ کے حق میں نہ تھے۔ مگر ان کے اصرار پر وہ ان کو کتنی شروع ہو گئیں۔ دو ہفتے میں اس سال بند ہو گئے اور مریض کا وزن بڑھنے لگا۔ چنانچہ یہ ڈاکٹر صاحب اسی ہسپتال سے مکمل شفا یاب ہو کر باہر نکلے جس کے ڈاکٹر ان کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔

ڈاکٹر سعید احمد خان نے جب یہ واقعہ دیکھا تو وہ زیتون کے تیل کے اعجاز کے قائل ہو گئے۔ انہوں نے یہ واقعہ ہمیں سنایا اور فرمایا کہ اس مشاہدہ کے بعد میں نے چالیس سال تپ دق کا علاج کیا۔ مگر روغن زیتون کے بغیر بھی کوئی نسخہ نہیں لکھا اور اللہ کے فضل سے میرے مریضوں کی شفا یابی کی شرح دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر سے بہتر رہی۔

ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مگر امی اور ڈاکٹر سعید احمد صاحب

کی اطلاع کے بعد یہ نسخہ ترتیب دیا۔

قطہ البحری 100 گرام

شہد 50 گرام

روغن زیتون 50 گرام

قطہ کو پیس کر اس میں اچھی طرح شہد ملا یا گیا جب یہ عجون سی بن گئی تو اس میں زیتون کا تیل شامل کر کے بھر ملا یا گیا۔ یہ عجون دق کے مریضوں کو دی گئی۔ ایک بڑا چمچ صبح، شام دینے سے ایسے شاندار نتائج برآمد ہوئے کہ لوگ حیران رہ گئے۔ ہمارے دوست ڈاکٹر سید آغا طاہر زیدی صاحب بھی چپ دق کے شفاخانوں میں 40 سال کام کر چکے ہیں۔ ان کو یقین نہ تھا کہ ایسا اتنی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ دو ایک مرتبہ ملنے آئے تو ان کو وہ مریض دیکھنے کا موقع ملا جن کا علاج قطہ سے کیا گیا۔ دیکھ کر حیران ہوئے۔

چونکہ وسیع پیمانے پر اچھے شہد کا ملنا مشکل تھا اور کچھ لوگ ایسی چیزوں میں اپنی مختلف رائے رکھتے ہیں۔ اس لئے مریضوں کے لئے یہ نیا نسخہ ترتیب دیا گیا۔

1۔۔۔۔۔ نمار منہ اور عصر کے وقت 2 چمچے شہد، اٹلے پانی میں

2۔۔۔۔۔ قطہ البحری — 100 گرام

3۔۔۔۔۔ میتھی کے پتے یا بیج پیس کر۔۔۔۔۔ 20 گرام۔ اس مرکب کا پھوٹا چمچ صبح شام کھانے کے بعد۔

4۔۔۔۔۔ رات سوتے وقت 2 بڑے چمچے زیتون کا تیل۔ (اٹلی یونان یا ترکی کا بنا ہوا)

اس نسخہ میں پہلی اہم چیز گرم پانی میں شہد ہے۔ یہ گلے کی خراش کو دور کرتا ہے۔ بلغم نکالنا، سانس کی نالیوں کی سوزش کو تسکین دیتا اور آنتوں کی جلن کو رفع کرتا ہے۔ آنتوں کی دق کی اہم علامت اسہال ہوتا ہے۔ جس کے لئے شہد اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ شہد کا ایک منفرد اثر کمزوری کو دور کرنا ہے۔ دق کے مریض بلاشبہ کمزور ہوتے ہیں ان کی کمزوری کو دور کرنے اور جسم کی قوت مدافعت کو بڑھانے میں شہد سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں۔

تو بہت مقدس میں ایک بادشاہ کا قصہ لکھا ہے جس نے اپنی شکست  
خوردہ فوج کو جنگل میں لے جا کر جنگل شدہ اور مڑے کھلائے جس سے  
سپاہی غم مند ہو گئے اور انہوں نے دشمن کو شکست دے دی۔

قطا البحری کے ساتھ یتیمی کی شمولیت کا جواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اہم  
ارشادات سے حاصل ہے۔ قاسم بن عبد الرحمن مروی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم  
نے فرمایا۔ یتیمی سے شفا حاصل کیا کرو (ابن القیم)

اسی بات میں ایک حدیث کو محمد ثنین نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔  
میری امت کے لوگ اگر یتیمی کے فوائد کو صحیح جان طور پر جان لیں  
تو وہ سونے کے عوض تول کر لینے میں تردد کریں۔ (محمد احمد ذہبی)

یتیمی کی اتنی اہمیت کو جاننے کے بعد کرئل چوڑا اور نہ کارنی کی تحقیقات سے  
بھی یکی پتہ چلا کہ اب تک پھل کے تیل کے جن فوائد کا تذکرہ کرتے آئے ہیں وہ  
سب کے سب یتیمی میں موجود ہیں۔ بلکہ یتیمی اس سے اس لئے افضل ہے کہ اس  
میں دیگر اجزاء کے علاوہ وٹامن B-C بھی موجود ہیں جو کہ پھل کے تیل میں نہیں  
ہوتے۔

کھجور کو قرآن مجید نے کمزوری کے لئے بہترین قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ  
وسلم نے اسے زہروں کا تریاق بتایا ہے۔ اس لئے دق کے مریضوں کو اگر دواؤں کے  
ساتھ کھجور دی جائے تو اس سے توانائی میں اضافہ کے ساتھ بیماری میں بھی فائدہ ہو  
گا۔ دق کی اکثر علامات جراثیم کی زہروں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ان زہروں کا اثر  
کھجور زائل کر دے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ شادی سے پہلے بہت دلی تھیں۔ جب  
دواؤں سے ان کا وزن نہ بڑھا تو ان کو کھجوریں اور کھیرے کھلائے گئے جس سے ان  
کے وزن میں اضافہ ہو گیا۔

دق کے علاج میں بیماری سے نجات کا ایک چبانہ مریض کا وزن ہوتا ہے۔  
ہسپتالوں میں ہر مریض کا باقاعدگی سے وزن کیا جاتا ہے اور اس کے چارٹ پر درج کیا  
جاتا ہے۔ کھجور اور زیتون بلکہ شدہ کی شمولیت کے ساتھ مریض کی نگاہت کو ختم

کر کے اسے بیماری پر غلبہ پانے کی ٹائل بنایا جاسکتا ہے۔  
 دق کے مریض کی صحت کی بہتری کا پتہ خون کے ESR سے لگتا ہے۔ اگر کسی  
 مریض کا ابتدائی ESR 90 ہو تو وہ ہر ماہ کے علاج کے بعد پھر چیک کیا جائے۔ اس  
 میں بتدریج کی بیماری کے ٹھیک ہونے کی علامت ہے۔ مریضوں میں تندرستی میں یہ  
 10-15 mm ہوتا ہے جب کہ خواتین میں یہ قدرے زیادہ ہوتا ہے۔

اس سال کے ہنگامی علاج کے لئے بی وائے کا لعاب کافی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ  
 شربت بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کی دستیابی جتنی نہیں۔ اس لئے اکثر  
 مریضوں کو جھڑکھٹک سے STREPTOMAGMA یا KAOSTOP وغیرہ قسم  
 کے آنتوں کی جلن کو روکنے والے مرکبات دیئے گئے۔

یہ علاج ہر مریض میں مختلف کامیابیوں کا باعث ہوا۔ عام طور پر مریض کو مکمل طور پر  
 شفا یاب ہونے میں 3-5 ماہ لگے۔ اس کے اوسط خرچ 5 روپے یومیہ رہا جب کہ جدید  
 علاج کے روزانہ مصارف 60 روپے روزانہ کے علاوہ 9-18 ماہ کے عرصہ تک محیط  
 ہیں۔



## غذا کے انجذاب کے مسائل

### MALABSORPTION SYNDROME

انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد غذا مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ اور ہر مرحلہ پر وہ اپنی کیمیائی ساخت تبدیل کرتی ہے جسے عمل انضمام کہا جاتا ہے۔ منہ میں داخل ہونے کے بعد غذا چبائی جاتی ہے۔ چبانے کے عمل کے دوران اس میں تھوک کا جوہر PTYALIN شامل ہو جاتا ہے۔ جب غذا میں موہودہ نشاستہ کو گلوکوس میں تبدیل کر دیتا ہے۔

منہ میں نشاستہ کے ہضم کے علاوہ آگے جانے والی غذا کو چبا کر باریک کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ لیس دار لعاب شامل ہونے سے اس کو حلق کے نیچے جانے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ معدہ میں ہضم کا عمل تیزابی ماحول میں انجام پاتا ہے۔ اور کوئی بھی چیز یہاں کھل طور پر ہضم نہیں ہوتی وہاں سے چھوٹی آنت میں داخل ہونے والی غذا میں تیزابیت ہوتی ہے جس کو پہلے حصے میں سوڈا بائی کارب مل کر ضرورت کے مطابق کیا جاتا ہے۔ یہاں پر آنتوں میں پیدا ہونے والے خامرے، لٹلے اور پتے سے آنے والے صفرا ہضم کی تکمیل انجام دیتے ہیں۔

پکٹائیوں کے ہضم اور انجذاب کے لئے صفرا کے تسکیات ضروری ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں جیسے کہ یرقان میں ہوتا ہے تو پکٹائی ہضم نہیں ہوتی۔ حیاتیات D-K ہضم نہیں ہوتے اور طرح مریض کے لئے اضافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہضم کے عمل کو سامنے رکھیں تو غذا کے انجذاب کے مسئلہ کو سمجھنا آسان ہے۔

جاتا ہے۔ مثلاً منہ سے لے کر چھوٹی آنت کے آخری حصہ تک مھلیوں کی خرابیاں اور اس کے بعد مقامی حساسیت اور بعض سوزشی بیماریاں، طب جدید کے مطابق اسباب کی ایک لمبی فہرست ہے جن میں سے بعض کی حیثیت فنی نوعیت کی ہے۔ جب کوئی شخص ٹھیک ٹھاک غذا کھا رہا ہو اور اس کا وزن اس کے باوجود کم ہو رہا ہو تو ایسے میں ذیابیطس سے لے کر پیٹ میں کیڑوں کی سست خیال کیا جاتا ہے اس سلسلے کی سب سے مشہور بیماری درج ذیل ہے۔

### چکنائی کے اسہال (COELIAC DISEASE)

یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں چھوٹی آنت میں غذا کے بعض اجزا سے تعلق میں آنے کی بعد یہ اپنی کارگزاری یا عملی شکل تبدیل کر لیتی ہے۔ یہ غذائی حساسیت کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماری ہے جس میں اجناس میں پائی جانے والے لیمیات کا جزو (GLUTEN) آنتوں میں (ALLRGY) حساسیت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ بعض لوگ پھلی کھائیں تو ان کے جسم پر ورم آ جاتا ہے۔ کھلی شروع ہو جاتی ہے۔ یا پتی اچھلنے لگتی ہے۔ یہ بیماری چھوٹی آنت میں حساسیت تک محدود رہتی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مہاں سے خوراک جذب ہونے میں نہیں آتی۔

جسم میں حساسیت عام طور پر ایسی غذاؤں یا اشیاء سے پیدا ہوتی ہے جو روزمرہ استعمال میں نہیں آتیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے جیسے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہنسلین کا ٹیکہ لگوا یا تو اسے حساسیت کا رد عمل پیدا ہو گیا یا سمندری مچھلی کھانے سے جسم پر پتی اچھلنے لگی۔

ایک صاحب کے ہاتھوں کی جلد انجی مضبوط ہے کہ اگر تھوڑا بہت تیزاب لگ جائے تو ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے جب بڑے شوق سے ایک دلائتی صابن سے ہاتھ منہ دھوئے تو ہاتھوں اور چہرے کی کھال از گئی۔ حالانکہ وہ ایک مقبول صابن ہے۔ لیکن ان کی جلد اس کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئی۔

ماہرین غذا نے عدم انجذاب کی اس صورت کو آنکھوں میں ذرعی اجناس سے حساسیت کا باعث قرار دیا ہے۔ اجناس میں سے جینی، گندم، مکئی میں موجود لحمیات (GLUTEN) کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ امریکی ماہرین نے اس میں جو بھی شامل کئے ہیں۔ جب کہ برطانوی ماہرین ذرعی اجناس کے علاوہ گائے کے دودھ سے بھی بچوں میں حساسیت کا شبہ کرتے ہیں۔ البتہ ان کی رائے میں یہ حساسیت مستقل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ بڑوں میں ہوتی ہے تو پھر عمر بھر کے لئے رفیق بنتی ہے۔

### علامات

پیلے رنگ کے پتلے پاخانے جو مقدار میں کافی اور زیادہ بدبودار ہوتے ہیں۔ منہ میں پھالے ٹپکتے ہیں یا پک جاتے ہیں۔ انگلیاں موٹی ہو جاتی ہیں۔ وزن کم ہونے کے ساتھ کمزوری، حشک، بلڈ پریشر میں کمی، جلد خشک رہنے لگتی ہے۔ اور اس پر جا بجا دیکھ نظر آتے ہیں۔

اکثر مریضوں میں علامات مختلف ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوعیت کے لحاظ سے یہ جھوٹی آنت میں عدم انجذاب کا قصہ ہے۔ جب کسی کی غذا پیٹ میں جانے کے باوجود خون میں داخل نہ ہو تو غذائی کمی کی علامات سارے جسم میں پھیل جاتی ہیں۔ مریض کھانے کے باوجود فاقہ کشی کی حالت میں ہوتا ہے۔ جس طرف سے بھی دیکھیں اسی طرف ہی علامات کا ایک طویل سلسلہ موجود ہو گا۔ جب وٹامن ب اور فولاد جذب نہ ہوں گے تو خون کی کمی ہو جائے گی۔ لحمیات کی کمی سے جسمانی کمزوری کے علاوہ جسم کا پورا (HARMONAL SYSTEM) متاثر ہو جائے گا۔ کیونکہ ہارمون لحمیات کے ہضم سے حاصل ہونے والے ایمنو نیائی ترشوں سے بنتے ہیں۔

چھوٹے بچوں میں غذائی کمی کی وجہ سے نشوونما متاثر ہو جاتی ہے۔ قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ دماغ کا بڑھتا رک جاتا ہے جس سے بچے ست، کند ذہن اور بے تعلیم ہو جاتے ہیں۔

## تشخیص

بہترین طریقہ علاج یہ ہے کہ پیٹ میں (ENDOSCOPE) ڈال کر چھوٹی آنت سے کم از کم دو جگہ سے کلکے کلک کر باہر نکال کر ان کا معائنہ کیا جائے۔ لیکن یہ کام ایک کمزور مریض کے ساتھ ظلم کے برابر ہے۔ ایک عام آدمی اس کے اخراجات کا تحمل بھی نہیں ہو سکتا۔

پاخانہ کے ٹیسٹ سے خاصی مدد مل سکتی ہے۔ اس کا وزن زیادہ ہو گا۔ ایک عام آدمی کے پاخانہ میں 7 گرام سے زیادہ چربی نہیں ہوتی جب کہ ایسے مریضوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔

خون کی مسلسل کمی، اسال کی موجودگی، خون میں ایسین اور پوٹاشیم کی کمی سے اس کا پتہ چلایا جاسکتا ہے۔

ہشک ذریعہ سے حیاتین B کے اخراج کا پتہ چلانا آسان ہے۔ ایک عام آدمی کو اگر اس کا ٹیکہ لگایا جائے تو 70 فیصدی مقدار 24 گھنٹوں میں پیشاب کے راستہ خارج ہو جاتی ہے۔ جب کہ ایسے مریضوں میں وٹامن کا بیشتر حصہ جسم کے اندر صرف ہو جاتا ہے۔

(BARIUM) دینے کے بعد آنتوں کا ایکسے کرنے پر ہموار دیواروں اور دوسرے مشاہدات سے اس بیماری کا پتہ چل سکتا ہے۔

## علاج

اجناس سے عمر بھر پرہیز کرنا ہو گا۔ ذہ کی چیزیں منع ہیں۔  
غذا میں 'لمبات' خشک 'دودھ' گوشت دینے جائیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہضم کرنے والی گولیاں مفید ہیں۔ خون کی کمی کے لئے فولاد، حیاتین B اور فولک ایسڈ بذریعہ 'فولیکس' (FOLIC ACID B) آنتوں میں جراثیم کی موجودگی کو ختم کرنے کے لئے (TETRACYCLIN) کے کیپسول کافی ہیں۔

اگر یہ طریقے کارآمد نہ ہوں تو کورٹی سون کے مرکبات زیادہ عرصہ تک دیے

جائیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ان کو ابتداء ہی میں شروع کر دیا جائے۔ مریض جب بہتر ہونے لگے تو ان کو بند کر کے دوسرے علاج جاری رکھے جائیں لیکن عمر بھر کے لئے۔

## طب نبوی

اس بیماری کا علاج اسمال کے اصول پر کیا جائے۔ شہد پلانے سے اگر فائدہ نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ بھی دانہ کا لعاب شامل کر دیں۔ لعاب اور شہد آنتوں میں جلن اور اسمال فوراً ختم کر دیں گے۔

مریض کو خالی پیٹ زیتون کا تیل دیا جائے۔ عموماً رات کو سوتے وقت یا دن کے 11 بجے ایک بڑا چمچ کافی رہتا ہے۔

خون کی کمی اور کمزوری کے لئے شہد کے ساتھ نماء منہ سمجھواریں دی جائیں۔ اگر اسمال اور کمزوری نہ ہوں اور مسئلہ کھانا ہضم ہونے میں مشکلات کا ہو جائے تو پھر کھانے کے بعد 3 والے خشک انجیر مفید رہتے ہیں۔

ابتداء میں چکنائی اور زردی اجناس سے پرہیز کیا جائے۔ پھر آہستہ آہستہ جو کا دلیا۔ جو کا آملا کر روٹی شروع کر کے مریض کی اجناس سے حساسیت کو بتدریج ختم کر دیں۔ یاد رہے کہ شہد اور زیتون کا تیل ہذا خود حساسیت کا علاج ہیں۔

جن مریضوں کی آنتوں میں سوزش ہو ان کو قسط شیریں اور کلوئی ہم وزن ملا کر اس کا ایک چھوٹا پیچ صبح کھانے کے بعد دیں۔ یہ علاج یقینی اور مفید ہے اور مرض کی نوعیت کے پیش نظر اس میں معمولی تبدیلیاں اکثر ضروری ہو جاتی ہیں۔ عرصہ علاج طویل بھی ہو سکتا ہے۔

## بڑی آنت کے کینسر

### CANCERS OF THE COLON

بچاس سال سے قریب عمر کا وہ مرد جسے باقاعدگی سے اجابت ہوتی ہے اگر اسے قبض ہونا شروع ہو جائے یا حاجت کے اوقات میں تبدیلی ہوتی چلی جائے تو اس پر کینسر کا شبہ کرنا ایک معقول بات ہے۔ یا اس کے جسم میں کینسر کے سلسلہ میں منسل تحقیقات کی جائے۔

بڑی آنت میں کینسر چار قسموں میں ہوتا ہے۔ ایک قسم میں جلیبی کی مانند گول لکیریں بنی ہوتی ہیں جب کہ دوسری قسم میں آنت کے دونوں کناروں سے بڑھتا ہوا گوشت راستے کو آہستہ آہستہ مسدود کرتا ہے۔ پروفیسر گرے ٹرن نے اس قسم کو بہترین قرار دیا ہے۔ کیونکہ پاخانہ کی رکاوٹ کی وجہ سے مریض جلد سے جلد مشورہ حاصل کرتا ہے اور کینسر کا پھیلنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے اور اسے بروقت نکال کر جان بچائی جاسکتی ہے۔ تیسری قسم میں زخم نمودار ہوتا ہے جس کے کنارے اوپر سے اندر کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم گوبھی کے پھول کی مانند کھل کر آہستہ آہستہ رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔

آنتوں کے کینسر عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان میں غددوں سے برآمد ہونے والی رسولیاں کثرت سے ہوتی ہیں۔ لیکن ان میں سے اکثر بعد میں کینسر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

پروفیسر عبدالحمید صدیقی مرحوم کے پاس ڈھاکہ سے ایک ہائپر لاکا جیٹ


کی تکلیف لے کر آیا۔ اسے پاخانہ کے ساتھ کبھی کبھار خون آتا تھا۔ جب اجابت والی تالی میں اوزار ڈال کر محاسبہ کیا گیا پوری آنت میں انگور کے دانوں کی طرح کی چھوٹی چھوٹی رسولیاں ڈنڈیوں سے لٹک رہی تھیں۔ جب اسے اجابت ہوتی یا وہ زور لگاتا تو ایک آدھ ڈنڈی ٹوٹ جاتی۔ وہ بیر نما رسولی باہر نکل جاتی اور ڈنڈی والی جگہ سے تھوڑی دیر خون نکلتا رہتا۔

صدیقی صاحب نے اس کی آدمی آنت نکال کر پاخانہ کا راستہ اس کی بائیں پسلی کے نیچے بنا دیا۔ اسے COLOSTOMY کہتے ہیں۔

اس نوجوان کو بچ جانے کی کوئی خوشی نہیں تھی وہ پاخانہ کا سوراخ غلط جگہ دیکھ کر اور عمر بھر کے لئے اس غلامت کو اٹھائے پھرنے پر بست تالاں تھا۔ اسے غلط فہمی تھی کہ اگر ولایت چلا جائے تو بچ جائے گا۔ چونکہ کوئی انگریز سرجن کسی پاکستانی سرجن سے زیادہ ہنرمند نہیں ہوتا۔ اس لئے مایوس واپس آیا۔

کینسر کے غلے جسم کے لگائی نظام کے راستے جسم کے مختلف مقامات کی سمت پھیل جاتے ہیں اور ان کا ثانوی مرکز اکثر جگر میں جا کر بن جاتا ہے۔ اصولی طور پر جگر میں براہ راست کینسر عام طور پر نہیں ہوتا۔ جگر میں اگر کینسر کی موجودگی کا پتہ چلے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ رسولی پیٹ کے کسی اور عضو میں موجود ہے جس کا ثانوی مرکز جگر میں بن رہا ہے۔

بڑی آنت کی اندرونی تہ میں لگی ہوئی جھلی بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر ایک دم پھیلنے لگتی ہے اور اس سے رسولی بن جاتی ہے۔ رسولیاں کسی بھی مرحلہ پر کینسر میں تبدیل ہو سکتی ہیں یوں تو کینسر کسی بھی حصہ سے شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ پاخانہ والی تالی کے آخری حصہ کے قریب دیکھا گیا ہے۔ ذیلی نقشہ میں آنت کے مختلف حصہ میں پائے جانے والے کینسر کی شرح پیش ہے۔



کینسر جسم کے جس حصہ میں بھی ہو موت کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس لئے علاج کا عمومی اصول یہ ہے کہ اس کو جلد پکڑ لیا جائے۔ متاثرہ حصہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ کھینچ کر نکال دیا جائے۔ اگر یہ عمل بروقت کر لیا جائے تو پھیلاؤ رکھ کر زندگی میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے بڑی آنت کے کینسر اس لحاظ سے بڑے مسکین ہیں کیونکہ اپنی اذیت رسانی کے باوجود آہستہ آہستہ پھیلتے ہیں۔ اور مریض کو جان بچانے کی کافی مہلت دیتے ہیں۔ لیکن اس عمل میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان کی واضح علامات نہیں ہوتیں۔ اس لئے مریض کے لئے پریشان ہو کر ڈاکٹر کے پاس جانے اور ہنگے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

### علامات

بڑی آنتوں میں کینسر کی علامات مختلف ہوتی ہیں۔ لیکن مختلف مریضوں میں علامات کا فیصدی تناسب یہ رہا۔



درمیانی آنت	بائیں آنت	دائیں آنت	
51	68	78	بیٹ درد
70	58	30	اجابت کے اوقات میں گزیر
20	15	50	وزن میں کمی
0	15	32	خف (قرنج کے ساتھ)
0	9	18	بھوک میں کمی
6	9	20	سائس چھٹنا اور فشی کے دورے
29	9	8	پاخانہ کے راستے خون
39	46	67	بیٹ میں گولہ
0	0	8	بد ہضمی
29	21	8	آنتوں میں رکاوٹ

مریض کو جب زیادہ درد ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کینسر پھیل گیا ہے اور آپریشن ممکن نہیں ہے۔ 25 فیصدی مریضوں میں آنتوں میں گوشت پیدا ہو جانے کی وجہ سے رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ وہ شخص جو باقاعدگی سے بیٹ اخلا جاتا تھا اگر اس کے اوقات میں گزیر پیدا ہو جائے تو اسے اکثر اوقات کینسر کی وارننگ قرار دینا چاہئے۔ بیٹ کے نچلے حصہ میں ریلج جمع ہونے سے نغ محسوس ہوتی ہے لیکن ہوا خارج ہونے پر آرام آ جاتا ہے۔ اکثر اوقات علامات نہیں ہوتیں اور بیماری کی تشخیص اتفاق سے ہوتی ہے۔ اور جب ہوتی ہے تو عام طور پر علاج کا وقت گزر گیا ہوتا ہے۔

### تشخیص

بڑی آنت کو نیچے سے اوزار ذلل کر آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ SIMOIDSOCOPY کا یہ طریقہ قابل اعتماد اور مزید تحقیقات کے لئے مفید ہے۔ اس اوزار کے ساتھ ایسا بندوبست موجود ہے جس سے آنت کے متاثرہ حصے کا کوئی ٹکڑا کٹ کر اسے لیبارٹری میں BIOSPY کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ ہمارے ایک کرم قریباً کو پاخانہ کے ساتھ خون آ رہا تھا۔ ان کی عمر 70 سال کے قریب ہے۔ پاخانہ میں

خون کی معقول مقدار پائی گئی۔ پاخانہ ٹیسٹ کروانے پر یہ رپورٹ ملی۔

PLAS CELLS:	Many
RBCS:	Rare
BACTERIA:	Normal flora
OVA:	Nil
	Many fungal spores seen
CYSTS:	Occasional cyst of E.coli
VEGETATIVE FORMS:	Nil
REDUCING SUBSTANCES:	Nil
OCCULT BLOOD:	POSITIVE

اس رپورٹ میں پرانی امیبائی پیچش کا بھی سراغ ملتا ہے۔ لیکن یہاں اس کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ معمولی علاج سے اسے ٹھیک کیا جاسکتا تھا۔ SIGMOIDOSCPY پر مریض کی آنتوں میں زخم اور ابھار دیکھے گئے ہیں۔ اسی اوزار کی مدد سے ایک ٹکڑا کاٹ کر باہر نکالا گیا۔ جسے ایک بڑے ہسپتال کی لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا۔ اور یہ نتیجہ موصول ہوا۔

### Microscopic Description

Section from the polyp shows closely packed coline glands lined by mucous secreting epithelium, showing multilayering & mitotic activity. Some area with in these polypi show back to back arrangement of glands with severe dysplasia of the lining epithelium, loss of mucin, although there is no definite evidence of frank invasion of the stroma, there are areas

suggesting an early break of the basement membrane. The appearance are of adenomatous polypi with severe dysplasia amounting to at least carcinoma in situ with a focus of questionable invasion.

یہ ایک افسوسناک رپورٹ ہے جس میں ماہر علم الامراض نے مریض کے جسم سے نکلے ہوئے ٹکڑے کا معائنہ کر کے گول مول رائے دی ہے۔

اسی طرح کے ایک اور مریض کا آپریشن ہوا۔ آنت کا ٹکڑا کٹ کر معائنہ کے لئے پروفیسر غلام رسول قریشی کو بھیجا گیا۔ انہوں نے جو رپورٹ دی وہ یہ ہے۔

Revised a segment of the descending colon.

The specimen shows a polypoid mass, obstructing the lumen. The surface of the polyp is ulcerating.

### HISTOLOGY

The study showed malignant epithelial cells. These neoplastic cells form glands and papillary processes of variable sizes and shapes, there is invasion of the stalk by the malignant cell.

This is a PAPILLARY ADENO CARCINOMA

یہ ایک واضح اور مکمل رپورٹ ہے۔ جس کو پڑھنے کے بعد معالج کے ذہن میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔

ایکسرے

آنتوں کو ایکسرے میں دیکھا نہیں جاسکتا۔ مریضوں کو BARIUM کا مرکب کھلا کر مختلف دفعوں سے ایکسرے کرنے پر معدہ اور دو سری آنتیں دیکھی جاسکتی ہیں۔

بڑی آنت کے کینسر کے 75 مریضوں میں سے 6 مریض ایسے تھے جن کو کینسر موجود تھا لیکن وہ ایکسے سے نظر نہ آیا۔ ابتدائی حالت میں کچھ بھی واضح نہیں ہوتا۔ اس لئے ابتدائی حالت میں اگر ایکسے صاف ہو اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کینسر کا امکان خارج ہو گیا۔

آج کل کے برطانوی ماہرین کینسر کے مریضوں کا ایکسے کرنا پسند نہیں کرتے۔ کیونکہ آنتوں میں اگر کسی جگہ کینسر کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو تو ہیریم کی زیادہ مقدار وہاں پر کھل رکاوٹ کر دے گی اور مریض کی جان بچانا فوری مسئلہ بن جائے گا۔

مریض کو ہیریم کا نیچے سے اٹھا دینے کے بعد ایکسے کرنا ایک آسان اور قابل اعتماد طریقہ ہے۔ لیکن اس میں صرف کولون کے بائیں اور آخری حصوں کا مطالعہ ہو سکتا ہے۔ اپنڈکس سے متصل اور درمیانی کولون کو اس طرح دیکھا جانا ممکن نہیں۔

### جدید ترکیب

لوگوں نے آنتوں کو اندر سے غسل دے کر وہاں سے برآمد ہونے والے پانی سے مچھان کر اس سے کینسر کے خطنے تلاش کرنے کی ترکیب نکالی ہے۔ جو اگرچہ مفید ہے لیکن کسی اچھے ہسپتال میں ماہرین کے ہاتھوں انجام پا سکتی ہے۔

### انتباہ

ایک عام مریض کو جو عام طور پر نارمل ہے۔ اگر بار بار قبض ہو، پاخانہ میں خون آئے اور اس کے ٹیسٹ رپورٹ میں OCULT BLOOD لکھا ہو تو اسے کسی ماہر سرجن سے رجوع کرنا چاہئے۔ اور اس سلسلہ میں دیر کرنا خطرناک ہوتا ہے۔

### علاج

بڑی آنت کے کینسر کا صرف ایک ہی علاج ہے وہ ہے آپریشن۔ اور یہ آپریشن بھی چند ایک مریضوں میں ممکن ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ پھیل گیا ہو تو آپریشن کے

ذریعہ اسے نکل طور پر نکالنا ممکن نہیں رہتا۔

پہلی صورت تو یہ ہے کہ جلد از جلد آپریشن کر کے رسولیاں نکال دی جائیں۔  
 آنت کا متاثرہ حصہ نکال کر تندرست حصوں کو آپس میں جوڑ کر ایک لمبی زندگی کی  
 توقع ہو جاتی ہے اور اگر متاثرہ حصہ آخر میں ہو یا کینسر پھیل چکا ہو تو اس کا تکلیف دہ  
 حل یہ ہوتا ہے کہ مریض کی پاخانہ والی ٹالی نکال کر پاخانہ کرسنے کی جگہ پیٹ میں بنا  
 دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس اذیت سے محفوظ رکھے کہ پاخانہ پیٹ کے کسی حصہ سے نکل  
 رہا ہو اور اس کی غلاظت اور بدبو کو روکنے کے لئے پیٹ پر پالہ بندھا ہو۔ جن لوگوں  
 نے ایسے مریض دیکھے ہیں وہی جانتے ہیں کہ ان کی حالت کتنی قابلِ رحم ہوتی ہے۔

ہمارے ایک ڈاکٹر دوست کے والد کا آنتوں کے کینسر کے لئے آپریشن ہوا۔ چار  
 سال آرام سے نکل گئے۔ پھر سے تکلیف شروع ہوئی۔ انہوں نے ایک بڑے ہسپتال  
 میں داخل کروایا گیا۔ جہاں دوبارہ آپریشن ہوا۔ سرجن نے پیٹ کھول کر پھر سے بند کر  
 دیا۔ کیونکہ رسولی اتنی پھیل چکی تھی کہ اب اسے نکالنا ممکن نہ رہا تھا۔

مشکل یہ رہی کہ اب مریض کو کیسے بتایا جائے کہ اسے آپریشن کے پورے  
 مراحل اور اخراجات سے گزرنے کے باوجود اس کا پیٹ کچھ کئے بغیر بند کر دیا گیا۔ اور  
 یہ مسئلہ اس لئے بھی زیادہ مشکل ہو گیا کہ مریض خود بھی ڈاکٹر تھا اور اس کو جھوٹی  
 تسلی دینی ممکن نہ تھی۔

کسی زندہ انسان کو موت کی خبر سنانا آسان کام نہیں۔ اس معاملہ میں حوصلہ مند  
 صرف دو ہی اصحاب دیکھے ہیں۔ مرحوم ڈاکٹر بیوچ صاحب کے دماغ کا کینسر پھیل کر جسم  
 کو متاثر کر چکا تھا۔ وہ ہسپتال میں بالکل ایسے پڑے تھے جیسے کوئی عام مریض۔

ماہرین روزانہ دیکھتے آتے ہیں اور یہ ان سے اپنی شکایت بالکل ایسے بیان کرتے  
 تھے جیسے کہ ناواقف مریض اپنے معالج سے توقع رکھتا ہے کہ وہ تکلیف سن کر مداوا  
 کریں گے۔ معالج بھی اسی انداز میں آتے رہے اور نہ انہوں نے اور نہ کبھی مریض  
 نے یہ کہا کہ اب علاج کس بات کا کریں؟ لیکن نسخے تبدیل ہوتے رہے اور مریض  
 آخری دن تک صبر اور حوصلہ کا مظاہرہ کرتا رہا۔

دوسرے مریض ماشاء اللہ ابھی زندہ ہیں اور اپنی بیماری کی تشخیص اور علاج ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے کسی اور کی کہانی ہو۔ وہ اس بیان کے دوران ہنستے بھی ہیں اور ڈاکٹروں کی غلطیاں بھی بتاتے ہیں۔

## طب نبوی

معده اور آنتوں کے کینسر میں زیتون کے تیل کو شفا کی اہمیت حاصل ہے۔ عرصہ ہوا اخبارات نے خبر دی تھی کہ جاپان میں آنتوں کے کینسر کے علاج میں روغن زیتون کے ساتھ انجیر کو بھی پسند کیا جا رہا ہے۔

ناقابل علاج بیماریوں کے علاج میں شد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید نے اسے بلا تخصیص ہر بیماری میں شفا کا مظہر قرار دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ بیماری خواہ کوئی ہو اسے پورے اطمینان کے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ احادیث میں بھی کے خواص کا جو تذکرہ ملتا ہے اس کی روشنی میں محدثین نے جن فوائد کا تذکرہ کیا ہے ان میں آنتوں کے زخم آنتوں میں بوجھ اور رکاوٹ شامل ہیں۔ یہ ہیمہڈوں کے علاوہ آنتوں کی صحت کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لئے ابن القیم کے نسخہ کے مطابق اس کا مریہ ایک اچھا مرقع ہے جس میں بھی کے تیل پانی میں گلاتے کے بعد شد ملا کر مریہ کے انداز سے پکا کر رکھ لئے جاتے ہیں۔ مریض ان کو ہمار منہ کھاتا ہے۔

زیتون کا تیل 11 بجے دن اور رات سوتے وقت دینا مفید رہتا ہے۔ اکثر مریضوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب آنتوں میں رکاوٹ آگئی تو زیتون کا تیل بار بار چلانے سے چند دنوں میں اجابت کے لئے راستہ بن جاتا ہے۔

ہم نے انجیر کو زیادہ طور پر نہیں آزمایا۔ البتہ قسط شیریں کو مختلف قسم کی رسولیوں میں مدتوں سے دیا جا رہا ہے اور نتائج حوصلہ افزا ہیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھونجی کو ہر مرض میں شفا کا مظہر قرار دیا ہے۔ اس لئے عام مریضوں کے علاج میں یہ نسخہ استعمال کیا گیا۔

\_\_\_ 2 بڑے جچے شدہ ایلے پانی میں۔ نہار منہ اور عصر کے وقت

\_\_\_ سوتے وقت 1-2 بڑے جچے زیتون کا تیل۔

\_\_\_ اگر رکاوٹ نہ ہو تو ناشتہ میں جو کا دلیا۔ شکر کی جگہ شدہ ڈال کر۔

\_\_\_ اگر بھی کامیہ میسر ہو تو نہار منہ شدہ کی جگہ بھی کامیہ تقریباً 100 گرام۔

(شدہ کے شیرے سمیت)

بیتھرے نصف گرام

کلونجی ایک گرام

قط شیریں چار گرام

اس مرکب کا ایک چھوٹا چچہ صبح، شام کھانے کے بعد، یہ علاج کافی مدت جاری

رہے۔

## جگر اور اس کی بیماریاں

### DISEASES OF THE LIVER

انسانی جسم میں جگر (کلیج) ایک فیکٹری کی مانند ہے۔ جس میں کئی قسم کے کیمیائی عمل انجام پاتے ہیں۔ جسم کے اندر جب بھی کوئی دوائی یا زہر داخل ہوتی ہے تو وہ سیدھی جگر کو جاتی ہے۔ اگر وہ اس سے واقف ہے اور اسے جسمانی ساخت کے حصہ کے طور پر جانتا ہے تو اسے مناسب جگہ پر ذخیرہ کر لیتا ہے اور اگر وہ اسے نہیں جانتا تو وہ اسے تلف کر کے جسم سے باہر نکال دیتا ہے۔ وہ گلوکوس کو مقررہ مقدار سے بڑھنے نہیں دیتا۔ ہنگامی ضرورتوں کے لئے توانائی دینے والے عناصر کا ذخیرہ کرتا ہے۔ بیماریوں کے خلاف کام کرنے والا پورا دفاعی نظام اسی کی پیداوار ہے۔ وہ خون میں لمبیات کو شامل کرتا اور ان کے درمیان ایک مناسب توازن قائم رکھتا ہے۔

جھاتی کے دائیں جانب آخری پسلیوں کے پیچھے جگر واقع ہے۔ اس کا عمومی وزن ساڑھے تین پونڈ ہوتا ہے۔ عورتوں کا جگر قدرے چھوٹا ہوتا ہے اوپر کی طرف دائیں سے ملحق ہے۔ لیکن دونوں کو علیحدہ کرنے کے لئے مضبوط دیواریں ہیں۔ جگر کا معائنہ مریض کو لٹا کر دائیں طرف کی آخری پسلی کے نیچے ہاتھ رکھ کر صرف اس صورت میں کیا جاسکتا ہے جب جگر کسی وجہ سے پھیل گیا ہو۔ تندرست اشخاص کا جگر پسلیوں سے نیچے نہیں آتا۔


ہمارے ملک میں طب اور علاج سے وابستہ افراد میں سے اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کو انسانی جسم کے آلات اور ان کے افعال سے واقفیت نہیں ہوتی اس



لئے وہ اپنے مریضوں کو جگر یا مثانہ میں کرمی کے علاوہ اور کوئی بیماری جانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ جگر آسانی سے خراب نہیں ہوتا۔ اسے بیمار کرنے کے لئے ہتھوں محنت کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ زہریلی ادویہ یا منشیات کا استعمال مریض کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے اور ان کو طویل عرصہ دوائیں استعمال کرنے کے بعد جگر کو خراب کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خون جگر میں پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے جب کوئی معالج مریض کو یہ کہتا ہے کہ اس کا جگر خون صالح پیدا نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معالج کو جگر کے افعال سے بھی واقفیت حاصل نہیں۔

### جگر کی فعالیت کی تفتیش

جگر کو آسانی سے دیکھا جانا ممکن نہیں۔ اس لئے جب اس پر بیماری کا شبہ پڑ جائے تو اس کا پتہ چلانا آسان کام نہیں۔ حال ہی میں کمپیوٹر کے ذریعہ جگر کے جملہ افعال کی پڑتال کی ایک صورت نکلی ہے۔ جو نہایت عمدہ اور قابل اعتماد ہے۔ اس کتاب کے لئے عزیزی ظفر اقبال نے خصوصی کمپیوٹر پر اپنے جگر کی کارکردگی کا جائزہ ہمارے لئے نمونہ کے طور پر تیار کیا ہے جو درج ذیل ہے۔ یہ ایک تندرست شخص کے جگر کی صلاحیت کا خاکہ ہے۔



# HASHIM CLINICAL LABORATORY

ILAH BAKHSI CLINIC 35-LAWRENCE ROAD, LAHORE.

PATIENT'S NAME: ZAFAR

AGE: 50 YEARS SEX: MALE

REF: BY DOCTOR: KHALID GHAZNAVI

DATE: 08/09/91 NO.: 6995

## LIVER FUNCTION TEST

TEST	VALUE	UNITS	NORMAL RANGE	REMARKS
BILIRUBIN TOTAL	0.9	MG/DL	0 - 1	NORMAL
CONJUGATED:	0.2	MG/DL		
UNCONJUGATED:	0.7	MG/DL		
S. G O T 23:	23	U/L	9 - 35	NORMAL
S. G P T 29:	29	U/L	3 - 30	NORMAL
ALK. PHOSPHATASE:	214	U/L	29 - 279	NORMAL
GAMMA-GT:	32	U/L	11-50	NORMAL
PROTEIN TOTAL:	7.3	G/DL	6.20-8.20	NORMAL
Albumin	4.2	G/DL	3.60-5.20	NORMAL
Globulin:	3.1	G/DL	2.40-3.70	NORMAL
A/G RATIO:	1.3			
HBs ANTIGEN:	Negative			

ZAFAR IQBAL

LAB. INCHARGE

یہ ایک تندرست شخص کے جگر کی فعالیت کا جائزہ ہے۔ کمپیوٹر نے ہر مشاہدہ کو مزید وضاحت دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ٹیسٹ کتنا نارمل ہے اور اگر وہ نارمل سے علاوہ ہے تو اس کی درجہ بندی بھی کر دی جاتی ہے۔ موازنہ کے لئے ایک خاتون کے جگر کے مشاہدات کی رپورٹ درج ذیل ہے۔ یہ خاتون جگر کی تکلیف میں مبتلا ہیں۔

# HASHIM CLINICAL LABORATORY

ILAH BAKHSI CLINIC 35-LAWRENCE ROAD, LAHORE.

PATIENT'S NAME: SAJIDA BEGUM  
REF: BY DOCTOR: KHALID GHAZNAVI

AGE: 47 YEARS SEX: FEMALE  
DATE: 08/07/91 NO: 5689

## LIVER FUNCTION TEST

TEST	VALUE	UNITS	NORMAL RANGE	REMARKS
BILIRUBIN TOTAL	3.3*	MG/DL	0 - 1	HIGH
CONJUGATED:	2.1	MG/DL		
UNCONJUGATED:	1.2	MG/DL		
S. G. O. T:	364	U/L	9 - 35	HIGH
S. G. P. T:	576	U/L	3 - 30	HIGH
ALK. PHOSPHATASE:	986	U/L	29 - 279	HIGH
GAMMA-GT:	321	U/L	7-32	HIGH
PROTEIN TOTAL:	6.8	G/DL	6.20-8.20	NORMAL
ALBUMIN:	3.1	G/DL	3.60-5.20	LOW
GLOBULIN:	2.7	G/DL	2.40-3.70	NORMAL
A/G RATIO:	1.1			
P. T. T.: —	21			
PATENT: 14		SEC.		
CONTROL:	POSITIVE SEC			
HBS ANTIGEN:				

ZAFAR IQBAL

LAB. INCHARGE

اس رپورٹ میں خون میں پائے جانے والے کمیات نارمل مقدار میں ہیں۔ لیکن ایس جی او ٹ اور گلوبولین کے درمیان تناسب درست نہیں ہے۔ خون میں صفراوی رنگ بہت زیادہ ہیں اس لئے ان کو برقان ہونا لازمی ہے۔ جگر سے پیدا ہونے والے بارسون مقدار میں زیادہ ہیں۔ ان کو دل کا دورہ پڑنے کا احتمال بھی موجود ہے۔

## جگر کی سوزش

جگر بڑی محفوظ جگہ پر رکھا گیا ہے اور اس میں سوزشوں سے محفوظ رہنے کی اپنی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود کچھ حالات ایسے ہیں جن میں یہاں تک سوزش آ جاتی ہے۔ جو کہ وائرس، طفیلی کیڑوں، طیریا، احمیا، کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا ایسی سمیات کے مسلسل استعمال سے ہو سکتی ہے جن کا جگر پر مضر اثر ہوتا ہے۔ جیسے کہ شراب، زہریں، زہریلی دوائیں مثلاً پارا، ٹکرف، ہرنال، میٹھا جیلیا کے خراب مرکبات یا کسے، چپٹ کے کیڑے مارنے والی دوائیں اور پیرا سیٹا سول جگر کو خراب کر سکتے ہیں۔ نمونیہ، زہر باد اور طیریا کی وجہ سے جگر میں پھوڑا بن سکتا ہے۔ ان سوزشوں میں اہم یہ ہیں۔

**VIRAL HEPATITIS** اس وائرس کی متعدد قسمیں A-B-C کے نام سے موسوم ہیں۔ جو گندے پانی کو پینے، یا مکھیوں کی وجہ سے چھوئے بچوں کو عام طور پر A قسم ہوتا ہے۔ جب کہ B قسم گندے اوزاروں، گندے سرنج، سے ٹکے لگوانے یا کسی مریض کا خون لینے سے لاحق ہونے والی دھوبتیاں اگر تندرست فرد کے جسم میں داخل ہو جائیں تو بیماری ہو سکتی ہے جب کہ ایسے کسی فرد کا منہ چومنا یا جنسی تعلقات بھی جگر کی اس خرابی کا باعث ہو سکتے ہیں۔

بچوں کو چھ بیماریوں سے محفوظ کرنے والے پروگرام کے ابتدائی دنوں میں انجیکشن لگانے والی سرنج دیکھی میں پکائی جاتی تھی۔ عملہ کے بے پرواہ افراد تن آسانی کے لئے کئی بار سرنجوں کو پوری طرح پکائے بغیر استعمال کرتے رہتے تھے۔ جس سے بعض علاقوں میں یرقان کی دبا پھیل گئی جو کہ جگر کی سوزش تھی۔ سوزش بیمار بچے کی آلودہ سرنج سے تندرست بچوں تک گئی۔ اسی باب میں ایک مشکل یہ رہی ہے کہ ٹھیک طرح پکانے کے باوجود اس بیماری کا وائرس ہلاک نہیں ہوتا۔

وائرس کو ہلاک کرنے کی صرف ایک صورت ہے کہ آلودہ آلات کو پریشر گر میں 25 پونڈ پریشر پر آدھ گھنٹہ پکایا جائے یا خاص قسم کے آلات استعمال کئے جائیں جو کہ ابتدائی دور میں ممکن نہ تھا۔

الحمد للہ کہ اس پروگرام سے اب کوئی اندیشہ باقی نہیں رہا۔ لیکن چھوٹی آبادیوں میں پریکٹس کرنے والے نیم حکیم اور جعلی ڈاکٹر لوگوں کو اندھا دھند انجیکشن لگاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے کلات کی صفائی پر توجہ نہیں دے سکتے۔ ایک مطلب میں دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی سرنج اور سوئی سے چھ مریضوں کو ٹیکے لگے۔

راج گڑھ لاہور کے ایک ”ڈاکٹر“ کے مطلب کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ اپنے نیکہ لگانے والے کارکن کو ہفتہ کے بعد نئی سوئی دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بار بار اہلنے سے سوئی خراب ہو جاتی ہے۔ ایک روپیہ کی سوئی کی حفاظت میں وہ ایک مریض کی بیماری دوسروں کو کھلے دل سے تقسیم فرماتے ہیں۔

بیمار ماں کے خون سے یہ بیماری پیدا ہونے والے بچوں کو ہو سکتی ہے۔ بیمار ہونے والے مریضوں میں سے 50 فیصدی علامتیں دور ہونے کے باوجود اپنی جسمانی رطوبتوں سے وائرس خارج کر کے دوسروں کے لئے خطرات کا باعث بنے رہتے ہیں۔ جن کی قوت مدافعت کمزور ہو وہ ہمیشہ خطرہ میں رہتے ہیں۔ اکثر مریضوں کو بعد میں جگر کا کینسر ہو جاتا ہے اور اسی سے وفات پاتے ہیں۔

### علامات

بیماری ظاہر ہونے سے چند دن پہلے۔

کمزوری، بھوک کی کمی، تھکی اور تھکے منہ کا ذائقہ خراب، سگریٹ پینے والوں کو تمباکو پینے سے نفرت کا احساس ہوتا ہے۔ 2-3 دن بخار رہتا ہے جس کے بعد یرقان نمودار ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے جو قریح کی طرح شدید بھی ہو سکتا ہے۔ پیشاب کا رنگ گہرا ہوتا جاتا ہے اور جگر بڑھنے لگتا ہے۔ جوڑوں میں معمولی درد کے ساتھ جسم پر دانے نمودار ہوتے ہیں۔

یرقان ظاہر ہونے کے بعد

چہرے کی زردی میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے جو کہ 6 ہفتے تک رہتا ہے۔ پیشاب کی رنگت گہری، کمزوری کے ساتھ وزن گرنے لگتا ہے۔ پاخانہ کا رنگ ہلکا خاکستری

رہتا ہے جسم پر غارش ہوتی ہے اور کبھی کبھی دانے نکلتے ہیں۔  
تشخیص

پیشاب میں صفرا کے رنگ یعنی BILIRUBIN کی خاص مقدار نظر آتی ہے۔  
خون کے کیمیائی معائنہ پر اس میں CONJUGATED BILIRUBIN اور  
BILIRUBIN کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔  
خون میں دائروں کے خلاف پیدا ہونے والے ANTIGENS کے خلاف ٹیسٹ  
کریں تو تشخیص واضح ہو جاتی ہے۔  
خون میں صفرا کے رنگوں کے کیمیائی تجزیہ کا یہ نتیجہ جگر کی سوزش کا آئینہ دار  
ہوتا ہے۔

TOTAL BILIRUBIN 100cc 4.6 mg

Conjugated 100cc 3.1 mg

Unconjugated 1000cc 1.5 mg

اس کیفیت میں صفرائی رنگوں کا زیادتی پر توجہ پڑا کرتی لیکن اس کے ساتھ  
رنگ کی دونوں قسموں کا تناسب مختلف ہوتا ہے۔ جیسا کہ بالائی مریض کی رپورٹ میں  
ڈاکٹر عبدالرشید قاضی صاحب نے واضح کیا ہے۔ CONJUGATED BILIRUBIN  
کی مقدار میں زیادتی جگر کی اس سوزش کو واضح کرتی ہے۔

SGPT: 410 (Normal 45)

SGOT: 250 (Normal 35)

Alkaline Phosphatase 25 (Normal 3-13)

ایسے مریض کے پیشاب کا عمومی تجزیہ حسب ذیل ہے۔

## URINE EXAMINATION

### Chemical and physical Examination.

Colour AMBER, Turbidity - CLEAR Deposit.....Nil

Specific Gravity 1021 PH 6.0.....

Albumen TRACES Sugar Nil Acetone Nil Blood Traces .....

Bile pigments Bile salts + + Urobilin..... +

### Microscopic Examination of Centrifuged Deposit.

R.B.Cs. 3-4 Pus Cell 4-6 Granular Cast Rare

Urine Acid Crystals Nil Cal: Oxalate Crystal many

Trippl Phosphate Crystal - ve Amorphous Phosphate Nil

Mucous Threads moderate .....

اس رپورٹ کے مطابق میٹاب میں صفرا، خون، پروٹین پائے گئے ہیں مگر دے بھی درست نہیں اور باہر خراب ہے۔

### علاج

1- مریض بستر پر لینا رہے۔ اگر حملہ شدید نہ ہو۔ مطلقاً زیادہ نہ ہو تو معمولی پلے جلنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ البتہ تے اگر مسلسل ہو تو ہپتان میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔

2 غذا میں لحمیات اور نشاستہ کی مقدار زیادہ ہونی چاہئے۔ اندے کی سفیدی، کھیم نکلا دودھ، دہی دیے جاسکتے ہیں۔ پھلوں کے جوس، شربت دیئے جائیں مچھلی اور مرغی کا گوشت مفید ہیں۔

3- غذا میں پختائی ہرگز نہ ہو۔

4- شراب اور اس قسم کی دوسری ادویہ سے مکمل پرہیز کیا جائے۔

5- وٹامن ب کے مرکبات مفید ہیں۔ شدید تے اور سلی کے دوران وٹامن ج ملانے

مگھوکوس کا مخلول درید کے ذریعہ دیا جاسکتا ہے۔

6- FLAGYL اور کوہنی سون کے مرکبات دینے کا رواج عرصہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔

مریض سے تعلق میں آنے والوں کو بیماری سے بچاؤ کے لئے HEPATITIS A&B ویکسین کا ٹیکہ لگایا جائے۔

جگر میں سوزش کی اور بھی قسمیں CHRONIC HEPITITIS وغیرہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ جن کی علامات اور علاج تقریباً اس سے ملتے جلتے ہیں۔

### جگر کا انحطاط HEPATIC CIRRHOSIS

یہ ایک ایسی پیچیدہ بیماری ہے جس میں جگر کے خلیات ختم ہو جاتے ہیں۔ ان میں انحطاط پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے روزمرہ کے افعال ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ انحطاط کے نتیجہ میں جگر کی اپنی صورت خراب ہو جاتی ہے اور اس میں سفید دیشے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چونکہ جگر انسانی جسم کے لئے اہم خدمات بجالاتا ہے۔ اس لئے اس کی کارکردگی میں رکاوٹ سدرستی کو متاثر کرنے کے علاوہ جان کے لئے خطرہ ہوتی ہے۔

اسباب:

جگر کا انحطاط آسانی سے نہیں ہوتا۔ اس کو خراب کرنے والی چیزیں جب طویل عرصہ تک اس کو متاثر کرتی رہیں تو وہ متاثر ہوتا ہے بلکہ یہ کما جاسکتا ہے کہ جگر کو خراب ہونے میں ایک طویل عرصہ لگتا ہے یعنی قدرت مریض کو مسلسل سلت دیتی ہے کہ وہ اذیت رسان اشیاء کو ترک کر دے۔ جب ایک لمبے عرصے تک ان کو جگر پر اثر انداز ہونے کی چھٹی ملی رہے تو پھر جگر خراب ہوتا ہے اور اس کے عام طور پر باعث یہ ہوتے ہیں۔

دائرس کی وجہ سے جگر کی سوزش شراب نوشی خاص طور پر کیمیادی طور پر بنی ہوئی مصنوعی منشیات، پتہ اور جگر کی ٹالیوں میں رکاوٹ، غذا میں ضروری عناصر خاص



طور پر لحمیات کی کمی، خوراک میں پختائیوں کی کمی۔ اس کا سبب بنتے ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ ایک لمبے عرصہ تک مریض ایسی غذا کھتا رہا جو جو اس کی جسمانی ضروریات کے لئے کافی نہ تھی۔ غذا میں لحمیات اور ان کی ایسی قسمیں موجود نہ تھیں جن کی جگہ کو ضرورت ہوتی ہے۔ غذائی کمی کی وجہ سے جگر اور اس کے خلیے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں مریض جب شراب پیتا ہے یا مسموم دوائیں کھاتا ہے تو یہ جگر کے خلیوں کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں۔

تپ دق کی مشہور دوائی INH چھل کی دوائی METHOTREXATE ریشہ اور ہڈی پریش کی دوا METHYL DOPA اور دردوں کی متعدد دوائیں خلیوں کو براہ راست خراب کر سکتی ہیں۔ اس لئے شراب یا یہ ادویہ یا سنگھیا، سیسہ، پارا، ہڑتال، شکر، وغیرہ ایک عرصہ تک استعمال کئے جائیں تو اس بیماری کا ہونا ایک لازمی نتیجہ بن جاتا ہے۔

علامات: یہ بیماری بڑی آہستہ بڑھتی ہے۔ مریض کو مدقوں احساس نہیں ہوتا کہ اس کا اندر کھایا جا رہا ہے۔ علامات بھی نمایاں نہیں ہوتیں اور نہ ہی ان سے کوئی خاص تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسے کہ ابتدا میں بد ہضمی، بھوک کی کمی، جنسی کمزوری، ہر وقت تھکن محسوس ہوتی ہے جسم میں طاقت نہیں رہتی اور کام کرنے کو جی نہیں چاہتا۔

اگلے مرحلے پر یرقان، پیٹ میں پانی اور خون کی تے کے بعد پیروں پر سوجن، اسال اور ہلکا ہلکا بخار اور بیزاری۔

جگر بڑھنے کی بجائے سکڑتا ہے۔ یرقان ہمیشہ نہیں ہوتا جسم کے نچلے حصہ سے بال گرنے لگتے ہیں۔ جنسی رنجانات میں کمی آنے لگتی ہے۔ خون کی کمی۔ گردن، چہرے اور بازوؤں پر خون کی سرخ دھبیں نمایاں نظر آنے لگتی ہیں۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ چہرے، بظلوں اور دوسرے حصوں کے بال گرنے لگتے ہیں۔ سر گھٹا ہو جاتا ہے۔ گوشت ڈھلک جاتا ہے۔ ہر جگہ کمزوری دیکھی جاسکتی ہے۔

تشخیص: خون میں سرخی کا استحسان بتائے گا کہ اس میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ ESR

برہ جاتا ہے۔ خون کے سفید دانے کم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالرشید قاضی صاحب نے خون کے معائنہ کے دوران ایک اہم مشاہدہ یہ کیا ہے کہ اس میں ایروسن کی مقدار کم ہو جاتی ہے جو کہ تندرست خون میں 3.5 فی 100 سی سی ہوتی ہے۔ اس میں عام طور پر 2.6 گرام کے قریب ہوتی ہے۔

اس بیماری کی تشخیص میں الزاساؤنڈ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ایک مریض کی رپورٹ حسب ذیل ہے:

Liver is shrunken. Echogenic with irregular surface. Rounded edge. Portal vein prominent - Oesophogical varices seen. Spleen is Moderately enlarged.

Effusion is Seen in the Pleural cavity and increase in Pericardial fluid.

Moderate amount of free fluid Seen in the abdominal cavity.

اس رپورٹ کے مطابق ہسپتالوں اور دل کی مصلیوں میں بھی پانی پڑ گیا ہے۔ ہیٹ میں پانی پڑا ہوا ہے تلی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تمام علامات جگر کے دوران خون کی رکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔

ایکسے میں صرف تالیوں میں خون کا ٹھہراؤ اور انجماد نظر آتا ہے۔ کوئی سفید معلومات حاصل نہیں ہو سکتیں۔

ایٹم سے تشخیص کے طریقے جگر کی بیماریوں میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ جگر کا سائز اس کے غلیوں کی کارکردگی وغیرہ کے بارے میں قابل قدر معلومات مہیا کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے ادارے لاہور، مکان، راولپنڈی اور کراچی میں موجود ہیں جہاں ٹھیک ہسپتال انرجی میڈیکل سنٹر بڑے ہسپتالوں میں واقع ہیں۔ اور وہ سفید خدمت معمولی معاوضہ پر کر دیتے ہیں۔

ایک اوزار کے ذریعہ جگر کا ایک ٹکڑا پیٹ کھولے بغیر نکال کر ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے۔ اس قسم کے ٹیسٹ متعدد لیبارٹریوں میں کئے جاتے ہیں۔ پروفیسر غلام رسول قریشی صاحب کو ان میں بڑی شہرت حاصل ہے۔ انہوں نے اس قسم کے ایک مریض کے ٹیسٹ پر یہ رپورٹ تیار کی۔

Recieved portion of firm greenish yellow mass.

The cut surface is multi-nodular. The

Consistency of the tissues is firm.

### HISTOLOGY

The section is from liver. The liver is divided into multiple nodules, by thick bnds of fibrous tissue around the portal areas.

The specimen shows PORTAL CIRRHOSIS of LIVER

جگر کے انحطاط کی متعدد قسمیں ہیں۔ جن کی تفصیل تقریباً ایک سی ہے۔ البتہ علامات کا موازنہ بعض اوقات مفید ہوتا ہے جو یوں ہے۔

ALCOHOLIC	POSTNECROTIC
CIRRHOSIS	CIRRHOSIS

نفاذ ترمو جلا ہوتے ہیں	خواتین میں زیادہ	جنس
40 سال کے بعد زیادہ ہوتا ہے	کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے	عمر
عام طور پر جگر میں پہلے سے	جگر کی خرابی اکثر	جگر کی سوزش اور بیماریوں
کوئی تکلیف نہیں رہتی۔	رہتی ہے	کے سابقہ سلسلے
اکثر بڑھ جاتا ہے	جگر سکڑا ہوا	جگر کی حالت
اکثر نہیں بڑھتی	بڑھ جاتی ہے	تلی
معمولی	کافی	ویٹ میں پانی
کبھی کبھی	اکثر	خون کی تے

غشی کے دورے	اکثر	بھی بھی
بخار	بھی بھی	اکثر ہو جاتا ہے
جسم کی حالت	دہلا	موٹا ہوا جاتا ہے
انہام	افسوسناک	پنوں میں دردیں دماغی عوارض
		پاکل پن ہاتھوں میں تشنج

علاج : مریض کو چلنے پھرنے کی ممانعت کر دی جائے۔ بستر پر لینا رہے۔ غذا میں نمک اور پختائی کم کی جائے۔ تازہ سبزیاں، پھل اور لحمیات از قسم مرغی کا گوشت دیا جائے۔ وٹامن B مرکب دی جائے۔ خون کی کمی کے لئے فولاد کے مرکبات VITAMIN B-12 کے انجکشن دیئے جائیں۔

مریض کو نشہ آور ادویہ اور خاص طور پر جگر کو نقصان دینے والی دوائیں نہ دی جائیں۔ ہیٹ سے پانی نکلانے کے لئے پیشاب آور ادویہ دی جائیں۔ علاج کے سلسلہ میں استعجال ہونے والے طریقے ایسے ہیں جن کو صرف ماہر اور تجربہ کار ہاتھوں انہام پانا چاہئے۔ اس لئے مریض اگر بستر ہونے تک ہسپتال میں داخل رہے تو بستر رہے گا۔

## یرقان JAUNDICE

یرقان سے مراد آنکھوں اور زبان کا زرد ہو جانا لیا جاتا ہے۔ کراچی میں لوگوں نے اسے بیلیا جیسا دلچسپ نام دیا ہے۔ یہ بیماری نہیں بلکہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں سارے جسم کے اندر اور باہر زردی چھا جاتی ہے۔ آنکھوں کی زردی کے ساتھ پیشاب اور پاخانہ کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔

صفرا کے رنگوں کا تعلق خون کے سرخ دانوں سے ہے۔ جب یہ سرخ دانے ٹھس جاتے ہیں تو مختلف مقامات پر ان کو توڑ پھوڑ کر کے ان میں موجود کیمیائی عناصر نکال لئے جاتے ہیں تاکہ دوبارہ کام میں لائے جاسکیں۔ ان میں ایک اہم حصہ صفراوی رنگ یا BILIRUBIN ہوتا ہے۔ یہ رنگ خون کے ذریعہ الیومن کے ساتھ شامل

کر کے جگر کی سمت بھیجا جاتا ہے تاکہ وہاں سے یہ پھر سے صفرا میں شامل ہو کر گردش میں شریک ہو جائے۔ گردے اس رنگ کو باہر نہیں نکال سکتے۔ جگر میں جا کر قالتو رنگ کو لمبیت کے ساتھ شامل کر کے جسم سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔

غذا کو ہضم کرنے کے دوران صفرا کا جو حصہ چھوٹی آنت میں آن کر مگرتا ہے اس کا کچھ حصہ وہیں سے دوبارہ خون میں شامل ہو کر پھر سے جگر کو چلا جاتا ہے۔ جب کہ بقیہ بڑی آنت میں جا کر STERCOBILIN کی صورت میں پاخانہ میں شامل ہو کر اس کو خاکی رنگت دے دیتا ہے۔ بڑی آنت سے اس کی اضافی مقدار گردوں کو چلی جاتی ہے۔ جہاں سے یہ UROBILINOGEN کے نام سے پیشاب کے راستہ خارج کر دی جاتی ہے۔

جسم میں اس رنگ کی آمدورفت کے اس نظام کو جاننے کے بعد اہم صورت یہ ہے کہ خون میں اس کی مقدار 100cc میں ایک گرام سے کم رہتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس شرح میں اضافہ ہو جائے مثلاً یہ مقدار 1.5 ملی گرام سے بڑھ جائے تو جسم کو پیلا رنگ دے دیتا ہے۔

یرقان کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں صفراوی رنگ کی مقدار اتنی بڑھ گئی کہ جسم ان کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ کسی بیماری میں خون کے سرخ دانوں کی وسیع پیمانہ پر تباہی شروع ہو جائے یا جگر میں خون کا نظام درہم برہم ہو جائے یا اس کے اخراج کے راستوں میں سے کسی جگہ رکاوٹ آجائے۔

اسباب: یرقان کو ان اہم اسباب سے بیان کیا جاتا ہے

1- رکاوٹ سے پیدا ہونے والا OBSTRUCTIVE JAUNDICES اس میں پتہ کی پتھریاں یا بلبلہ میں کینسر کی وجہ سے آنتوں کو آنے والی صفرا کی نالیاں مسدود ہو جاتی ہیں۔ اور صفراوی رنگ اور صفرا آنتوں میں مگرنے کی بجائے دوران خون میں شامل ہو کر جسم کو رنگ دیتے ہیں۔

2- خون کی ایسی بیماریاں جن میں سرخ دانے وسیع پیمانے پر ضائع ہو رہے ہوں۔ خون کو کلف کرنے والی ادویہ کے انجیکشن، پانی کا ٹیکہ، سانپ کا زہر

3. وہابی یرقان میں وائرس کی وجہ سے جگر میں سوزش ہو جاتی ہے۔ سوزش کی وجہ سے جگر کے اندر صفرا اور خون کے دوران میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور رنگ آنٹوں میں گرنے کی بجائے دوران خون میں جا کر زردی لے آتے ہیں۔

4. نوزائیدہ بچوں میں والدین کے خون کے درمیان عدم تقاوت کی وجہ سے صفرا رنگوں کے کیمیائی اثرات کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں اور بچے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ جسے NEONATAL JAUNDICE کہتے ہیں۔

یرقان کے مریض کی روکداد: مریض کی بیماری کی روکداد اور علاج کا مشاہدہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ مثلاً

عمر نوزائیدہ بچوں میں خون کے مسائل، جگر میں پیدائشی رکاوٹ کے علاوہ والدین میں سوروشی، تشک۔

بڑی عمر والوں میں پتہ کی پتھریاں، جگر کی سوزش اور نوجوانوں میں منتر صحت اور یہ کا استعمال۔

جنس: مردوں میں بلبہ اور جگر کی رسولیاں اور خواتین میں پتہ کی سوزش، پتھریاں۔

پیشہ: منتر صحت کیمیائی عناصر کا کاروبار شراب نوشی، متعدد بیماریوں کے متعدد حملے خاندانی اثرات: بعض گھروں میں پتہ کی پتھریاں یا جگر کی خرابیاں خاندانی نوعیت اختیار کر لیتی ہیں۔ یا گھر میں کسی کو سوزش کی وجہ سے یرقان ہو تو گھر کے دوسرے افراد کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے۔

سابقہ بیماریاں: جس شخص نے زندگی میں کئی مرتبہ نیچے لگوائے ہوں۔ یا اس کو خون کی بوتل لگی ہو یا اس نے تقریباً ”گلوکوس لگوا یا ہو یا گردوں کی خرابی کی وجہ سے گردے صاف کرنے کے عمل سے گزرا ہو اس کو یرقان ہونے کے امکانات دوسروں سے زیادہ ہوتے ہیں۔

مانع حمل گولیاں، قوت مردی کے لئے TESTOSTRONE کی گولیاں، سلقا

ٹائیڈ کی گولیاں از قسم SD Z 693 وغیرہ شرف، ہرنال، سکھیا اور قلعی کاکشہ قسم کی دوائیں جگر کے غلیوں کے لئے نقصان دہ ہیں۔

جس شخص نے ہیٹ کا کوئی آپریشن کرایا ہو اس میں امکان موجود ہے کہ چہرہ پھاڑ کے دوران جگر کی ٹالیوں کو ضرر پہنچا ہو یا بے ہوشی کے لئے دی گئی دوائیں جگر کو خراب کرتی ہیں۔

علامات: بیماری کی اہم ترین اور واضح علامت یرقان ہوتا ہے۔ اگر یہ مختصر عرصہ سے ہو تو سوزش کی وجہ سے روز بروز بڑھتا جائے تو کیفر کی وجہ سے اور کسی پیشی پتھری کی رکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے جلد کی زردی بھی تشخیص میں اہمیت رکھتی ہے۔ رنگ اگر GOLDEN YELLOW ہو تو جگر کی خرابی کی وجہ سے PALE YELLOW خون کے سرخ دانوں کی تباہی سے اور سبزی مائل زرد GREENISH YELLOWISH کیفر کی وجہ سے ہوتا ہے۔

یہ بھی ایک اہم علامت ہے۔ اگر یہ عرصہ دراز سے ہو اور چکنائی تکلیف میں اضافہ کرے تو یرقان پتھ کی سوزش کی وجہ سے ہے۔ جھک کی کمی، حلی اور معدہ میں درد جگر کی سوزش کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جگر کی خرابی اور کیفر کی وجہ سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ ہیٹ میں قونجی درد، صفرا کی رکاوٹ کی وجہ سے۔ جگر کی سوزش کی وجہ سے بخار ہوتا ہے۔ یہ بخار جگر میں امیبا سے ہونے والے پھوڑے AMOEBIC ABSCESS کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پرانی پینش کا سراغ بھی ملے گا۔ جب کہ عام حالت میں صرف معمولی اسہال ہو سکتے ہیں۔

جسم پر خارش، کمر درد، شدید جسمانی کمزوری، گہرے رنگ کا پیشاب اور مٹی کے رنگ کا پاخانہ اس بیماری کی اہم علامات ہیں۔ شراپیوں میں جسم کے ہال مگرتے ہیں۔ منہ سے بدبو آتی ہے۔ اور ہاتھوں میں ہلکا سا رعشہ محسوس ہوتا ہے۔ بعض دماغی علامات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ یرقان کے ساتھ بڑھا ہوا ہیٹ یا پانی کی موجودگی جگر کے انحطاط اور رسولیاں کی وجہ سے ہوتی ہے۔

تشخیص: یرقان اگر صفرا کی ٹالیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے ہو تو اس میں خون کے

کیمیائی تجزیہ کے نتائج یہ ہوتے ہیں۔

TOTAL BILIRUBIN - 5.8 mg 100 cc.

(Normal 1.0 mg)

Conjugated bilirubin - 4.1 - -

Unconjugated - - 1.7 - - -

S. G. T. - 500 (normal 35)

Alkaline Phosphatase - 200 (normal 3 - 13)

خون کے اضافی ٹیسٹ میں

Bleeding Time - 10 minutes (normal 7 - 8 minutes)

Prothrombin Time - more than 30 Sec

(normal 12 Seconds)

TLC سفید دانے

کم مقدار میں

بعض معمولی املاحوں کے ساتھ BILE PIGMENTS کی مقدار کافی زیادہ ہوگی۔ وہ یہ تھن جو خون کے سرخ دانوں کی چابی کی وجہ سے ہو اس میں خون کے کیمیائی معائنے پر مندرجہ ذیل صورت حال دیکھنے میں آئے گی۔

TOTAL BILIRUBIN \_\_ 7.8 mg / 100 cc.

Conjugated \_\_ 2.1 mg / 100 cc.

Unconjugated \_\_ 5.7 mg / 100 cc.

اس کیفیت میں صفراوی رنگ OBSTRUCTIVE JAUNDICE سے زیادہ ہوتے ہیں اور خون میں UNCONJUGATED کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جب کہ بندش سے ہونے والے یہ تھن میں CONJUGATED زیادہ ہوتی ہے۔

پیشاب میں UROBILIN کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔

الٹراساؤنڈ ایک مفید طریقہ ہے۔ جس میں سبب کے مطابق تبدیلیاں نظر آئیں



گی۔ اگر پتہ میں پتھری یا سوزش ہے تو وہ واضح ہو جائے گی۔ جب کہ جگر کی اپنی خرابی کا بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ کلی بڑھی ہوئی ملے گی۔

علاج: چونکہ یرقان کا اثر دل پر ہو سکتا ہے اس لئے مریض ہر حال میں بستر پر پڑا رہے۔ گردوں پر برا اثر ہونے کے اندیشہ کو مسلسل توجہ میں رکھا جائے اصل مسئلہ سبب کو تلاش کر کے اس کو دور کرنا ہے۔ اگر سوزش وغیرہ کی وجہ سے ہے یا خون کے سرخ دانوں کی جگہ یرقان کا باعث ہے تو ادویہ سے فائدہ ہونے کی توقع موجود ہے۔ لیکن پتھری یا کینسر کی وجہ سے رکاوٹ کی صورت میں دوائیں بے کار ہوں گی۔ مریض کا صحیح علاج آپریشن ہے۔ ایسے مریضوں کا آپریشن بھی آسان نہیں ہوتا کیونکہ یرقان خون بننے کی بیماری ہے۔ بلکہ ایک قسم کا ٹائٹم بم ہے۔ اس کو چا تو لگا کر خیریت سے نکل جانا کسی کسی کو آتا ہے۔

علاج میں ان فنی مشکلات کے باوجود لوگ یرقان کا علاج کرتے ہیں اور اکثر مریضوں کو شفا بھی ہوتی ہے۔ آپریشن کی نوبت کبھی کبھار ہی آتی ہے۔ طب جدید میں گلوکوس کے مرکبات وسیع مقدار میں دیئے جاتے ہیں۔ بعض معالج گلوکوس کا محلول ورید کے راستے بھی داخل کرتے ہیں۔ عام حالات میں اس کا جواز صرف ایسے مریضوں میں ہے جن کو قے یا متلی ہو۔ مریض کو چکناٹیوں کی ہر قسم سے پرہیز کرواتے ہوئے تقریباً 120 گرام لحمیات روزانہ دیئے جائیں۔ چونکہ پرندوں کے گوشت اور ہلکے وزن کی پھیلیوں میں چربی نہیں ہوتی۔ اس لئے ان کو کونکوں پر بھون کر یا ابال کر دیا جاتا ہے۔

لحمیات کی مقدار میں اضافہ کے لئے LITRISON کی 4-6 گولیاں روزانہ دی جاتی ہیں COMPLAN کا سفوف پانی یا جوس میں گھون کر دن میں بار بار دیا جاتا ہے۔ امار 'شگتر' اور دوسرے پھلوں کے جوس تھوڑی تھوڑی مقدار میں بار بار دیئے جاتے ہیں۔ قوت مدافعت میں اضافہ اور جگر کی حفاظت کے لئے حیاتیات کی گولیاں یا ٹیکے اور حال ہی میں آنے والی JETTIPAR کا استعمال ایک ضرورت بن گئے ہیں۔

پرہیز اور علاج کے ایک طویل عرصہ کے بعد مریض کے تندرست ہونے کا

امکان ہوتا ہے۔ یہ عرصہ عام طور پر تین ماہ ہوتا ہے۔ اگر علاج کے دوران یرقان کی شدت میں اضافہ ہوتا رہے تو پھر ہسپتال میں داخل ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔

## طب یونانی

اس میں کوئی شک نہیں کہ یرقان کے تندرست ہونے والے مریضوں کی اکثریت کو یونانی علاج سے صحت ہو جاتی ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ یونانی ادویہ تاثیر کے لحاظ سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اس لئے وہ جگر کی گرمی کو مار کر صحت کو زیادہ جلد قریب لاتی ہیں۔ ان ادویہ کی افادیت کے ہم معترف ہیں لیکن ان کے اثرات میں ٹھنڈک یا جگر میں گرمی والا قصہ درست نہیں۔ اس بیماری کے اسباب اور جگر میں ہونے والی خرابیوں کا تفصیلی تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ جس میں گرمی کا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔

اہلہائے قدیم نے کاسنی اور کھو کے عرق، انار، مندوں، نیلوفر اور برزوری کے شربت مریضوں کو پلا کر آرام اور فرحت مہیا کی ہے۔ کاسنی کی چھال، مندوں کے پتے، اندرائن، بکائن، مہتھی، چہ پٹ، آلو بخارا، املی، طباشیر، منقہ، ہلیہ، آغہ وغیرہ کے مختلف مرکبات سے نہایت عمدہ نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر ادویہ خوش ذائقہ، مفید اور جگر کے لئے مصلح ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ پڑھے لکھے حکماء نے ان کے استعمال کے جو طریقے وضع کئے ان میں سے اثر اب تیاری کی مشکلات کی وجہ سے استعمال میں نہیں۔

ان ادویہ کے ساتھ غذا اور پرہیز جدید علم سے حاصل کر لیا جائے تو ایک عام مریض کے لئے بہترین نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔

## طب نبوی

اس بارے میں طب نبوی کی اہم ترین ادویہ شدہ 'جو' تربوز، انار، کاسنی، مینھی، گوجل، ریحان، کھجور، انجیر، دنا، منقہ اور کدو ہیں۔

پاکستان کی باکسٹک ٹیم کے ایک کھلاڑی کے میڈیکل پر معلوم ہوا کہ اسے یرقان ہے۔ ٹیم کے کوچ کو اس نوجوان کے جیتنے کی توقع تھی۔ وہ لڑکے کو ہمارے پاس لے آیا۔ ہم نے اس نوجوان کو بتلایا کہ وہ پانی میں گھول کر شربت بنا کر۔ جس طرح بھی ممکن ہوا بڑے جچے شدہ روزانہ پی لیا کرے۔

لڑکا بازار سے 3 کلو شدہ کا ڈیہ لے کر آیا۔ دس دن میں اس نے پورا ڈیہ پی لیا اور میرے پاس آنے کی بجائے اس ڈاکٹر کے پاس گیا جس نے اسے کھیل کے ناقابل قرار دیا تھا۔ ڈاکٹر نے جب شفاف آنکھیں مضبوط نبض اور حلق چوند لڑکا دیکھا تو اس کا خون ٹیٹ کروایا۔ جب وہ ٹھیک لگا تو لیبارٹری والوں پر برسنے لگا کیونکہ انہوں نے پہلا نتیجہ غلط دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی دانست میں یرقان کا مریض تین ماہ سے پیٹے ٹھیک نہیں ہو سکتا اور اگر ایسا ہوا تو پھر یرقان نہ ہو گا۔

ہمارا خیال تھا کہ ایک ہفتہ شدہ دینے کے بعد اگر یرقان میں کمی نہ ہوتی تو کچھ اور بھی دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم عہدہ ایسا شاندار تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کے سوچنے کی ضرورت ہی نہ رہی۔

جگر کی تمام بیماریوں میں ایک چیز واضح ہے کہ اکثر بیماریاں کیلیاوی زہروں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جگر کو زہروں کے اثرات سے بچانے کا ایک لاجواب نسخہ عامر بن سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں۔

سمعت سعداً یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تصبیح سبع تمرات عجوة لم یضره ذلک الیوم سم و

## لا سحر

(بخاری، مسلم، ابوداؤد)

(میں نے سہ (اپنے والد) سے سنا۔ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت مجھ کو کھجور کے سات دانے کھائے اس دن اسے سحر اور زہر بھی نقصان نہیں دیں گے)

اسی طرح کی ایک روایت میں ارشاد گرامی ہوا کہ جس رات کو کھجوریں کھائیں صبح تک اس پر زہر بھی اثر انداز نہ ہو گا۔

حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ:

ان الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی عجوة العالینہ غلاء وانه تریاق اول البکرة (مسلم)

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجوہ کھجور میں شفا ہے اور اگر اسے ہمارے کھائیں تو یہ زہروں کا تریاق ہے)

جگر کی تینوں مذکورہ بیماریوں میں ہمارا واسطہ مختلف زہروں کے سمیاتی اثرات سے ہے۔ ان کے علاج میں کھجور کی افادیت ان احادیث سے واضح ہے۔ یرقان کی اس قسم میں جہاں صفرا کی ٹالیوں میں رکاوٹ آ جاتی ہے یا قویج ہوتا ہے۔ پھر کھجور ہی مسئلہ کا حل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہؓ یوں بیان فرماتے ہیں۔

اکل التمر امان من القویج (ابو نعیم)

کھجور کھانے سے قویج نہیں ہوتا۔

کھجور غیر ارادی عضلات سے گریں کھول کر ان کو قویج سے بچاتی ہیں۔ اور اگر یہی اثر پتے کی ٹالیوں پر میسر آ جائے تو وہ پتھر نکل جائے گا جو ٹالی کو مسدود کر کے یرقان کا باعث بن جاتا ہے۔

جگر کو شراب اور زہروں کے اثرات سے بچانے کے لئے کھجور ایک لاجواب تحفہ ہے لیکن جب جگر میں انحطاطی عمل شروع ہو جائے اور CIRRHOSIS ہونے لگے تو ہمارے ذاتی خیال میں وہ مرحلہ انجیر دینے کا ہے۔ اس کی افادیت میں

ابن الجبطل نے پتے سے پتھری نکالنے کا فائدہ اگرچہ بیان کیا ہے لیکن جگر یا دوسری جگہ پر انحطاط کو روکنے یا FIBROSIS کا علاوہ کرنے میں انجیر مفید ہے۔ وہ جگر جو سکڑتا چلا جا رہا ہو انجیر کھانے سے پھر نارمل ہونے لگتا ہے۔

فیرا راوی عضلات کے سرے کھولنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منقہ تجویز فرمایا ہے۔ حضور اکرمؐ نے ایسے عضلات کی مثال میں ہوشیروں میں سانس کی نالیوں کے پارے میں ارشاد فرمایا۔

عليكم بالزبيب فانه يكشف المرء و يذهب بالبلغم

(ابو نعیم)

(تمہارے لئے منقہ موجود ہے۔ جو چہرے کے رنگ کو کھارتا اور بلغم

نکالتا ہے)

حضرت علیؓ کی اس روایت کے علاوہ جن میں منقہ سے اعصاب کو قوت رنگ میں کھار میں ہی نہیں بلکہ غم و حزن سے نجات کا بھی فرمایا گیا۔ آپ خود منقہ کو بھگو کر اگلے روز اس کا پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔

جب وائرس کی وجہ سے جگر پر سوزش ہو تو دوسری جراثیم کش ادویہ کے ساتھ اگر مندی کو شامل کیا جائے تو یہ وائرس کو ہلاک کر دے گی۔

ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ بیان فرماتی ہیں۔

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی ایسا کوئی کاٹرا نہیں

چھو یا زخم نہیں لگا جس پر مندی نہ لگائی گئی ہو)

کتاب التاریخ میں امام بخاریؒ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ارشاد نقل

کیا ہے۔

ما من شجرة احب الى الله من العناب

(اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا درخت مندی کا ہے)

محدث محمد احمد زہبی کہتے ہیں کہ مندی کا پانی پلانے سے کوڑھ کا زخم بھی بھر جاتا

ہے۔ حکیم کبیر الدین نے مندی کو مصفی خون قرار دیا ہے۔ الہباء قدیم نے مندی

کے پتے رات بھر بھگونے کے بعد صبح اس کے پانی میں شکر ملا کر دینے سے یرقان کا علاج کیا ہے۔ برٹش فارماکوپیا میں مندی کے پتوں کو معدہ کے السر اور پچش کے لئے مفید بتایا گیا تھا۔ اطباء یونان چچک کے علاج میں مندی استعمال کرتے تھے۔

ان تمام نکات کو جمع کریں تو نتیجہ یہ ہے کہ یرقان کی ہر قسم اور سوزش سے ہونے والی جگر کی تمام بیماریوں میں مندی کے پتے چس کر دینے یا ان کا جوشاندہ یعنی اثرات رکھتا ہے۔ ہم نے آہستوں کے زخموں کے علاج میں انہی مشاہدات کی بنا پر مندی کو نسخوں میں شامل کیا ہے۔ گلے اور مسوزھوں کی سوزش میں مریضوں کو مندی کی کلیاں کدوا کر شندار نتائج حاصل کئے ہیں۔

کاسنی کے افادات کے بارے میں ابن القیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد کیا ہے۔

من اكل الهندباء ثم نام عليه لم يعل فيه سم ولا سحر

(جس نے کاسنی کھائی اور سو گیا۔ اس پر جادو اور زہر بھی اثر انداز نہ

ہوں گے)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

عليكم بالهندباء فانه ما من يوم الا وهو ينظر عليه من قطر

الجبته (ابو نعیم)

(تمہارے لئے کاسنی موجود ہے۔ ایسا کوئی دن نہیں گزرتا کہ جب

جنت کے پانی کے قطرے اس کے پودے پر نہ گرتا ہوں)

اطباء نے جنت کے پانی والی بات کو اتنی اہمیت دی ہے کہ کاسنی کے پتے جب

بھی کسی دوائی میں استعمال کئے جائیں ان کو دھویا نہیں جاتا۔ پرانے نسخوں میں جگر کی بیماریوں کے لئے کاسنی اور مکہ کے عرق بڑے اہم تھے۔ مگر اب تو عرق بنانے والا کوئی

باقی نہ رہا۔ اس لئے کاسنی کے پتے یا اس کے چب ہی استعمال میں رہ گئے ہیں۔

ابن القیم تو اس کے اتنے معتقد رہے ہیں کہ وہ قرار دیتے ہیں۔

”اس کے پتوں کا پانی نکال کر اگر آنکھ میں ڈالا جائے تو آنکھ کی

سقیدی جاتی رہتی ہے۔“

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نسخہ بیان کرتے ہیں۔  
 ”انہوں نے رات کو موگل بگھوایا۔ صبح اس میں شکر ملا کر پیا اور فرمایا  
 کہ یہ پیشاب کی تکلیف اور محافظہ کی کمی کا بہترین علاج ہے۔“

(ابو نعیم)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرحت کے لئے سمجھور یا منقی یا موگل کو رات بگھو کر صبح  
 اس کا پانی اسی طرح پیا کرتے تھے اور ان میں سے ہر ایک جگر کی بیماریوں میں شاندار  
 ہے۔

اللہ تعالیٰ نے شہد کو شفا اور سمجھور کو کمزوری کا حل قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ  
 وسلم نے کاسنی، کلوچی، مٹھی، موگل، زبوز، مٹھا سنگترا، منقی، جو، جو کا دلیا، مندی کو  
 بہترین دوائیں قرار دیا۔ محمد احمد ذہبی نے آلو بخارا کو اجاص کے نام سے طب نبوی کا  
 عنصر قرار دیا ہے۔ مگر اس کے ثبوت میں انہوں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔  
 ہمارے اطباء آلو بخارا کو تھوڑی کے ساتھ ملا کر یہ قان، جگر اور تلی کی بیماریوں میں  
 استعمال کرتے آئے ہیں اس نسخہ میں اہل سے اختلاف کرنے کی گنجائش موجود ہے  
 کیونکہ اکثر مریضوں میں جگر میں خون کے انحصار سے معدہ میں سوزش خصل ہو سکتی  
 ہے ایسے میں وہاں پر اہل جیسے حیرانی چیز شامل کرنا شاید مناسب نہ ہو گا۔

جو کا دلیا پیشاب آور، آنٹوں کے لئے مسکن اور کمزوری کے لئے لاجواب ہے۔  
 ہم نے گردوں اور جگر کے تمام مریضوں کو جدید مدر البول ادویہ کی بجائے ہمیشہ جو کا پانی  
 شہد ملا کر پلایا۔ اس سے ٹالیوں کی جلن میں کمی ہوتی، سہلے نکلے۔ پتھریاں گل کر  
 نکلیں اور مریض کو علاج کے دوران نہ قوتقاہت ہوتی اور نہ ہی اس کے جسم کے  
 کیمیادی نظام میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی۔ ورنہ جدید ادویہ میں ایک دوائی پیشاب کے  
 لئے دینے کے بعد دوسری پوٹاشیم کی کمی کے لئے دینی پڑتی ہے۔

قدرت نے جگر اور گردوں میں یہ کمال رکھا ہے کہ اگر ان کا کوئی ایک تثنائی بھی  
 خراب جائے تو وہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو حیات نو دے دینے کی استعداد رکھتے ہیں۔

جگر کی تمام بیماریوں میں طب نبوی کے یہ اصول یکساں طور پر مفید ہیں۔ انحطاط یعنی CIRRHOSIS کی چار قسموں HEPATITIS- یرقان اور رکاوٹ کے مسائل میں ان میں سے ہر دوائی جان بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

اس ضمن میں ایک دوست کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہو گا ان کو پتہ میں سوزش تھی اور کافی دنوں سے بلڈ پریشر روز بروز کم ہو رہا تھا۔ انہوں نے اس غرض کے لئے وٹامن ب کے ٹیکے اپنے محلہ کے ایک کپوٹڈر سے لگوائے۔ ٹیکے لگوانے کے دو ماہ بعد ان کو یرقان کی علامات ظاہر ہونے لگیں۔ ایک ہفتہ میں یرقان بھرپور انداز میں حملہ آور ہو گیا۔ پیشاب کا رنگ بدلنے کے ساتھ پانچاں مٹی کے رنگ کا اور دل پر بوجھ رہنے لگا۔ بھوک از مٹی ان کو بر سبیل تذکرہ راستہ میں ہی بتایا گیا کہ وہ پیشاب ٹیسٹ کروائیں اور خون میں BILIRUBIN کا حال معلوم کریں۔ جس کا جواب یہ آیا۔

BLOOD BILIRUBIN 100 cc 8.9 mg

(Normal 1.0 mg)

پیشاب میں BILIRUBIN اور UROBILIN معقول مقدار میں موجود پائی گئیں ان نتائج سے وہ دہشت زدہ ہو گئے اور باقاعدہ علاج کے لئے تشریف لائے۔ ابتدائی طور پر ان کو شہد، جو کا پانی اور کھجوریں تجویز کئے گئے۔ کھانے میں مرنی کا گوشت اہل کر یا کونکوں پر سینک کر 'انار اور گھگھرو کا جوس' 'تربوز' کھیرے اور خربوزہ بتایا گیا۔ ایک ہفتہ کے بعد ان کے خون کا نتیجہ یہ رہا۔

## LIVER FUNCTION TESTS

### BILIRUBIN

Total 4.8 mg/ 100 cc (Normal Upto 1 mg)

Conjugated 2 mg (Normal Upto 0.2 mg/ a)

S.G.P.T 256 U/L (do-40 U/L)

ALKPHOSPH 489 U/L (55-220 U/L)



اس رپورٹ میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ Bilirubin 8.9 سے کم ہو کر 4.8 ہو گئی۔ پچھلے ٹیسٹ میں SGPT کی مقدار 452 تھی جب اس کا نارمل سے زیادہ تھیں۔ لیکن مریض کی حالت بہتر ہو رہی تھی۔ اگلے ہفتے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں۔ مگر اس کے لئے کلوئچی، کاسنی اور حبلہ کا مرکب اضافی طور پر دینا پڑا۔

جگر کے کینسر کا مسئلہ نیڑھا ہے۔ ہم نے اب تک چند ہی مریض دیکھے ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک اللہ کے فضل سے زندہ ہے۔ میوہپتال لاہور کے ایک ڈاکٹر صاحب کی والدہ کو ذیابیطس، ریتان، گردوں کی بیماری کے ساتھ جگر کا سرطان بھی تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحائف سے بہرہ ور ہو رہی ہیں۔ آج آٹھ ماہ گزرنے کے بعد وہ چارپائی سے اٹھ چکی ہیں۔ اور تندرست عورت کی طرح گھر کا کام کاج کرتی ہیں۔ ان کے جگر کی کارکردگی کے اکثر ٹیسٹ ٹھیک ہو چکے ہیں لیکن کینسر کے بارے میں کوئی صریح بات ابھی کہنی ممکن نہیں۔ آثار و قرائن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان بیماریوں سے ان شاء اللہ ہستی مسکراتی نکل جائیں گی۔ کینسر کے لئے ان کو قسط، کلوئچی، مندی اور کاسنی کے مرکب نسخے دیئے جا رہے ہیں۔ جب کہ اسی نسخہ میں کلوئچی اور کاسنی ذیابیطس کا علاج بھی ہیں۔ جگر کے متاثرہ مریضوں کے لئے سنگترا، تربوز، کیلا، خربوزہ بے حد مفید ہیں۔

## امراض مرارہ (پتہ کی بیماریاں)

### DISEASES OF THE GALL BLADDER

جگر کے دائیں اور بائیں حصہ سے صفرا لانے والی نالیاں باہر نکل کر انگریزی حرف Y کی شکل کی ایک نالی بناتی ہیں۔ جو ذرا نیچے جاتی ہے تو اس کے ساتھ پتہ لگا ہے۔ جگر سے روزانہ 1000-2000cc صفرا پیدا ہوتا ہے۔ جس کا کچھ حصہ براہ راست چھوٹی آنت میں گرتا رہتا ہے جب کہ اس کا زیادہ حصہ پتہ میں جمع ہو جاتا ہے۔ پتہ دائیں طرف کی نویں پہلی کے نیچے واقع ہے اس میں ایک وقت میں 50cc صفرا جمع رہ سکتا ہے پتہ کا بنیادی مقصد صفرا کو ضرورت کے لئے ذخیرہ کرنا ہے۔ چونکہ اس کا حجم زیادہ نہیں بلکہ وہاں پر کسی بڑی چیز کے سامنے کی جگہ بھی موجود نہیں اس لئے پتہ یہاں آنے والے صفرا کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اسے گاڑھا بھی کرتا رہتا ہے۔ اس طرح یہ 1000cc صفرا کو 100cc بنا کر ذخیرہ کر لیتا ہے۔

صفرا میں اہم ترین اجزاء صفرا کے رنگ اور صفرا کے نمکیات ہیں۔ اگرچہ رنگوں کا مقصد زیادہ طور پر معلوم نہیں ہو سکا لیکن یہ مقدار میں بڑھ جائیں تو سارے جسم کو پیلا کر دیتے ہیں اور برقان ہو جاتا ہے۔ صفرا کے نمکیات BILE SALTS غذا کے ہضم اور اس کے جزو بدن ہونے میں اہم خدمات سرانجام دیتے ہیں۔ یہ پکٹائیوں کو ہضم کرنے میں معاون ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں آنتوں سے جذب کرنے میں بھی اپنی کاوشوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وٹامن K ان کے بغیر جذب نہیں ہو سکتی۔ چونکہ اس وٹامن کا تعلق خون کو بننے سے روکنے کا ہے اس لئے جب یہ موجود نہ ہو گی تو

مریض کے جسم کے کسی حصے سے بننے والا خون رکنے میں نہ آئے گا۔  
 پتہ کے ان افعال اور مقاصد کو سامنے رکھیں تو اس میں ہونے والی خرابیوں اور  
 بیماریوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جیسے کہ اگر تھکی یا چکناٹیوں کے کھانے سے  
 تکلیف ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ پتہ سے صفرا آنتوں کو مطلوبہ مقدار میں میسر  
 نہیں ہو رہا۔

پتہ کی پتھریاں

### GALLSTONES (CHOLELITHIASIS)

پتہ میں پتھری اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر شخص کو ایسی کوئی تکلیف نہیں  
 ہوتی جس سے ان کی موجودگی کا شبہ یا اندازہ ہو سکے کیونکہ علامات کے بغیر دنیا میں کافی  
 لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ مشاہدات سے معلوم ہوا کہ امریکہ، کینڈا اور آسٹریلیا  
 کے رہنے والوں کو پتھریاں دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ جبکہ پاکستان، بھارت اور  
 مشرق بعید کے بہت سے ممالک میں ان کی شرح بہت کم ہے۔

شاید اس کی وجہ غذاؤں میں چکناٹیوں کی زیادتی ہو۔ برصغیر اور مشرق بعید میں  
 غربت زیادہ اور ایک عام آدمی کی خوراک میں چکناٹی کی مقدار 30 گرام یومیہ سے  
 زیادہ نہیں ہوتی۔ جب کہ وسطی یورپ اور امریکہ والے روزانہ 70 سے 100 گرام  
 تک چکناٹی کھاتے ہیں۔ ان پتھروں کی تخلیق میں صفراوی رنگوں کے ساتھ کو لیسٹرول  
 CHOLESTROL بھی مقبول مقدار میں شامل ہوتی ہے۔ اس لئے غذائی چکناٹیوں  
 کو مورد الزام دینے میں کسی قدر حقیقت کو بھی دخل ہے۔

اسباب

جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ جسم میں داخل ہونے کے بعد چکناٹیوں اور  
 خاص طور پر حیوانی ذریعہ سے حاصل ہونے والی چیزوں میں کو لیسٹرول زیادہ پائی جاتی  
 ہے جو کہ پانی میں حل نہیں ہوتی۔ لیکن صفرا میں شامل ہو جاتی ہے۔ جگر جب صفرا  
 بناتا ہے تو اس میں کو لیسٹرول کا ایک حصہ بھی موجود ہوتا ہے جو مرکب کی شکل میں

پتہ میں ذخیرہ ہوتا ہے۔ لیکن جگر کی بعض بیماریوں میں صفرا کی پیدائش کا عمل غلط ہو جاتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ جگر نے ابتدا ہی میں کو لیسٹول کی اتنی زیادہ مقدار پیدا کر دی ہے کہ اسے مرکب میں حل رکھنا ممکن نہ ہو سکا یا مرکب کے دوسرے اجزاء ناقص ہونے کی وجہ سے اسے حل پذیر نہ رکھ سکے۔ لیکن پتھری بنانے میں پتہ کا اپنا کردار بھی اہم ہے۔ اگر وہ تندرست ہو تو عام حالات میں وہ پتھری بننے نہیں دیتا۔ لیکن پتہ میں اگر کسی وجہ سے سوزش ہو جائے تو پھر سوزش والے مقام پر رنگ اور کو لیسٹول جتنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ سوزش یعنی التهاب مرارہ کے 90 فیصدی مریضوں کو صرف سوزش نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ پتہ میں پتھریاں بھی ہوتی ہیں۔ غذا اور پتھریوں کا تعلق وضاحت سے اسی باب میں پیش ہے۔

### تشخیص

پتھریوں میں اگر کیٹیم کی مقدار زیادہ ہو تو ایلکرسے میں نظر آ جاتی ہیں ورنہ ان کی تشخیص کا بہترین طریقہ الزاساؤڈ ہے۔ جس کی مدد سے نہ صرف پتھریوں کا پتہ چل سکتا ہے بلکہ ان کا صحیح سائز بھی معلوم کیا جاسکتا ہے۔

### علامات

اکثر مریضوں کو پتہ میں پتھریوں کے باوجود کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور پتھریوں کی موجودگی کا پتہ اتفاقاتاً چلتا ہے۔ اس لئے زیادہ تر علامات پتھری کی وجہ سے نہیں بلکہ ان سے ہونے والے مسائل سے ہوتی ہے جیسے کہ:

1. تالیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے پتہ میں سوزش۔
2. تالیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے لیبیدہ میں سوزش۔
3. بڑی عمر کے مریضوں میں پتہ میں کینسر ہو جاتا ہے۔
4. پتہ اور جھوٹی آنت کے درمیان ایک سوراخ بن کر صفرا کے اخراج کا براہ راست غلط راستہ بن جاتا ہے۔ جس میں کبھی کوئی پتھر پھنس کر رکاوٹ یا پھر یرقان اور پیٹ کے اندر دوسرے خطرناک حوادث کا باعث ہو سکتا

ہے۔

5- برقان

## علاج

اگر کوئی تکلیف نہ ہو تو ان پتھروں کو نکالنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اگر مسائل پیدا ہونے شروع ہوں تو اسکا یقینی حل آپریشن ہے۔

حل ہی میں CHENODEOXYCHOLIC ACID نام کی ایک دوائی ایجاد ہوئی ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اسے دو سے تین سال تک لگاتار کھلایا جائے تو پتے کی پتھریاں حل ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں نے اسے ایجاد کیا ہے ان کے اپنے مشاہدات کے مطابق اس کی اذیت پچاس فیصدی کے قریب ہے۔

اگر کسی نے جدید علاج نہ کرنا ہو اور آپریشن ممکن نہ ہو تو ایسے لوگوں کے لئے ان گولیوں میں امید کی جھلک موجود ہے۔ اس کے برعکس طب نبوی میں اس بیماری کا مکمل علاج موجود ہے جسے اس باب کے آخر میں پیش کیا جا رہا ہے۔

## التهاب المرارة ACUTE CHOLECYSTITIS

طب میں پتہ کو مرارہ کہتے ہیں۔ جب پتہ میں شدید سوزش ہوتی ہے تو 90 فیصدی مریضوں میں اس کے ساتھ پتھریاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ نالیاں جو پتہ سے صفرالے کر آتی یا جاتی ہیں ان میں سے کسی ایک میں جب پتھر پھنس کر رکاوٹ کا باعث بنتا ہے تو وہاں کا اندرونی پریشر بڑھ جاتا ہے۔ رکاوٹ اور پریشر کی زیادتی سے اندرونی جھلیوں پر خراش یا سوزش پیدا ہوتی ہے جس پر بعد میں جراثیم آکر اسے باقاعدہ سوزش کی شکل دے دیتے ہیں۔

سوزش کے نتیجے میں پتہ اور اس میں موجود صفرامگلے ہو جاتے ہیں۔ اس سے اگلے مرحلہ میں پتہ کی دیواروں میں پیپ پڑ جاتی ہے اور یہ دیکھنے میں پیپ کی بھری ہوئی تھیل لگتا ہے۔ اس مرحلہ پر دوران خون منقطع ہو کر وہاں GANGRENE ہو سکتی ہے یا پتہ پھٹ کر سارے پیپ میں شدید قسم کی سوزش پیدا کر کے

PERITONITIS اور موت کا باعث ہو سکتا ہے۔ خوش قسمت مریضوں میں قدرت اس کے ارد گرد تھیلی کی بنیادیتی ہے اور اس طرح سوزش ایک حصہ تک محدود ہو جاتی ہے۔

### چکنائی اور پتہ کی بیماریاں

یہ بیماری عام طور پر 40 سال سے زیادہ عمر کی بچوں والی موٹی خواتین کو ہوتی ہے۔ بعض مشاہدوں میں ان خواتین کی اکثریت خوبصورت، عیان دار، بیسار خور اور پیٹ میں نفخ کی مریضائیں ہوتی ہیں۔ ان خواتین کو شدید سوزش کا حملہ عام طور پر بھرپور مرغن کھانے کے بعد ہوتا ہے۔

قدیم پاکستانی معاشرے میں تھی اور چکناٹیوں کے بارے میں بڑی خوش نمیاں پائی جاتی تھیں۔ سردی کے موسم میں اکثر خواتین اپنی جسمانی کمزوریوں کو دور کرنے کے لئے مٹی کے برتن میں مختلف دالوں کی پیچیری۔ اسی کی گول ”ہنیاں“ خشک حلوہ اور ”کمرکس“ بناتی ہیں۔ ان تمام کے لئے تقریباً ایک سے چار جن میں تیل والے بیج جیسے کہ اسی، چار، مغز، خشکاش، کمرکس، چار گوندیں، ناریل اور دوسرے مغزیات شامل ہوتے ہیں ان میں دسی تھی کو کوٹ کوٹ کر بھرا جاتا ہے۔ یہ مرغن غذائیں اس اسید پر کھائی جاتی ہیں کہ ان سے کمر کو مضبوطی ملتی ہے اور خواتین کے اندرونی اعضاء تقویت پاتے ہیں۔

زچگی کے دوران خواتین کو زیادہ سے زیادہ تھی کھلایا جاتا ہے۔ تھی سے لبریز مرکبات کے علاوہ بچے کی ماں کھانا کھاتے وقت روٹی پر بھی تھی لگاتی ہے اور تھی بھر تھی اپنے سالن میں علیحدہ سے ڈال کر یہ توقع رکھتی ہے کہ اس سے دل اور جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہو جاتی ہیں۔ زندگی کے کسی بھی مرحلہ پر تھی کمزوری کا علاج نہیں۔

ایک ڈاکٹر دوست نے اپنی بیگم کو زچکیوں کے بعد گوشت، پنجنی اور پھل وغیرہ قسم کی مفرغ اور مقوی خوراکیں دیں۔ بیگم صائبہ کے اصرار کے باوجود ان کو تھی کے مرکبات نہ دیئے گئے۔

ایک مرتبہ ان کے خاندان میں کسی کے یہاں ولادت ہوئی تو یہ اپنے  
میاں کو ہمراہ لے کر وہاں گئیں۔ زچہ کے لئے دودھ میں چھوہارے، کشمش  
اور ٹارمل ابال کر ہم وزن تھی اور شکر سے ایک آمیزہ ”اچھوانا“ تیار کیا  
گیا۔ جو خوشی کے طور پر صہانوں کو بھی پلایا گیا کچھ خواتین نے اس دہشت  
ناک مرکب کے دودھ گھاس بھی پیئے۔

خاندان کو یہ ”تعلیمی موازنہ“ دکھانے کے بعد ان کو عمر بھر یہ شکایت  
دی کہ بچوں کی پیدائش کے بعد بھی نہ پینے کی وجہ سے ان کی ہڈیاں کچی  
رہ گئیں ہیں۔ حالانکہ وہ اپنی ہم عمر خواتین سے زیادہ صحت مند اور  
تندرست پتہ کی مالک ہیں۔

اردو کا ایک مشہور محاورہ ہے کہ ”جیسا پودے کے ویسا کاٹو گے“ اس کے مطابق  
جب کوئی تھی۔ چکنائی یا اس سے بنے ہوئے مرکبات کھاتا ہے تو ان کے استعمال سے  
جسم کو نہ تو کوئی قوت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی کھانے کے مرکبات خون کی کمی کو دور  
کرتے ہیں۔ زچگی کے بعد زچہ کو سب سے زیادہ ضرورت ایسی چیزوں کی ہوتی ہے جن  
سے خون پیدا ہو اور جسم کے عضلات کو طاقت ملے۔ کھانے کا دیکھا ہو یا بناہتی اس  
میں صرف چکنائی ہوتی ہے۔ خون پیدا کرنے والے وٹامن یا فولاد کا کوئی حصہ نہیں  
ہوتا۔ اس میں لحمیات یا پروٹین بھی نہیں ہوتے۔ کھانے سے جسم میں چربی کی  
معتدل مقدار پیدا کی جاسکتی ہے۔ جسم میں جانے کے بعد یہ چکنائی خون کی ٹالیوں میں  
کو لیسٹروں کی صورت میں منجمد ہو کر ان میں بندش پیدا کر سکتی ہے۔ پتہ میں پتھریاں  
بن سکتی ہیں اور جسم کی ہیئت کو بد صورت بنانے میں لاجواب ہے۔ بعض لوگ اس غلط  
فہمی میں مبتلا ہیں کہ کارن آئیل یا نباتاتی تیل جسم میں چکنائی پیدا نہیں کرتے۔ یہ  
مفروضہ بالکل غلط ہے۔ چکنائی خواہ کسی بھی ذریعہ سے ہو جسم میں خرابی پیدا کر سکتی  
ہے البتہ نباتاتی ذرائع سے حاصل ہونے والی چکنائیاں کم نقصان دہ ہوتی ہیں اب کچھ  
لوگ نباتاتی چکنائیوں سے بھی بدظن ہو کر روغن زیتون کو کھانا پکانے کا بہترین طریقہ  
قرار دینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔

## علامات

اس کی اہم ترین علامت ”درد“ ہے۔ جو چار صورتوں میں ہو سکتی ہے پیٹ میں بوجھ، گہری دکھن جو کہ پیٹ کے وسط میں محسوس ہوتی ہے یا پیٹ کی جلد کے نیچے سارے علاقہ میں خاص طور پر وسطی اور درمیان میں پسلیوں سے نیچے، جلد کے نیچے کے عضلات اٹڑے ہوئے لگتے ہیں۔ یا قونچ کی طرح کا درد سارے پیٹ میں محسوس ہوتا ہے۔ پتہ کی سوزش کا درد گردن سے نیچے دونوں کندھوں کے درمیان پھیلی طرف زیادہ شدت سے محسوس ہوتا ہے۔

سرری لگ کر بخار چڑھتا ہے۔ جو کہ عام طور پر آسانی سے اترنے میں نہیں آتا۔ دائیں پسلی کے نیچے درد محسوس ہوتا ہے۔ جس کو دبائے سے اضافہ ہوتا ہے۔ اسی علاقہ میں پسلیوں کے نیچے دبائے سے گولہ سا بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ اسی جگہ لمبا سانس لینے سے درد ہوتا ہے۔ بھوک، ذکار اور ہوا بند ہو جاتے ہیں۔ جس سے شبہ پڑتا ہے کہ جیسے آنٹوں میں بند پڑ گیا ہے یا ان میں کسی چیز نے رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔

پتہ کی یہ سوزش اسے پیپ کی ایک تھیلی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اس پیپ اور سوزش کی وجہ سے سارے جسم میں زہر پھیل کر موت کا باعث بن سکتا ہے۔ صفرا کی نالیاں اور جگر متورم ہو کر بخار اور برقان کا باعث بنتے ہیں۔ پتہ زہر پلا ہو کر اگر پھٹ جائے تو زہر سارے پیٹ میں پھیل جاتا ہے۔ جس سے پیدا ہونے والا PERITONITIS ملک ہوتا ہے۔

## تشخیص

اس بیماری کی زیادہ تر تشخیص علامات اور ان کی شدت کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ بہت کم مریض ایسے ہیں جن کا ایکسرے کرنے پر پتہ میں پتھریاں نظر آئیں اور ایسی شدید صورت حالات میں گولیاں وغیرہ کھلا کر ایکسرے کرنے کا لمبا طریقہ کار آمد نہیں ہوتا۔ الزاسائڈ میں پتہ کی تبدیلی نظر آ سکتی ہیں۔ اگر اس کو کرنے والا سمجھدار ہو تو



بیماری کی تشخیص آسانی سے ممکن ہو سکتی ہے۔

پتہ کی خرابیوں میں خون، پیشاب اور الزاساؤنڈ کی تبدیلیوں کو واضح کرنے کے لئے ہم نے ایک خاتون کی رپورٹیں حاصل کی ہیں۔ جن کو پتہ میں تکلیف کے علاوہ ذیابیطس کی بیماری بھی ہے۔ اور ان کی ضرورت کے مطابق تمام ٹیسٹ کئے گئے۔

## PHYSICAL URINE - EXAMINATION

Colour\_\_\_\_\_Yellow

Sp. Gravity \_\_\_\_\_1030

Turbidity\_\_\_\_\_Yes

Deposit\_\_\_\_\_Slight

## CHEMICAL EXAMINATION

Colour\_\_\_\_\_Yellow

pH\_\_\_\_\_5.0

Sugar\_\_\_\_\_2.2%

Protein\_\_\_\_\_Traces

Blood\_\_\_\_\_Nil

Ketone\_\_\_\_\_Nil

Urobilinogen\_\_\_\_\_Nil

Bilirubin\_\_\_\_\_present

## MICROSCOPIC EXAMINATION

Pus Cells - 3 - 5 HPE

RBCs - NIL - HPE

Epi. Cells - rare - HPE

Crystals\_ \_\_\_\_ few Calcium oxalate/ HPE

Organisms\_ \_\_\_\_ NIL

Misc\_ \_\_\_\_ NIL

اس رپورٹ کے مطابق ان کے پیشاب میں 2.2 فیصدی شکر کے علاوہ گردوں سے آنے والی جہلی بھی معمولی مقدار میں ہے۔ خوروبنی معائنہ پر CAL. OXALATE ملا جس کا مطلب ان کے پیٹ کا خراب ہوتا ہے۔ پیشاب زیادہ گاڑھا اور تیزابیت کی طرف مائل ہے۔

پیشاب میں شکر کی موجودگی کے پیش نظر ان کے خون میں شکر کی مقدار پتہ چلانے کی کوشش کی گئی۔ جن کا جواب یہ ملا۔

Blood glucose per 100cc

FASTING = 160 MG (normal 80 - 120)

### AFTER BREAKFAST

2 1/2 hours after breakfast 280 mg (normal 110 - 180)

خون میں گلوکوس کی مقدار بہت زیادہ رہی۔ دو روز کے بعد ٹیسٹ کروایا گیا۔ تو شکر کی مقدار پتہ کر 290 ملی گرام ہو گئی تھی۔  
پتہ کی کارگزاری مشتبہ تھی۔ اس لئے ان کے خون میں صفرا کی موجودگی معلوم کرنے کا ٹیسٹ کروایا گیا۔

SERUM BILIRUBIN 3.7 mg /100 cc

(NORMAL: 0.2 -- 1.0 mg)

سوزش کا ہونا ظاہر ہو رہا ہے۔ خون کے TLC-DLC کا نتیجہ یہ رہا۔

## HAEMATOLOGY REPORT

Hemoglobin \_\_\_\_\_ 7.2 g/dl  
 Total WBC \_\_\_\_\_ 16000 / cu mm  
 Neutrophils \_\_\_\_\_ 76%  
 Lymphocytes \_\_\_\_\_ 18%  
 Monocytes \_\_\_\_\_ 18%  
 Eosinoph \_\_\_\_\_ 6%  
 Basophils \_\_\_\_\_ 0%  
 BSR \_\_\_\_\_ 30 mm / 1st Hr

No change in blood chemistry

تکلیف کی نوعیت کا پتہ چلانے کے لئے الٹراساؤنڈ کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اگرچہ یہ ٹیسٹ بے ضرر اور آسان ہے۔ لیکن اس کی فیس 300 روپے ہے۔ جو اکثر مریضوں کے لئے بہت زیادہ ہے۔

## ULTRASOUND ABDOMEN

Gall Bladder &	Contracted walls, thickened,
Biliary Passages	Full of multiple small Sized freely mobile stones.
Spleen & liver	Enlarged - fatty extending
Portal System	4 cm below costal margin Spleen slightly enlarged.
Pancreas	N.A.D
Aorta/IVC	N.A.D
Ascites	No Abdominal fluid seen

Kidneys	Both Kidneys Normal in Size and Texture. No Calculi or Hydronephrosis.
Urinary Bladder & Prostate	N.A.D
Uterus	No Pelvic Swelling or Fibroid seen.
INFERENCE	CHRONIC CHOLECYSTITIS.

with multiple stones and fatty liver

اس خاتون کے نتائج سے معلوم ہوا ہے کہ ان کو ڈیائٹس کے علاوہ پتے کی سوزش اور اس کے اندر متعدد چھوٹی چھوٹی پتھریاں ہیں۔ ان کا جگر بڑھ رہا ہے اور اس میں چربی کی تھیں بن چکی ہیں۔

ایسے مریضوں میں خاصی تیاری کے بعد بھی اگر الٹراساؤنڈ کیا جائے تو اکثر پتہ نظر نہیں آتا۔ جب نظر آئے تو وہ پھیلنے کی بجائے سکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی دیواروں کی موٹائی سدرستی کی حالت میں 3 ملی میٹر ہوتی ہے۔ جب کہ اس کیفیت میں وہ 6 ملی میٹر یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔

اس کے ساتھ جگر کا پھیل جانا ایک لازمی نتیجہ ہے۔

پتہ کی بیماریوں کی تشخیص کے لئے ایکمرے کا ایک خاص طریقہ CHOLECYSTOGRAPHY ایک مدت سے مقبول چلا آیا ہے۔ لیکن سوزش کے دوران پتہ دواؤں سے رتھیں نہیں ہوتا۔ اس لئے ایکمرے میں نظر نہیں آتا۔ جب وہ ایکمرے کی فلم میں نظر ہی نہ آئے تو اس کی غیر حاضری کو اگلے معانی دینے درست معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ الٹراساؤنڈ کے ذریعہ پتہ کا معائنہ ایک قابل اعتماد طریقہ ہے۔

خون کی اس رپورٹ میں اہم بات خون کے سفید دانوں یعنی WBC تعداد میں اضافہ اور اس کے ساتھ ہی ان سفید دانوں کی قسم

POLYMORPHONUCLEARS کی شرح میں زیادتی ہے۔ جو شدید سوزش  
ظاہر کرتی ہے

علاج

صحیح علاج یہ ہے کہ تشفی اور بیماری کے حملہ کے فوراً بعد یا دو تین دن کے  
اندہ آپریشن کر کے پتہ نکال دیا جائے۔ کچھ سرجن شدید سوزش کے دوران پتہ نکالنا  
پسند نہیں کرتے ہیں ان کی رائے میں بیماری کا شدید حملہ مزار لیا جائے تو مریض کی  
جسمانی حالت بہتر ہونے کے بعد اطمینان سے آپریشن کیا جائے۔ جہاں تک حالات کا  
تعلق ہے فوری آپریشن بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو یا مریض  
رضامند نہ ہو تو پھر۔

1۔ مریض بستر پر لیٹا رہے۔ ابتدا میں غسل خانے تک جانے کی تکلیف بھی  
برداشت نہ کرے۔ حالت بہتر ہونے پر غسل خانے جاسکتا ہے۔

2۔ اگر تے اور مٹلی ہو تو اس کے بند ہونے تک کھانے پینے کو کچھ بھی نہ  
دیا جائے۔ پانی اور غذا کی کمی کے لئے ورید کے ذریعہ گلوکوس 5% نمک کے  
ساتھ ملا ہوا دیا جائے۔

3۔ درد کے لئے PETHIDINE یا MORPHINE کا ٹیکہ۔ یہ ٹیکے بعد میں مصیبت  
کا باعث بنتے ہیں۔ اس لئے ان کو مجبوری کے بغیر استعمال نہ کیا جائے۔ درد اگر بہت  
زیادہ نہ ہو تو IDRAC-BUSCOPAN یا SPASMO CIBALGIN کی گولیاں  
دی جائیں۔

4۔ سوزش کو روکنے اور اس کے پھیلاؤ کے خلاف جراثیم کش دواؤں کو پوری مقدار  
میں کئی دن تک دیا جائے۔ جیسا کہ ان میں سے کوئی ایک۔

AMPICILLIN 500mg	یا	ہر چھ گھنٹہ بعد
OXYTETRACYCLIN 250 mg	یا	2 گولی چھ گھنٹہ بعد
ERYTHROCIN 500mg	یا	ہر چھ گھنٹہ بعد
GENTAMYCIN 80 mg		گوشت میں ایک ٹیکہ ہر 8 گھنٹہ بعد

ایسی ادویہ کی فرست بڑی لمبی ہے۔ آج کل کے ڈاکٹر جان بوجھ کر منگنی اور فینس ادویہ دے کر مریض کو متاثر کرتے ہیں۔ جس کی بنا اوقات ضرورت ختم ہوتی۔

ایک مریض کو پتہ میں شدید سوزش تھی۔ اس کو ERYTHROCIN سوزش کے لئے اور IDARAC درد کے لئے دیئے گئے۔ دو دنوں میں کلنی افادہ ہو گیا۔ ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ اضافی طور پر کسی سرجن کو بھی دکھالیں۔ تاکہ اگر کسی مرحلہ پر ہات قابو سے نکلنے لگے تو سرجن آپریشن کے لئے تیار ہو۔

افغان سے سرجن صاحب ہمارے ذاتی دوست اور مریض کے بھی خاندانی دوست تھے۔ انہوں نے کمال مرمانی سے فیس بھی نہ لی۔ لیکن مریض کو جس علاج سے دو دن میں فائدہ ہوا اسے تبدیل کر کے اس کی جگہ 180 روپے کا ایک نیکہ صبح شام تجویز کر دیا۔ جب مریض رو بہ صحت ہو رہا تھا تو نسخہ میں تبدیلی کا کوئی جواز نہ تھا۔ انہوں نے اپنی اہمیت واضح کرنے کے لئے 12 روپے روزانہ کی بجائے 400 روپے روزانہ والا نسخہ شروع کر دیا۔

اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے بقیہ علاج طب نبوی سے کیا اور مریض تندرست ہو گیا۔

5۔ ہیٹ پر گرم پانی کی بوتل رکھی جائے۔

6۔ خون کا DLC TLC ہر تیسرے دن کر کے اطمینان کیا جائے کہ سوزش مندرج ہو رہی ہے یا نہیں؟

### مزمن التهاب المرارہ CHRONIC CHOLECYSTITIS

پتہ کی مزمن سوزش عام طور پر پتہ میں پتھری کی مریض عورتوں کو ہوتی ہے۔ اگرچہ مردوں کی قلیل تعداد بھی اس کا شکار ہوتی ہے لیکن متوسط عمر کی موٹی بچوں والی عورتیں اس میں زیادہ جٹا ہوتی ہیں۔ اس لئے پتہ میں پتھری پیدا کرنے والے تمام اسباب اس بیماری کے پیدا کرنے کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ بچے پیدا ہونے سے بیماری کے امکانات میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ عیال دار خواتین جو بسیار خوری کرتی ہیں اور ان کی غذا میں چکنائیاں، گھی، مصالحاں اور پراٹھے شامل ہوتے ہیں۔ ان کو اکثر یہ بیماری ہو

مانع حمل گولیاں کھانے یا نسوانی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہونے والے ہارمون پتہ کو خراب کرتے ہیں۔ ماہرین مانع حمل گولیاں کی وجہ سے دل کی بیماریوں کا بھی شبہ کر رہے ہیں۔ ذیابیطس کی وجہ سے بید کی خرابیاں پتہ کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ لبلبہ کے علاوہ چھوٹی آنت سے غذا کے انجذاب کے مسائل کی وجہ سے صفراوی نمک دوبارہ جذب نہیں ہوتے اور خون میں TRIGLYCERIDES کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور خون کے سرخ زروں کی وہ بیماریاں جن میں HEMOLYSIS ہوتا ہے پتہ میں سوزش پیدا کر سکتے ہیں۔

تپ محرقہ بخار کے دوران اس کے جراثیم پتہ میں گھس جاتے ہیں اور وہاں پر سوزش پیدا کر سکتے ہیں۔

### علامات

بیٹ میں اکثر اوقات بوجھ، اچھڑو یا پیٹ کے وسط میں اوپر کی جانب درد کی سی کیفیت جس کو ڈکار مارنے سے وقتی آرام آتا ہے۔ حالانکہ ڈکار مارنے سے بیٹ میں ہوا کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ڈکار ایک خوش فہمی ہے۔ ورنہ یہ نفع میں اضافہ کرتا ہے۔ بیٹ بھر کر کھانا کھانے، دودھ پینے، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں خاص طور پر فرنی، کھیر، اور کسٹرڈ کھانے سے بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرغن غذاؤں کے بعد درد بڑھتا ہے۔ ایسے واقعات بھی اکثر دیکھنے میں آئے ہیں کہ جب سو جا ہوا پتہ زیادہ مرغن کھانے کے دباؤ کے تحت پھوٹ گیا۔

مکلی اکثر رہتی ہے۔ بیٹ کا درد کبھی دائیں پہلی کے نیچے محسوس ہوتا ہے۔ یہ درد کندھوں کے پیچھے بھی شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ اکثر خواتین کو پتہ کے درد شدید قسم کے قونچی دردوں کی شکل میں ہوتا ہے اور ہر دورہ قیامت بن کر گزرتا ہے۔ ان خواتین میں کوئی پتھری ٹالیوں کے منہ کے اوپر آ جاتی ہے۔ یا ٹالی میں داخل ہو کر اس کو بند کر دیتی ہے۔ اس بندش کی وجہ سے قونچ کے دورے پڑتے ہیں کیونکہ جسم اس پتھر کو باہر نکلانے کی جدوجہد کرتا ہے۔

طرح مفر کے رنگ خون میں شامل ہو کر رقان پیدا کر دیتے ہیں جس کے ساتھ پر ہلکی ہلکی عارض بھی ہوتی ہے۔

قریب جسم کی خواتین کو جب پیٹ میں بوجھ اور نفع رہے دائیں پہلی کے نیچے سے درد شروع ہو کر کندھوں کے درمیان کو جائے۔ کبھی کبھی سردی سے بخار بھی ہو جائے تو اس بیماری کو پتہ کی مزمن سوزش قرار دینا ٹھنڈی کی بات ہے۔ اور اگر اس میں شبہ ہو تو پھر تصدیق یوں کی جاسکتی ہے۔

### تشخیص

مریض کو تنگ کرنے والے معالج ابتدا میں سادہ انکسے کرواتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک ثقہ طریقہ ہے۔ لیکن اس میں پتہ تو بالکل نظر نہیں آتا اور پتھریاں بھی صرف اسی صورت میں نظر آتی ہے جب ان کی ساخت میں کیٹیم کی کافی مقدار شامل ہو اس لئے سادہ انکسے کرنا عام طور پر مریض کو خواہ مخواہ زہر مار کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔

پتہ کی بیماری کی تشخیص کا معقول طریقہ اس کی CHOLECYSTOGRAPHY ہے۔ مریض کو شام کے وقت کچھ گولیاں دی جاتی ہیں۔ سوتے وقت جلاب کی گولیاں دینے کے بعد صبح لہنعا کر کے پیٹ سے ہوا اس غرض سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آنتوں میں ہوا یا غلاعت کی موجودگی میں پتہ انکسے کی فلم میں نظر نہیں آتا۔ ایک دو انکسے لینے کے بعد مریض کو ٹھن کی پچاس گرام کی تکیہ کھائی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک نیا انکسے لیا جاتا ہے۔ اگر پتہ میں سوزش ہو تو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پتہ نظر نہیں آتا اور اس طرح پتہ کی مزمن سوزش کی تشخیص مکمل ہو جاتی ہے۔ پتہ کی بیماری اس کی جسامت اور پتھر کی تشخیص کا یقینی طریقہ آج کل الزاساؤنڈ کی صورت میں میسر ہے۔ SONOGRAPHY کے ذریعہ پوری طرح نظر آتا ہے۔ اس کا ہلنا جلنا دیکھا جاسکتا ہے اگر اس میں پتھر سوزش یا رکاوٹ ہو تو وہ بھی صاف نظر آ جاتی ہے۔



## علاج

اگر ایکس رے میں پتہ نظر آ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوزش اتنی زیادہ نہیں اور مریض کا ادویہ کے ذریعہ علاج کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ مریض اگر کمزور ہو یا آپریشن سے دہشت محسوس کر رہی ہو تو پھر آپریشن نہ کیا جائے۔

حال ہی میں ایک دوائی CHENODEOXYCHOLIC ACID تیار کی گئی ہے۔ جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ پتہ سے سوزش اور پتھریاں نکال دیتی ہے۔ اسی قسم کی ایک اور دوائی URODEOXYCHOLIC ACID کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے 50-70 فیصدی مریضوں کی پتھریاں گل کر نکل جاتی ہیں۔ جب پتھری نکل جائے گی تو پتہ کی سوزش بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ ان ادویہ کو روزانہ 600 ملی گرام کی مقدار میں دیا جاتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ عرصہ علاج 2-3 سال پر محیط ہوتا ہے۔

## آپریشن

عام طور پر آپریشن کر کے پتہ نکال دیا جاتا ہے۔ اب تک کے معالج اس آپریشن کو بہترین علاج قرار دیتے آئے ہیں۔ پتہ نکالنے کے بعد بد ہضمی مستقل کی مصیبت بن جاتی ہے۔ ہاضمہ کی مکسچو، کاسر الیاح سٹوف، DIGESTIVE ENZYMES کی گولیاں زندگی بھر کی رفتی بنتی ہیں۔ دو تین سال کے لئے پچھائی کو اضم کرنا مشکل ہوتا ہے مگر آہستہ آہستہ جسم ان کو قبول کرنے لگتا ہے اور ایک لمبی زندگی گزارا جاسکتی ہے۔

حال ہی میں ENDOSCOPE کی مدد سے آنتوں کے راستے پتہ میں ٹالیاں ڈال کر پتھری کو گھائے والے لوشن براہ راست داخل کرنے کی ترکیب نکالی گئی ہے۔ طریقہ مشکل اور نازک ہے۔ جن ہاتھوں سے ایسے کئی مریض گزرے ہوں شاید وہ یہ عمل چابک دستی سے کر لیتے ہوں ورنہ ایک عام سرجن یہ جان جو حکم کا کام خوش اسلوبی سے سرانجام نہیں دے سکتا۔ آپریشن کے دوران اور اس کے بعد ہونے

والے خطرناک عادات کی کئی نہیں۔ بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ترکیب ابھی ابتدائی مراحل میں ہے اور کسی سرجن کو اپنے جسم پر پریکٹس کا موقع مہیا کرنا اھلندی سے بعید ہے۔

آپریشن کے بعد غذا کی احتیاط کے ساتھ ساتھ وزن کم کرنے کی کوشش مسلسل جاری رکھنی چاہئے۔ ورنہ بلبہ بھی بعد میں متاثر ہو کر خطرناک انجام سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔

### پتہ کا کینسر CANCER OF THE GALL BLADDER

پرانی سوزش اور پتھریوں کی مسلسل خراش کے بعد پتہ کی دیواروں میں کینسر کے خطنے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگایا گیا تھا کہ برطانیہ میں کینسر کے تمام مریضوں میں سے ایک فیصدی کی موت پتہ کے کینسر کی وجہ سے ہوئی۔ پتہ کے علاوہ میں ہونے والے کینسر اگر پتہ میں ہوں تو وہ عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر قریہ خواتین اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ جب کہ جگر سے نکلنے والی صفرا کی نالیوں میں ہونے والا کینسر عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ شریات والوں نے اس سلسلے میں 3:1 کا تناسب بیان کیا ہے۔ جب کہ پتہ کے کینسر کی شکل میں یہ الٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک مرد کو یہ تکلیف ہوگی تو اس کے مقابلے میں تین عورتیں اس کا شکار ہوسکیں۔

خواتین میں پتہ کا کینسر عام طور پر 45 کی عمر کے بعد ہوتا ہے کینسر پیدا ہونے والے صفرا کی نالیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے یہ قان، صفرا کی کئی کی وجہ سے باضمہ کی خرابیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔

### علامات

یہ قان ابتدائی میں ہو جاتا ہے۔ جس کے بعد جگر کے دوران میں رکاوٹ کی وجہ سے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے۔ اکثر مریضوں کو جب یہ قان یا پیٹ میں پانی کی شکایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ عرصہ دراز سے پیٹ میں درد، جلن

اور بد ہضمی کا شکار تھے۔ وہ چکنائی ہضم کرنے میں مشکل محسوس کرتے تھے اور کبھی ڈکاریں کبھی کبھی قوی درد کے دورے پڑتے تھے۔ یہ علامات پتے کی سوزش کی صورت میں تھیں۔ پتہ میں کینسر پیدا ہونے کے بعد درد کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ درد دوروں کی بجائے مسلسل ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تکلیف ہوتی ہے۔ اکثر مریضوں کی بھوک اڑ جاتی ہے۔ بھوک اڑنے یا کینسر کے اپنے ذہریلے اثرات اور بد ہضمی کی وجہ سے مریض کے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ پتہ کا حجم بڑھنے اور اس کے سخت ہونے کی وجہ سے ایک ہوشیار معالج چھاتی اور پیٹ کے اتصال کے وسط میں ہاتھ رکھ کر پتہ کا ابعاد محسوس کر سکتا ہے۔

### تشخیص

عام حالات میں ایسے مریضوں کا ایکسرے کیا جاتا ہے کچھ پتھریاں سادہ ایکسرے میں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ ورنہ دوائیں کھلا کر CHOLECYSTOGRAPHY کی شکل میں ایکسرے کیا جاتا ہے۔ جس میں پھولا ہوا پتہ اس کی متورم دیواریں اور اندر بھرے ہوئے پتھر اکثر نظر آ جاتے ہیں۔ حالانکہ پرانی سوزش والا پتہ اکثر رنگ قبول نہیں کرتا۔ اس لئے ایکسرے کے ذریعہ تشخیص عام طور پر مفید یا ممکن نہیں رہتی۔ ایسے میں الٹراساؤنڈ کے ذریعہ ایک یقینی حقیقت جانی جا سکتی ہے۔ میو ہسپتال ممبئی ایکسرے ڈیپارٹمنٹ میں ایسے درجنوں مریض دیکھے جاتے ہیں وہاں کے ڈاکٹر شیفت احمد صاحب نے پتہ کے کینسر کے ایک مریض کی رپورٹ ہمارے لئے تیار کی جو یوں ہے:

Gall bladder distended with thick walls and full

of stones a complex mass of varied echogenicity.

is visualised in the deformed gall bladder.

Bile ducts are distended.

This is a case of cancer gall bladder

برقان کے ساتھ ساتھ کینسر جگر کو متاثر کر دیتا ہے۔ جس کی علامات جگر کی خرابی سے متعلق اضافی طور پر دیکھی جا سکتی ہیں اور اس مرحلہ پر الٹراساؤنڈ میں جگر کے

کینسر کے مشاہدات سامنے آئیں گے۔ چشماپ میں یرقان کے اثرات کے علاوہ کوئی نئی چیز دیکھنے میں نہیں آتی۔

### علاج

لندن کے سینٹ میری ہسپتال کے سرجن سر نصحوی کوپ نے پتہ کی بیماریوں ان کی تشخیص اور بروقت علاج کے بارے میں قابل قدر انکشافات کئے ہیں۔ ان کی دلچسپی کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ وہ خود پتہ میں پتھریوں کے مریض تھے۔ ان کی رائے میں پتہ جتنی جلدی نکلوا دیا جائے اتنا مفید رہتا ہے کیونکہ اس طرح کینسر پیدا ہونے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔

تازہ ترین معلومات کے مطابق امریکہ میں پتہ کے کینسر کی شرح میں 15 فیصدی کمی واقع ہو گئی ہے۔ کیونکہ وہاں پر رواج بن گیا ہے کہ ڈاکٹر پتہ میں سوزش دیکھتے ہی اسے آپریشن کر کے نکال دیتے ہیں۔ سر نصحوی کو ان کا مشورہ بڑا پسند آیا ہے۔ لیکن برطانیہ ہی سے جدید مشاہدات کے مطابق آپریشن کے بعد پتہ کے کینسر کے سونے سے صرف 2 مریض پانچ سال کے بعد زندہ پائے گئے۔ یعنی 98 فیصدی مریض پتہ نکل جانے کے باوجود تھوڑے ہی دنوں میں ہلاک ہو گئے۔

ہمارے ایک دوست بنکوں کے حسابات چیک کیا کرتے تھے۔ لوگ ان کی خوب خاطر مدارات کرتے تھے۔ ان کو پیٹ میں تکلیف تو رہا کرتی تھی لیکن پتہ کے باب میں کبھی کوئی شکایت نہ سنی گئی۔ ایک مرتبہ ان کو شدید یرقان ہوا۔ معمولی علاج سے جب افاتہ نہ ہوا تو ان کے محکمہ والوں نے ایک پرائیویٹ کلینک میں داخل کروا دیا۔ جہاں الٹراساؤنڈ اور ایکس رے کے ذریعہ تشخیص کر کے پیٹ کھولا گیا۔

آپریشن کرنے پر دیکھا گیا کہ پتہ کا کینسر پھیل کر صفرا کی نالیوں کو بھی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ پتہ نکال دیا گیا۔ نالیاں براہ راست چھوٹی آنت سے منسلک کر دی گئیں۔ ڈاکٹروں نے ان کے لواحقین کو شفیایاب ہونے سے پہلے گھر لے جانے کا مشورہ دیا کیونکہ ان کے خیال میں ان کے ایک ہفتہ

سے زیادہ زندہ رہنے کے امکانات نہ تھے۔

مایوسی کے اس مرحلہ پر ان کا طب نبوی سے علاج کیا گیا۔ چند دنوں میں چلنے پھرنے کے قابل ہوئے۔ پھر ڈیوٹی پر چلے گئے اور ایک سال خوش اسلوبی سے گزر گیا۔ اس دوران پروفیسر مرزا صاحب جیسے اشد سرجن نے دو مرتبہ ان کا معائنہ کیا۔ ٹیسٹ کئے اور جگر کو تندرست قرار دیا۔

وہ اپنے کام کے سلسلہ میں صوبہ سرحد اور شمالی علاقہ جات کی طرف زیادہ جانے لگے۔ جہاں کے لوگوں نے ان کو دنبہ کا گوشت، چربی میں کپکے پائی گوشت اور اعلیٰ قسم کی مرغی غذا میں خوب کھلائیں۔ چھ ماہ بعد پھر برقان ہوا۔ کلینک داخل ہوئے اور چند دن میں وفات پا گئے۔ کیونکہ اس مرحلہ پر طب جدید میں کوئی اور علاج موجود نہ تھا۔

اسی طرح سیالکوٹ میں ایک صاحب بھی پتہ کے سرطان میں مبتلا تھے اور ان کا آپریشن اس لئے اوجھڑا چھوڑ دیا گیا کہ بچنے کے امکانات نہ تھے۔ جب وہ طب نبوی کے علاج سے بستر ہوئے لگے تو کسی دوست نے مشورہ دیا کہ وہ اب کسی سیاسی کا علاج کروائیں۔ سیاسی صاحب نے ان کو سکھایا کا کشتہ دیا۔ جگر پہلے ہی خراب تھا پہلی بیماری کی خطرناک صورت حال سے بچنے کے بعد ایک ان پڑھ معالج کی بے وقوفی ان کی وفات کا باعث بن گئی۔

کینسر کے اندیشہ کی وجہ سے اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپریشن کے نتیجہ میں نکالا جانے والا ہر پتہ لیبارٹری میں بھیجا جائے اور اس کا معائنہ ہو۔ اس کام میں پروفیسر غلام رسول تہنیشی بڑی دسترس رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک مریض کا آپریشن سے نکالا ہوا پتہ دیکھنے کے بعد یہ رپورٹ دی۔

Received a specimen of Gall Bladder.

The gall bladder is markedly distended. Multiple stones are seen inside. The walls of the gall bladder are markedly thickened.

The serosal surface has multiple modules.

## HISTOLOGY

The walls of the gall bladder are invaded by Glands of variable sizes and shapes. These glands are lined by malignant epithelial cells.

This is a case of Adeno-Carcinoma.

پتہ کے اس کیفر کا طب جدید میں ایک ہی علاج ہے کہ مریض کا جتنی جلدی ہو آپریشن کر دیا جائے۔ اگر ابتدا ہی میں آپریشن کر دیا جائے تو چند سالوں تک زندہ رہنے کے 10 فیصدی امکانات موجود ہیں ورنہ یہ بیماری جان لیوا ہے۔

پتہ کی سوزش اور پتھریوں کے بارے میں جو علاج بیان کئے گئے ہیں وہی اس بیماری میں کافی ہوتے ہیں۔ یہ بات دعوے سے تو بہر حال نہیں کی جاسکتی کہ ہر مریض شفا یاب ہو گا۔ زندگی، موت اور شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ البتہ کوشش کرنے کی گنجائش موجود ہے اور ہمارے درجنوں مریض پانچ سال گزرنے کے بعد بھی بفضلہ زندہ موجود ہیں۔

## طب نبوی

پتہ کی بیماریوں کی نوعیت اور علاج میں یہ امر واضح ہو گیا ہو گا کہ طب جدید میں اس حصہ جسم کی کسی بھی بیماری کا شافی علاج موجود نہیں۔ شدید سوزش کے دوران 'قے' بد ہضمی اور معدہ کی سوزش اور بخار درد کا علامات کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔ جب کہ پتھری اور مزمن سوزش کے لئے درد دور کرنے والی ادویہ کے علاوہ اور کوئی حل موجود نہیں۔ پتہ کی ہر بیماری کا علاج آپریشن ہے۔

جن لوگوں کا پتہ نکالا جا چکا ہے۔ وہ عمر بھر بد ہضمی کا شکار رہتے ہیں۔ وہ چکنا چنیاں ہضم نہیں کر سکتے۔ کچھ عرصہ قبل ہسپتالوں میں بد ہضمی کے مریضوں کے لئے لال

کمپر بنا کرتی تھی۔ اس میں موجود الائیچی اور سونف کی وجہ سے کچھ ریاح نکل جاتی تھیں اور مریض کو قدرے آرام آ جاتا تھا۔ اب لے دے کہ ایسے ENZYME بازار میں ملتے ہیں جن کا کھانا عذاب اور نہ کھائیں تو دودھرا عذاب اس لئے حالات کا تقاضا ہے کہ جدید علاج کی بجائے دوسرے علاج آزمائے جائیں۔ اگر خدا نخواستہ فائدہ نہ ہوا تو پھر آپریشن پر غور کرنا مناسب ہو سکتا ہے۔

بچہ میں پتھری کے اسباب کے ذکر میں جو اہم مسئلہ پیدا ہوا وہ جسم میں چکنائیوں کا سوء ہضم تھا۔ جب غذا میں چکنائیوں کی مقدار زیادہ ہوگی یا وہ کسی وجہ سے ہضم نہ ہو رہی ہوں یا جسم ان کو قبول کرنے کے بعد ٹھیک سے استعمال نہ کر سکا ہو تو پتھریاں بنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی والی روٹی یا سالن میں بھی علیحدہ سے سچی والے والا کام کبھی کبھار کیا ہے۔ ورنہ انہوں نے ہمیشہ جو کی روٹی کے ساتھ سالن کے طور پر سرکہ یا کھجوریں یا کدو یا پانی ملا دودھ استعمال فرمایا۔ ان میں سے اکثر میں کوئی چکنائی نہیں اور دودھ میں اگر چکنائی ہے بھی تو اسے پانی میں ڈال کر کم کر دیا گیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو بھی چکنائی سے پیدا ہونے والی کوئی بیماری کبھی لاحق نہ ہوئی۔

انجیر

اللہ تعالیٰ نے اس پھل کو اتنی اہمیت عطا فرمائی کہ قرآن مجید میں اس کے نام پر ایک سورت نازل فرمائی جس کی ابتدا میں صاحب کائنات نے انجیر کی قسم کھائی۔ حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس چیز کا اہم ہونا ضروری ہے۔ قسم کھانے کے لئے اس کا انتخاب اس کی افادیت کی طرف اشارہ ہے۔ لوگوں نے اسے نہار منہ کھایا۔ کھانے سے پہلے استعمال کیا اور بعد میں تجویز کی۔ ان تینوں صورتوں میں یہ الگ الگ فوائد کا منبع ہے۔ نہار منہ کھانے سے خون کی ٹالیوں میں اور پتے کی ٹالیوں سے پتھریاں اور مدے نکالتی ہے۔

ہمارے اس مسئلہ میں انجیر کو کھانے کے بعد کھائیں تو یہ خوراک کو ہضم کر دے گی اور اس طرح چکنائیوں یا دوسرے اسباب سے سوء ہضم پیدا ہونے کا کوئی احتمال نہ

رہے گا۔ انجیر پتے کی سوزش اور پتھری کے خلاف سب سے بڑی پیش بندی ہے۔ کیونکہ اسے کھانے کے دوران وہاں پر چکناہٹوں کے ہضم میں نہ تو کوئی گڑبڑ ہوگی اور نہ ہی کویسٹول کی کوئی مقدار جسم میں جا کر خون کی ٹالیوں پر جم کر دل کے دورے کا باعث بنے گی اور نہ یہ جگر سے نکل کر پتھریاں بنائے گی۔

اطباء قدیم میں سے ابن البیطار اور اکبر ارزانی نے پتے کی پتھری کو توڑنے کے لئے انجیر تجویز کی ہے۔ ان کا یہ نسخہ مرض کی مابینیت کے مطابق درست اور تجربات سے ہمیشہ مفید پایا گیا۔

جو کا دلایا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے جملہ امراض کے لئے جو کا دلایا جس میں دودھ اور شہد ملایا گیا ہو تجویز فرمایا ہے۔ پیٹ کی بیماریوں میں اس کی افادیت متعدد مقامات پر ذکر کی جا چکی ہے۔ پتے کی بیماریوں خاص طور پر پتھری کے لئے اس کی افادیت منفرد ہے۔ ہم نے ذاتی طور پر درجنوں ایسے مریضوں کے علاج کے لئے جو کا دلایا دیا۔ اس دوا سے پیٹ کی سوزش جاتی رہی۔ معدہ میں التھاب اور تیزابیت نہ رہی۔ یہ دوا پیٹ سے ہوا نکال دیتا ہے۔ صفرا کو خارج کرتا ہے۔ چونکہ اس میں چکناہٹ نہیں ہوتی اس لئے اسے ہر کیفیت میں اور خاص طور پر ان مریضوں میں جن کو معدہ میں جلن کی وجہ سے تپتی ہوئی ہو فائدہ دیتا ہے۔ جو کا دلایا پیشاب آور ہے۔ پتے کے مریضوں کے لئے یہ دوا از حد مفید ہے۔ یہ خون کی کویسٹول کو کم کر دیتا ہے۔

زیتون کا تیل

پتے کی بیماریوں کو پیدا کرنے میں چکناہٹوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ بیمار ہونے کے بعد مریض غذا میں چکناہٹ کی موجودگی اس کی بیماری میں اضافہ کا باعث ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں کوئی ایسی چیز جو بذات خود چکناہٹ ہو سے بیماری میں اضافہ کا امکان موجود رہتا ہے۔ اس بنیادی اصول کی صداقت کے باوجود اطباء قدیم نے زیتون کا تیل استعمال کیا ہے۔ حکیم یحییٰ النقی خان اس کے بڑے معترف تھے۔



زیتون کا تیل پتہ کو سکھ کر اس کے صغرا کو باہر نکال ہے۔ اس عمل میں کئی چھوٹی پتھریاں باہر نکل جاتی ہیں۔

حکیم نجم الغنی خاں، حکیم اکبر ارزانی اور دوسرے ماہرین طب پتہ سے پتھری نکالنے کے لئے زیادہ مقدار میں زیتون کا تیل پلانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ایک نسخہ کے مطابق 9 اونس زیتون کا تیل مریض کو پلایا جائے تو پتھریاں نکل جاتی ہیں۔

دواخانہ نورالدین میں زیادہ طور پر خواتین کا علاج ہوتا ہے۔ وہاں پر پتہ کی مریض خواتین کو براہ مندل سرخ اور سونف کے ساتھ کاسنی کے چج ملا کر ان کا جوشاندہ شربت بنفشہ کے ساتھ تجویز کیا جاتا ہے اور مریض کو کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے 3 اونس زیتون کا تیل ہر تیسرے دن دیا جاتا ہے۔ عام طور پر پتہ کی پتھریاں نکل جاتی ہیں۔

اطباء قدیم نے پتہ کے سدے دور کرنے کے لئے سرکہ بھی مفید قرار دیا ہے۔ بو علی سینا کے ایک نسخہ کے مطابق انجیر کو سرکہ میں بھگو کر کھلایا جائے تو پتہ کے مسائل جلد حل ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونچی کی تعریف فرمائی۔ اطباء اسے پتہ کی پتھری نکالنے والی قرار دیتے ہیں۔

ان مشاہدات کی روشنی میں پتہ کی پتھری نکالنے کے لئے یہ نسخہ استعمال کیا گیا۔  
1- صبح نہار منہ بڑا چھچھہ شہد ابلے پانی میں۔

2- ناش میں جو کا دلیا پانی میں پکانے کے بعد تھوڑا سا دودھ ڈال کر اور چینی کی بجائے شہد ڈال کر۔

3- اگر پتہ میں سوزش نہ ہو تو۔

کلونچی 2 گرام

کاسنی کے چج 1 گرام

ڈیس کر صبح شام کھانے کے بعد۔ اگر ایک ہفتہ میں فرق محسوس نہ ہو تو کلونچی کی مقدار 3 گرام کر دی جاتی ہے۔

4- مریض کو اگر پتہ میں مزمن سوزش بھی ہو تو۔

20 گرام	قط شیریں
30 گرام	کلوئی
10 گرام	کاسنی کے بیج

چھوٹا چچہ صبح شام کھانے کے بعد

شدید سوزش کے دوران جدید طریقہ علاج کے مطابق ابتدا کی جاتی ہے۔ بہتر ہونے کے بعد بالائی علاج شروع کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ طب جدید میں پتہ کی بیماریوں کا آپریشن کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔

## پیٹ کے کیرے

### INTESTINAL WORMS (HELEMENTHIASIS)

#### HOOK WORM کک ورم

اس خاندان کے کیرے بنیادی طور پر بھیڑ بکریوں، گائے بھینسوں اور گھوڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ کھیتی باڑی کرنے اور جانور رکھنے والوں کو اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ جب کہ کتوں اور بلیوں میں بھی ان کی ایک قسم ANKYLOSTOMA CANINUM پائی جاتی ہے۔ جو عام طور پر انسانوں کی سنتوں میں داخل نہیں ہوتی۔ لیکن وہ لوگ جو کتے بلیاں اپنے بستروں میں سلاتے ہیں ان کی جلد میں جانوروں پر چلنے والے کیرے سوراخ ڈال کر ان کے بچے جسم میں داخل ہو کر بیماری پیدا کر سکتے ہیں۔ انسانوں میں ان کی دو اقسام زیادہ طور پر دیکھنے میں آتی ہیں۔

NEGATOR AMERICANUS-ANKYLOSTOMA DUODENALE کے

اسلوب اور اذیت رسانی تقریباً یکساں ہیں چونکہ یہ اپنے منہ کو آنتوں کی جھلیوں میں پھنسا کر وہاں سے خوراک حاصل کرتے ہیں اس لئے ان کو کھوئی والے کیرے کہا جاتا ہے۔ یہ کیرے امریکہ کے استوائی علاقوں میں سارا سال سرگرم عمل رہتے ہیں۔ جب کہ دوسرا ANKYLOSTOMA سرد ملکوں میں یا موسم سرما میں زیادہ پھلتا پھوٹتا ہے۔

کسانوں اور غلاظت میں لپٹے والوں یا ننگے پیر پھرنے والوں کے جسم میں ان کیڑوں کے خلاف کسی حد تک قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ امریکہ کے سفید فام باشندوں کے پیٹ میں یہ کیڑے داخل ہوتے ہیں تو ان کو سیاہ فاموں کی نسبت زیادہ تکلیف ہوتی ہے

مرض کی شدت کا انحصار مریض کی خوراک میں فولاد کی مقدار پر منحصر ہے۔ کیونکہ ان کیڑوں کو اپنے میزبان سے جتنی اچھی غذا ملتی ہے اسی تناسب سے یہ بھلتے پھولتے اور زیادہ انڈے دیتے ہیں۔ بنگلہ دیش، بھارتی بنگال اور جنوبی امریکہ کے ملک پورٹوریکو میں مریضوں کے پاخانہ سے اوسط مرد مریضوں میں 4000 انڈے روزانہ دیکھے گئے جب کہ عورتوں میں یہ تعداد نصف ہوتی ہے اس کے مقابلے میں افریقی عوام کی غذا میں چونکہ فولاد زیادہ ہوتا ہے اس لئے ان کے پاخانہ میں انڈوں کی تعداد 20,000 سے زائد پائی جاتی ہے۔

اس بیماری کی اہم ترین خصوصیت خون کی کمی ہے۔ لیکن اب یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ خون کو براہ راست تلف نہیں کرتے۔ ان کا طریقہ واردات پیچیدہ ہے سب سے پہلے یہ خون میں پائی جانے والی لمبیات کو کھا جاتے ہیں۔ جس سے جسم میں کمزوری اور خفاہت پیدا ہوتے ہیں۔ اور انہی کی بدولت بچوں کے جسم غیر متناسب ان کے چروں اور پیروں پر درم نظر آتا ہے۔ کیونکہ خون کی البیومن جب کم ہوتی ہے تو ہجر کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ بیوں میں یہ صورت حال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب خون کی کمی اتنی ہو جائے کہ خون میں ہموگلوبین کی مقدار 5 گرام رہ جائے۔

کیڑے جب چھوٹی آنت میں سوراخ کر کے اس کی دیواروں میں گھستے ہیں تو وہاں پر ایسی علامات پیدا کرتے ہیں جیسی کہ پیٹ کے الیومن دیکھی جاتی ہیں اضافہ میں اس سال اور چھاب میں پیپ کے ساتھ البیومن ملتے ہیں۔

ایک عام کیڑا 15 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ان کے مرجانے کے بعد نئے کیڑے حملہ آور اس لئے نہیں ہوتے کہ اس عرصہ میں جسم میں ان کے خلاف ایک خاص قسم کا دفاعی ہمدردیست مرتب ہو جاتا ہے۔ لیکن مریض کا جلد علاج ہو جانے کی

صورت میں اگر گندے ماحول میں بدستور رہائش رہے تو کیزے جسم میں داخل ہو کر نئی بیماری پیدا کر سکتے ہیں۔

### علامات

تنگے پاؤں پھرنے والوں کے ٹکڑے کے اندر کی طرف سے سچر پر جلنے والے جو معمولی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اس راستہ کا پتہ دیتے ہیں جس سے کیزے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔

معدہ میں شدید درد۔ اسہال جس میں لیس وار اور تھوڑا سا خون پیٹ بڑھنے لگتا ہے۔ جلد خشک پال خشک اور گرنے لگتے ہیں۔ زبان سبلی، بچے کو مٹی کھانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ مٹی کھانے سے کیزے پیٹ میں جاتے ہیں۔ لیکن کیزوں کی وجہ سے بھی مٹی کھائی جاتی ہے۔ خوراک ہضم نہیں ہوتی۔ خون کی کمی کی ساری علامات پیدا ہوتی ہیں۔

### تشخیص

کیزوں کی یہ صنف عام حالات میں چونکہ زیادہ انڈے دیتی ہے۔ اس لئے مریض کے پاخانہ کو ٹیسٹ کرنے پر کیزے نظر نہ آئیں تو لیبارٹری والے ٹمک کے پانی میں انڈوں کو تیرانے کی ترکیب استعمال کرتے ہیں جسے (FLOATATION METHOD) کہتے ہیں۔

مریض کا علاج کرنے کے بعد 3 ماہ تک پاخانہ ہر ماہ ٹیسٹ کر کے یہ اطمینان کر لیا جائے کہ تمام کیزے خارج ہو گئے ہیں ورنہ علاج کا ایک کورس مزید دیا جائے

### علاج

اس بیماری میں اہم بات خون اور لحمیات کی کمی سے پیدا ہونے والے مسائل ہیں ایک عام معالج یہی توقع کرے گا کہ وہ پہلے کیزے نکال دے اور اس کے بعد خون کی کمی اور دوسرے مسئلے نپٹائے۔ خون کی کمی کے لئے پرانے استاد خون کی بوتل

چڑھایا کرتے تھے۔ تجربات اور مشاہدات سے معلوم ہوا ہے کہ ایسے کسی مریض کو خون کی بوتل چڑھانے سے دل پر بدترین اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسے مریضوں کو خون دینا نہایت معقول بات رہی ہے۔ خون کی کمی ہونے کے ساتھ ساتھ لمبیات کی کمی بھی اس بوتل سے دور ہو جاتی۔ لیکن جس کو بھی بوتل دی گئی بعد میں اس کے دل کی دائیں طرف بے کار ہو گئی۔ اس لئے مریض کو نہ تو خون دیا جائے اور نہ ہی گلوکوس چڑھایا جائے بلکہ ابتدا میں کیزے مارنے کی بھی کوئی کوشش نہ کی جائے۔ تدریجی علاج یوں کیا جائے۔

1- مریض کے خون کی مقدار کو برعکس پر ابتدائی توجہ دی جائے۔ اس غرض کے لئے فولاد کے ایسے ٹیکے بھی موجود ہیں جو درید میں لگتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو گوشت میں لگائے جاتے ہیں۔ ان دونوں کا استعمال خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ اس لئے خون کی کمی کا علاج فولاد کے ایسے مرکبات سے کیا جائے جو تھنوں میں خراش پیدا نہ کریں جیسے کہ FERODIN-FERONICUM کے شربت۔ اب ماہرین کہتے ہیں کہ فولاد کی نسبت FOLIC-ACID زیادہ ضروری ہے جیسے FOLVITE فولاد کے مرکبات۔ بخنی وغیرہ دے کر جب خون میں ہیموگلوبن کی مقدار 8 گرام سے بڑھ جائے تو پھر کیزے مار ادویہ دی جائیں۔

2- MEBENDAZOLE کی متعدد اچھی شکلیں بازار میں موجود ہیں جیسے کہ MEBENDA CONQUER وغیرہ۔ ان کی 100 ملی گرام کی مقدار (خواہ وہ شربت ہو یا گولی) صبح، شام، تین دن دی جائے۔ عام حالات میں بچوں کے لئے مقدار میں کمی کرنی ضروری نہیں۔

3 PYRENTAL کے روزانہ 600 ملی گرام تین دن تک دیئے جائیں عام طور پر یہ COMBANTREN کے نام سے ملتی ہے۔ بچوں کے لئے مقدار عمر کے مطابق کم کی جائے۔

4- ALBENDAZOLE کی عام ملنے والی شکل ZENTEL ہے۔ اس کے 400 ملی گرام دو سال سے اوپر ہر عمر والے کو ایک مرتبہ دیئے جائیں۔ بعد میں پانچواں ٹیسٹ

کرنے پر پھر بھی کیڑے موجود ہوں تو یہی دوائی ایک ماہ کے بعد دوبارہ دے دیں یا دیگر ادویہ میں سے کوئی منتخب کر لی جائے۔

کیڑے نکل جانے کے بعد مریض کی حالت کی بحالی کا کام آہستہ آہستہ شروع کیا جائے۔ جن میں دوائیں کم اور غذا پر زیادہ انحصار کیا جائے۔ گوشت 'تیرہ' بخنی (گھر گائے کا نہ ہو) اضافی مسائل کو حل کر دیں گے۔ اکثر مریضوں کو صبح ناشتہ میں خیری روٹی کے ساتھ گھر کے بنے ہوئے شاہی کباب دیئے گئے بڑے مفید اثرات دیکھے گئے۔ لمبیت کی کمی کے لئے COMPLAN کا اضافہ کیا جاسکتا ہے۔

### کچھوے ROUND WORM

#### ASCARIS-LUMBRICOIDES

پیٹ میں پائے جانے والے طفیلی کیڑوں میں ہمارے ملک میں یہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ فصل میں عام کچھوے کی مانند ہوتے ہیں۔ ہلکے پیلے رنگ کے یہ پتلے اور لمبے فٹ بھر تک لمبے ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھار پاخانہ کے ساتھ اس کے گچھے باہر نکلتے ہیں۔ ورنہ ایک عام بچے کے پیٹ سے ایک آدھ کیڑا خارج ہوتا ہے تو بچہ اسے سانپ سمجھ کر پیچھنے لگتا ہے۔

مریض کے پیٹ سے ان کے انڈے خارج ہوتے ہیں جن کو ہم آسانی سے دیکھ سکتے تو نہیں لیکن ان پر مرفی کے انڈے کی مانند سخت غلاف ہوتا ہے۔ جن سے دو تین ہفتوں میں بچہ نکلتا ہے۔ انڈے پاخانے میں نکلتے ہیں جب کہیاں ان پر ٹپکتی ہیں تو وہاں سے یہ انڈے لے کر دوسروں کی خوراک میں داخل کر دیتی ہیں۔ اس خوراک کو کھانے والے کے پیٹ میں جا کر انڈوں سے بچے نکلتے ہیں یا ننھے بچے بڑے ہو کر دیال جان بن جاتے ہیں۔

جسم میں جانے کے بعد ان کا ایک لمبا سفر ہے جن میں آنٹوں سے ہتھکڑوں میں جا کر پھر سے طلق کے راستے آنٹوں میں واپس آ جاتے ہیں۔

جگر بڑھ جاتا ہے اگر کیزوں کی تعداد بہت زیادہ ہو تو وہ بڑھنے کے ساتھ درد بھی کرتا ہے۔ ~~بھینٹوں~~ میں جانے کی وجہ سے شدید کھانسی، سانس میں رکاوٹ، دمہ کی مانند سانس میں آوازیں، نمونیہ اور تھوک میں خون بھی آ سکتا ہے۔ بخار بھی ہو سکتا ہے۔ تھوک کے خوردبینی معائنہ پر ان کا پتہ چل سکتا ہے۔

انترپوں کی جانب واپسی کے سفر میں یہ خارش اور پیٹ میں عمومی درد پیدا کرتے ہیں۔ پیٹ میں توڑ، کبھی آنتوں کی دیواروں میں سوراخ بھی ہو سکتا ہے۔ پیٹ میں بوجھ کی کیفیت کے ساتھ خوراک کے جذب ہونے کا پورا عمل متاثر ہوتا ہے۔ انترپوں میں کھلنے والی ٹالیوں میں جا کر یہ ان کا منہ بند کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ پتہ اور بلب کی ٹالیاں یا اینڈکس کا راستہ۔ جس کی وجہ سے ان میں سے کسی ایک کی سوزش ہو سکتی ہے۔ پتہ کی وجہ سے برقان۔ وہ کیزے جو ان ٹالیوں کے راستہ جگر میں جاتے ہیں وہاں ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان کی لاشیں وہاں پر پھوڑا بنانے کی ابتدا کر دیتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ معدے میں چلے جاتے ہیں جہاں سے یہ تے کی مدد سے باہر نکل جاتے ہیں۔

### علاج

جدید ادویہ میں سے NOCARIS بڑی مفید پائی گئی ہے اس کی 150 فی گرام کی صرف ایک خوراک تمام کیزے مار دیتی ہے۔ اس دوائی کی وجہ سے مٹی، پیٹ درد، چکر اور بھوک ختم ہو سکتے ہیں جو کہ اکثر عارضی ہوتے ہیں۔

دوسری مفید دوائی PYRANTEL (COMBANTREN) ہے بیوں کو اس کی 750 گرام کی ایک خوراک کافی رہتی ہے۔ پاکستانی ماہرین 15 دن کے بعد ان کی ایک خوراک دینا پسند کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ لوگوں نے ZENTEL اور VERMOX کو بھی پسند کیا ہے۔ اور ان کو ایک مرتبہ دینا کافی سمجھا ہے۔



## فیتے والے کیڑے — TAPEWORM

اس طفیلی کیڑوں کی دو اہم قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو زیادہ تر گائے اور بھیڑیوں کے گوشت میں ملتی ہے۔ TENIA SAGINATA ہے۔ انسانوں کو بیمار کرنے والی قسموں میں یہی سب سے زیادہ نظر آتی ہے۔ جب کہ سور کے گوشت میں TENIA SOLIUM ہوتی ہے۔ ان جانوروں کا گوشت کھانے سے یہ کیڑے انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں۔

گوشت میں ان کیڑوں کو موجودگی کا عام طور پر پتہ نہیں چلتا۔ 1936ء میں جرمنی نے ارجنٹائن سے سور کے گوشت کی خرید کے معاہدہ میں اضافی رقم اس لئے ادا کی کہ وہ ترسیل سے پہلے گوشت کے ہر ٹکڑے کا ضعیف معائنہ کر کے کیڑوں والا گوشت علیحدہ کر لیں گے۔ اضافی قیمت اور تمام جدوجہد کے باوجود ایسے گوشت سے کیڑوں کی بیماری حاصل کرنے والوں کی تعداد میں کوئی کمی نہ آئی۔

گائے کے گوشت میں موجود کیڑے بڑے ہوں تو کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں۔ جب کہ ان کے انڈے یا بچے خوردبین کے بغیر نظر نہیں آتے۔ جب کوئی شخص ایسی گائے کا گوشت کھاتا ہے تو جسم کے اندر جانے کے بعد اس کے انڈے یا بچوں کی تمثیلی چھوٹی آنت کے حصہ JUJENUM میں جا کر وہاں کی جھلی میں اپنا سر چنسا کر چپک جاتا ہے۔ تین ماہ میں اس کی جسمانی تکمیل ہو جاتی ہے۔ جو ان کیڑے کے سرے میں چوسنے والے آلات لگے جتے ہیں جسے SCOLEX کہتے ہیں۔ اس سے فیتے کی طرح ایک لمبا جسم برآمد ہوتا ہے۔ جس کے چھوٹے چھوٹے خائے نما ٹکڑے ہوتے ہیں اگر اس کا سارا جسم بھی کٹ کر علیحدہ کر دیا جائے تب بھی سر سے ایک نیا جسم اگ آتا ہے ہر خائے کا رقبہ 10x13 ملی میٹر ہوتا ہے۔ گائے بھینسوں کے علاوہ اس کی ایک قسم DIPHYLLOBOOTHRIUM LATUM مچھلیوں میں پائی جاتی ہے۔ اکثر جانوروں میں ایک وقت میں ایک کیڑا ہوتا ہے جب کہ مختلف اوقات میں 4-5 بھی دیکھے گئے ہیں۔

## علامات

اس کی موجودگی کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اس کے جسم کے کھڑے کٹ کر باہر نکلتے ہیں۔

مریض کی بھوک روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے۔ مگر اس کے باوجود وزن کم ہوتا رہتا ہے۔ کیونکہ اس کا کھانا کھیرا کھا جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اور آنٹوں پر ہاتھ رکھیں تو ان میں گڑگڑاہٹ محسوس ہوتی ہے۔

اسلام نے سور کے گوشت کو مطلقاً حرام قرار دے کر مسلمانوں کو TENIA SOLIUM سے پیدا ہونے والے مسائل سے بچا لیا۔ یہ کیزا جسم میں داخل ہونے کے بعد آنٹوں پر قناعت نہیں کرتا۔ بلکہ وہاں سے سوراخ بنا کر خون کے راستے گوشت میں چلا جاتا ہے۔ اگر کسی جوز میں جا کر بیٹھ جائے تو وہاں پر شدید قسم کی سوزش واقع ہوتی ہے۔ اور اگر گوشت میں ہو تو جلد کے نیچے مڑ کے دانے کی طرح کے سخت ابھار محسوس کئے جا سکتے ہیں یہ ممکن ہے کہ ان کا کوئی بچہ دماغ کی طرف بھی جا نکلے۔ اس صورت میں فالج کی بعض اقسام کے علاوہ مرگی کے دورے بھی پڑ سکتے ہیں۔

گوشت میں جا کر یہ کیزے اپنے ارد گرد حفاظتی دیوار بنا سکتے ہیں۔ جس کی وجہ سے کوئی بھی دوائی ان پر اثر انداز نہیں ہوتی اسے CYSTICERCOSIS کہتے ہیں۔ اس مرحلہ پر بخار، سر درد، جسم پر خارش، 'ق'، 'مٹی'، چکر اور پیٹ درد عام علامات ہیں۔

## علاج

TENIA SAGINATA صرف آنٹوں میں رہتا ہے۔ اس کا علاج نسبتاً آسان ہے۔ (YOMESAN) NICLOSAMIDE کے 2 گرام کی گولیاں ہمارے منہ چبا کر کھائی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد پانی کا گلاس پی کر مریض تین گھنٹے تک بھوکا رہتا ہے۔ اگر چند گھنٹوں کے بعد کیزے کے جسم کے ٹکڑے نہ نکلیں تو مریض کو

جواب دیا جاتا ہے۔ NOCARIS بھی مفید دوائی ہے۔

PARZQUANTEL ایک مفید دوائی ہے۔ ایک عام آدمی کے لئے اس کی اوسط خوراک تقریباً 400 mg ہفتی ہے صبح ہلکے ناشتہ کے بعد ایک ہی مرتبہ دے دی جاتی ہے۔ بعض لوگ چند دن کے بعد کی مقدار دوبارہ دینا پسند کرتے ہیں۔

اس کے علاج میں اہم ترین بات یہ ہے کہ ان کیڑوں کا کوئی علاج اس وقت تک یقینی اور موثر قرار نہیں دیا جاسکتا جب تک کیڑے کا سر جسم سے خارج نہ ہو جائے اس لئے یہ ضروری ہے کہ دوائی دینے کے بعد مریض کے پاخانہ کو باقاعدہ دیکھا جائے اگر اس میں سر نکلا ہوا نظر آجائے تو مریض کو تندرست قرار دیا جاسکتا ہے۔ جب تک سر باہر نہ نکلے 25 - 15 دن کے وقفہ پر دوائی دی جائے۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ ہر تین ماہ کے بعد پاخانہ کا معائنہ کروایا جائے۔ اگر اس میں کیڑے کے ٹکڑے موجود ہوں تو مریض شفا یاب نہیں ہوا۔ لیکن یہ طریقہ بھی اس صورت میں قابل اعتماد ہے جب مریض آئندہ کے لئے گندی چیزوں سے پرہیز کرے۔

اسلام نے گوشت کے ذریعہ پھیلنے والی ان بیماریوں کی نہایت شاندار پیش بندی کی ہے۔ سور کے گوشت میں کیڑوں کے مرکز ہر جگہ ہو سکتے ہیں۔ وہ بیضہ سے لے کر دل کی بیماریوں تک کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس لئے اسے حرام کر دیا گیا گائے کے گوشت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

عليكم بالبان البقر فانها دواء واسمانها فانها شفاء واما كم و  
لعومها داء

(ابن السنی، ابو نعیم، مستدرک الحاکم)

”تمہارے فائدے کے لئے گائے کا دودھ ہے۔ کیونکہ یہ دودھ اور

اس کا مکھن مفید دوائیں ہیں۔ البتہ اس کے گوشت میں بیماری ہے اس سے بچو)

اس حدیث مبارکہ میں گائے کے دودھ اور مکھن کو مفید قرار دینے کے بعد واضح

فرمایا گیا ہے کہ اس کے گوشت میں بیماری ہے۔ اسی موضوع پر حضرت علیؓ کے بت  
عمرؓ روایت فرماتی ہیں۔

البان البقر شفاء و سمنها دواء و لحومها داء

(طبرانی)

اگائے کے دودھ میں شفا ہے۔ اس کا مکھن مفید دوائی ہے۔ لیکن  
اس کا گوشت بیماری کا ذریعہ ہے)

ان دو قسم کے کیڑوں کو آنتوں میں کئی طریقوں سے ہلاک کیا جاسکتا ہے مگر جب  
یہ وہاں سے سرنگ لگا کر گوشت میں چلے جائیں تو پھر کوئی دوائی وہاں پر اثر انداز نہیں  
ہو سکتی۔ کسی زمانے میں HETEREZAN کی شہرت تھی کہ وہ گوشت میں پائے  
جانے والے ان کیڑوں کو ختم کر سکتی ہے۔ مگر طویل تجربات نے اس کی تائید نہیں  
کی۔

### چوسنے ENTEROBUIS VERMICULARIS (THREAD WORMS)

انسانوں کو تنگ کرنے والے کیڑوں میں یہ سب سے زیادہ ملتے ہیں۔ حسب  
معمول ان کے انڈے یا بچے گندی غذا کے راستہ انسانوں کے پیٹ میں داخل ہوتے  
ہیں۔ انڈے چھوٹی آنت میں جا کر بار آور ہوتے ہیں۔ ان سے بچے نکل کر بڑی آنت  
کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جہاں پر یہ آنتوں کی بھیلیوں سے اپنی خوراک حاصل کرتے  
ہیں۔ ان کا رنگ گہرا موتیا ہوتا ہے۔ اور ترکی لمبائی 5-2 ملی میٹر جب کہ مادہ زیادہ  
بسی 13-8 ملی میٹر تک طویل ہو سکتی ہے۔

آنتوں میں سکونت اختیار کرنے کے بعد یہ آخری سرے پر چلے جاتے ہیں۔ مادہ  
پاخائے والی جگہ کے حس پاس بلکہ بعض اوقات خواتین کے اندام نہانی کے ارد گرد  
اندھی دیتی ہے۔ انڈوں سے بچے نکل کر رات کو جب گھومتے پھرتے ہیں تو بچوں کو  
شدہ خارش ہوتی ہے۔

## علامت

ان کی پیٹ میں موجودگی عام طور پر کمزوری کے علاوہ کسی اور علامت کو پیدا نہیں کرتی لیکن ان کے بچے اوجھڑا اور گھومنے میں شدید مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ معمولی خارش سے لے کر بچیوں میں اندام نہانی کی سوزش بلکہ وہاں سے رحم کی سوزش یا ENDOMETRITIS بھی ہو سکتا ہے۔ مقعد سے باہر نکل کر پیٹ کی جھلیوں میں جا کر وہاں PERITONITIS ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی جسم ان کو غیر متعلقہ جگہ پر پا کر ان کے ارد گرد دیوار بنا کر ان کی خباثت کو محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر مسہ بن جاتا ہے۔

یہ آوارہ گرد پیشاب کی نالیوں میں داخل ہو کر وہاں پر رکاوٹ کے ساتھ نالیوں اور گردوں میں زخم بنا سکتے ہیں۔

## تشخیص

جس بچے کو رات میں خارش ہوتی ہو اور کیڑوں کا اندیشہ موجود ہو اس کی مقعد پر رات کو سکاچ ٹیپ لگا دیں۔ صبح جب وہ ADHESIVE TAPE اتاری جائے گی تو اس کے ساتھ چوٹوں کے اٹھنے یا بچے چپکے ہوں گے جن کا خوردبین سے معائنہ کر کے تشخیص یقینی ہو جائے گی۔ دوسری صورت مریض کا پاخانہ ٹیسٹ کرنا ہے۔

## علاج

100 MEBENDAZOLE (VERMOX) ملی گرام کی ایک گولی صبح شام تین دن دی جائے دس روز کے وقفہ کے بعد ایک گولی صبح شام ایک دن 500 PYRANTEL (COMBANTREN) ملی گرام کی ایک گولی ناشتہ کے آدھ گھنٹہ کے بعد دے کر دوسری خوارک پندرہ دن کے بعد اسی طرح۔ PIPERAZINE یہ شربت کی صورت میں ملتی ہے۔ ایک چمچ رات کے کے بعد پانچ دن تک کافی رہتا ہے۔

## SCHISTOSOMIASIS

یہ پیٹ اور جسم میں پائے جانے والے طفیلی کیڑوں کا ایک خطرناک خاندان ہے جو مصر اور دوسرے افریقی ملکوں میں زیادہ طور پر پایا تھا۔ اب جنوبی امریکہ کے ملکوں خاص طور پر برازیل، پورٹوریکو اور وِسٹ انڈیز میں بھی چلا گیا ہے۔ پاکستان میں تھل اور ڈیرہ غازی خان کے علاقوں سے بھی ان کے وجود کی خبریں ملی ہیں۔ ان کا عمومی قیام گندے پانی میں ہوتا ہے۔ جو لوگ پانی کے آلودہ ذخیروں جیسے کہ تالابوں اور جھیلوں میں نہاتے یا ان کا اہلے بغیر پانی پیتے ہیں ان کے اندر جا کر اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بچے تدرست انسان کی جلد میں سوراخ کر کے داخل ہو جاتے ہیں جنہاں سے خون کی ٹالیوں کے راستے ~~بھڑو~~ یا جگر میں جا کر وہاں مصیبت بننے لگتی ہیں۔ ان کی تین اہم قسمیں ہیں۔

SCHISTOSOMA HEMATOBIMUM

SCHISTOSOMA MANSONI

SCHISTOSOMA JAPONICUM

ہمارے علاقہ کے لئے زیادہ اہم ہیں۔ ان میں سے اول الذکر پیٹ پر اثر انداز نہیں ہوتا اور اس کا زیادہ تر دائرہ عمل گرووں اور پیشاب کی ٹالیوں تک محدود ہے۔ اس لئے ہم اس کا ذکر چھوڑ کر پیٹ میں خرابی کرنے والی اقسام کو توجہ دیتے ہیں۔

## SCHISTOSOMA MANSONI

بڑی آنت میں سوزش پیدا کرنے والے اور گھربنانے کے بعد علامات کی ابتدا پیٹ درد، پاخانہ میں خون، پیپ اور لیس سے ہوتی ہے۔ آنتوں میں بڑے بڑے سے بنتے ہیں۔ جن کی وجہ سے جسم کا خون مسلسل ضائع ہو کر خون کی شدید کمی لاحق ہو جاتی ہے۔ خون نکلنے کے ساتھ جسم میں بحالت اور توانائی کی کمی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یوں جسم پر درم اور پیٹ میں پانی نمودار ہوتے ہیں۔ پیٹ میں پانی کی ایک اہم صورت کیڑوں کے جگر میں جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ وہاں جا کر یہ دونوں خون میں

رکاوٹ اور جگر میں FIBROSIS اور جھلیاں پیدا کر کے اس کو بڑھاتے ہیں۔ تلی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ معدہ میں بھی خون کا غمراؤ واقع ہو جاتا ہے۔ جو آئندہ خون کی قے کا باعث بنتا ہے۔

دو ماہ کے بعد ہر تان، پیٹ اور پیروں میں پانی۔ قے کی زیادتی، جگر اور تلی کے پھیلاؤ کے بعد مریض کا آخری وقت قریب آ جاتا ہے۔

### SCHISTOSOMA JAPONICUM

یہ مشرق بعید کا خصوصی کیزا ہے۔ اس لئے سائنسی نام میں اسے جاپانی کیزے کی کنیت بھی تفویض ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر جاپان، فلپائن، ویت نام، تھائی لینڈ، برا اور چین میں دریائے زرد اور ہالکسی کے ڈیلٹا کے رہنے والوں بلکہ وہاں پر آلاہوں اور کھڑے پانی کی جھیلوں سے پانی پینے والوں کو متاثر کرتا ہے۔ جگہ دیش میں نواکھلی، سہت، کومیلہ وغیرہ میں بھی آبادی کی کثیر تعداد اس قسم کا شکار پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی اس کا اکا واکا شکار نظر آ جاتے ہیں۔ انسانوں کو یہ بیماری بھیڑ، بکری، گستا، چوہا، بھینس، بلی، گھوڑا اور سور سے ہو سکتی ہے۔ جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کو جانوروں سے یا جانوروں کو ان سے جاپانی کیزوں کی بیماری ہوتی رہتی ہے بلکہ ان سب کا تپس میں تبادلہ امراض ہوتا رہتا ہے۔

اس خاندان کو BILHARZIA بھی کہتے ہیں۔ اور یہ نام مشرق بعید اور مصر میں بالخصوص بڑی دہشت کا باعث ہے۔

ایک مصری رسالہ کے مزاحیہ کالم میں بتایا گیا ہے کہ سفر کے دوران ایک شخص نے اپنی گاڑی میں راستے کے کسی جوڑ کا پانی ڈالا۔ مہربانوں نے ڈرایا کہ اس میں تو بلہارزیا ہو سکتا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیا۔ بلہارزیا کے نام کی دہشت اتنی تھی کہ وہ سوچے سمجھے بغیر دیر تک پریشان رہا۔ حالانکہ موٹر میں پانی ڈالنے کی بجائے بلہارزیا گند پانی پینے سے ہوتا ہے۔

یہ کیزے دوسری تمام قسموں سے زیادہ انڈے دیتے ہیں۔ اس لئے ان سے پیدا ہونے والی بیماری بھی زیادہ شدید ہوتی ہے۔

## علامات

بچش کی طرح کی صورت حال، جگر اور کلی بڑھتے ہیں مگر ان کی جھلیاں تلف ہو کر CIRRHOSIS کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جن کے نتیجہ میں ہیٹ میں پانی اور یرقان ہو سکتے ہیں۔ 5 فیصدی مریضوں کا نظام عصبی بھی متاثر ہوتا ہے۔ دماغ میں خیزش کی وجہ سے مرگی، فالج، ادھرنگ بلکہ بیتائی کے متاثر ہونے سے لوگ اندھے بھی ہو جاتے ہیں۔

بیماریوں میں خون کی نالیاں متورم ہو جاتی ہیں۔ وہ پھیل جاتی ہیں یا ان میں رکاوٹ کی وجہ سے دل پھیل جاتا ہے۔ سانس کی نالیاں پھیل جانے سے ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ اور ان میں سوزش کی وجہ سے کھانسی، بلغم، اور سانس میں رکاوٹ (دمہ کی سی کیفیت) مستقل اذیت کا باعث بن جاتے ہیں۔

## تشخیص

پاخانہ کے معائنہ پر ان کے اندرے نظر آ جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر مریض صبح نہار منہ تھوڑی سی ورزش کرے اور اس کے بعد کا پیشاب لے کر اسے مشین سے خوب ہلانے (CENTRIFUGE) کے بعد خوردبین میں دیکھا جائے تو اندرے مل جاتے ہیں۔ یا مریض کی مقعد میں اوزار ڈال کر وہاں سے فلائش کو روٹی کے ساتھ لگا کر نکالی کر معائنہ کیا جاتا ہے۔ آئیوڈین کا ٹینک لگانے کے بعد LV PYELOGRAPHY کرنے پر پیشاب کی نالیاں اور سکڑا ہوا مثانہ ابھرے میں دیکھا جاسکتا ہے۔

## علاج

بہار زیا کی تینوں قسموں کے لئے موجد علاج یہ ہے۔

NIRIDAZOLE بچوں اور بڑوں کو وزن کے حساب سے دی جاتی ہے جس کا فارمولا یہ ہے کہ ہر کلوگرام وزن پر 15 ملی گرام روزانہ دی جائے۔ مثلاً 60 کلوگرام



وزن کے عام تندرست کی خوراک روزانہ 900 ملی گرام ہوگی جسے دو یا تین حصوں میں تقسیم کر کے آٹھ دن تک لگاتار دیا جائے۔ اس دوائی سے مریضوں کو چکر آتے ہیں۔ دل گھبراتا ہے۔ دماغ میں الٹے پلٹے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہیٹ میں درد کے ساتھ اسٹل ہوتے ہیں۔

OXAMNIQUINE اس کا زیادہ تر فائدہ S.MASONI کے مریضوں کو ہوتا ہے 40 کلوگرام کے ایک عام مریض کو 800 ملی گرام روزانہ تین دن دی جاتی ہے۔ یہ دوسری دواؤں کی نسبت کم ٹھگ کرتی ہے۔ مگر اس کے باوجود دو تین دن کے لئے جائزے سے بخار چڑھ سکتا ہے یا جگر میں سوزش کے امکانات موجود ہیں۔

PRAZIQUANTEL اس کی 1800 ملی گرام کی ایک ہی خوراک دی جاتی ہے۔ جس کے بعد ہیٹ میں قہج کی طرح کا درد اکثر ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ 900 گرام روزانہ کے حساب سے دو دن دیتے ہیں۔

METRIPHONATE اس کے 600 ملی گرام صرف ایک مرتبہ دے دیتے ہیں اور یہ خوراک ہر 15 دن کے وقفہ کے بعد کل تین مرتبہ دی جاتی ہے۔ اس کے بڑے اثرات سب سے کم ہیں۔

کچھ استاد NIRIDAZOLE کے 1500 ملی گرام اور METRIPHONATE کے 600 ملی گرام ملا کر ایک ہی خوراک کی شکل میں دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے فائدے سب سے عمدہ ہیں۔ لیکن اس مقدار سے مریض کا گھبراہٹ اور درد سے برا حال ہونے کے امکان موجود ہیں۔

## طب یونانی

طب قدیم میں ہیٹ کے کیڑوں کے علاج کے لئے متعدد ادویہ تجویز کی جاتی رہی ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ان میں سے اکثر مفید، محفوظ اور ارزاں تھیں۔ عام طور پر اس غرض کے لئے انار کا چھلکا، المستین، اندر جو، بکائن، پلاس پاپزا، باؤ بڑنگ،

برگ نیم، سپاری، کمبڈ، کدو، کنکلی، در منہ ترکی اور کمالا استعمال کئے جاتے تھے۔ ان میں سے تقریباً تمام ادویہ برٹش فارماکوپیا نے قبول کر لیں۔ اور انگریزی ادویہ کی دکانوں پر ان کے سنوف، گولیاں جدید طریقہ سے بنے ہوئے پتھر آسانی سے مل جاتے تھے پاکستان میں پیدا ہونے والی نباتاتی ادویہ میں سے المسنون اور کمالا سے ایک مشہور کرم کش دوائی SANTONIN حاصل کی جاتی ہے۔ اور یہ دوائی اب بھی تیار ہو کر باہر کے ملکوں کو بھیجی جاتی ہے۔

علم الادویہ کے جید استادوں نے اپنی MD کی ڈگریوں کے لئے کمبڈ پر تحقیقی مقالے لکھے ہیں اور انہوں نے اسے پیٹ کے کیڑوں کے لئے مفید دوائی قرار دیا ہے۔

### حکیم مفتی فضل الرحمان کا نسخہ

یہ ایک جید طبیب تھے۔ ایک عزیز کے پیٹ میں کیڑے تھے۔ ان کو دکھایا گیا تو یہ نسخہ تجویز کیا۔

کمبڈ، پاؤ بڑگ، برگ نیم، ان میں سے ہر ایک دوائی چھ ماشہ (چھ گرام) لے کر چیں کر ملا لیں۔ پھر اس کے تین حصے کئے جائیں۔ علی الصبح ایک حصہ دہی میں ملا کر کھالیا جائے۔ دو دن کے وقفہ کے بعد دوسرا حصہ اس طرح دہی میں ملا کر، پھر چار روز بعد تیسرا حصہ دہی میں حسب سابق۔

دوائی دینے سے ایک دن پہلے مریض کو جی بھر کر میٹھی چیزیں کھائی جائیں۔ اس نسخہ کے اجزاء بذاقہ اور شدید کڑوے ہیں۔ لیکن فعال الادویہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان میں سے ہر ایک پیٹ کے کیڑے مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوائی کھانے سے پہلے میٹھی چیزیں دینے کا مطلب مریض کے جگر کو ادویہ کے منفی اثرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ یہ ایک مثالی نسخہ ہے جس میں تقریباً ہر قسم کے کیڑوں کو جسم سے نکالنے کا مقول ہندوست موجود ہے۔ ہم نے اس نسخہ کو ذاتی طور پر درمنوں مریضوں پر بڑے اچھے نتائج کے ساتھ استعمال کیا ہے۔

طب کی اکثر کتابوں میں کیڑے نکالنے کے اور بھی کئی نسخے ملتے ہیں جن میں سے اکثر کی بنیاد انہی ادویہ پر ہے۔ مگر ان کے ساتھ کئی قسم کے بیج وغیرہ شامل ہیں۔ ادویہ

کے جھوم میں صحیح دوائی کا اثر متاثر ہو سکتا ہے۔ اس لئے یہ سادہ اور ازان نسخہ ہمیشہ بہتر رہتا ہے۔

### STRONGYLIDES STERCORALIS

دوسرے کیڑوں کی نسبت یہ کم بے ضرر ہوتے ہیں۔ جب تک ان کی تعداد کم ہو یہ معمولی آفت میں جھیلیں کا ملبہ وغیرہ کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ ان میں نر کم ہوتے ہیں۔ اور مادہ زیادہ۔ مادہ کی عام لمبائی تین ملی میٹر ہوتی ہے۔ برطانیہ والوں کا کہنا ہے کہ یہ کیڑے ان کے ملک میں نہیں ہوتے۔ وہاں آنے والے پاکستانی، بنگالی اور ویسٹ انڈیز کے لوگ یہ بیماری لاتے ہیں۔ مشرق بعید میں یہ بیماری بڑی عام رہتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دور ان جو برطانوی سپاہی اس علاقہ میں مقیم تھے۔ یا جاپانیوں کی قید میں رہے ان میں سے اکثر کے پیٹ میں یہ کیڑے داخل ہو گئے۔ اس واقعہ کے 30 سال بعد واپس آنے والے قیدیوں میں سے 15 فیصدی کے پیٹ میں کیڑے بدستور موجود تھے۔

اگر مریض کے جسم میں کمزور کر ڈینے والی دوسری بیماریاں از قلم فزیا بٹس وغیرہ ہوں تو یہ آنتوں میں سوراخ کر کے ~~بھڑو~~ کی جانب نکل جاتے ہیں۔ ورنہ اگر کسی شخص کو کسی اور بیماری کے علاج کے سلسلہ میں کورٹی سون CORTISONE دی جا رہی ہو تو یہ دوائی قوت مدافعت کو کمزور کر کے ان کیڑوں کو کھل کھیلنے کی مہلت مہیا کر دیتی ہے۔

گرم علاقوں میں جب 'دق' خسرہ اور کوڑھ کے مریضوں کی جسمانی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر یہ کیڑے آنتوں میں گھس کر اپنا مرکز بنا لیتے ہیں۔

انسانی جسم میں ان کیڑوں کے داخل ہونے کا وہی اسلوب ہے جو ہبک ورم کا ہے۔ انڈوں سے نکلنے والے بچے ننگے پاؤں پھرنے والوں کے پیروں میں گھس کر جسم کے لفظی نظام کے راستے ~~بھڑو~~ اور وہاں سے ایک لمبے راستے سے آنتوں میں جاتے ہیں۔

## علامات

پیٹ میں کیڑوں کی دیگر بیماریوں کی طرح پاخانہ کا ٹیسٹ سب سے قابل اعتماد طریقہ ہے۔ پاخانہ کو نمک کے پانی میں ملا کر اچھی طرح ہلانے کے بعد اوپر والی تہ کا کچھ حصہ نکال کر اسے خوردبین میں دیکھا جائے تو اس میں کیڑوں کے انڈے نظر آ جاتے ہیں۔

## علاج

عام طور پر THIOMBENDAZOLE 2-3 گرام روزانہ تقسیم کر کے پانچ دن تک دی جائے۔ دوائی کی گولیاں کھانے کے بعد چبا کر کھائی جائیں۔ اس کے متبادل ALBENDAZOLE کے 400 ملی گرام روزانہ کھانے کے بعد تین دن تک دیئے جائیں۔

علاج کے دوران حلقے، بھوک کی کمی اور اسہال ہو سکتے ہیں۔ کچھ مریضوں کو شدید چکر آ جاتے ہیں۔ دل کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ کھلی، ہلکے پریشر میں کمی بھی عبوری عرصہ کے لئے ہو سکتے ہیں۔ دوائی بند ہونے پر یہ علامات ختم ہو جاتی ہے۔ بارہ سال سے کم عمر بچوں کی خوراک نصف ہوتی ہے۔

## HYMENOLEPSIS NANA

شکل و صورت میں یہ فیتے والے کیڑے یعنی TAPE WORM کی طرح ہے۔ بلکہ اسے اس کا چھوٹا بھائی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے انڈے مریضوں کے پاخانہ کے راستے خارج ہوتے ہیں۔ کھیاں اور غلاظت کے دوسرے ذریعے ان کو تندرست افراد کے پیٹ میں پہنچاتے ہیں۔

## علامات

فیتے والے کیڑے کی مانند پیٹ میں بوجھ، کبھی اسہال اور کبھی بد ہضمی کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے۔ اکثر مریضوں کی جسم پر خارش اور اس کے ساتھ پتی اچھلتی ہے۔

وانے نکلتے ہیں اور آنکھیں پھلی ہو جاتی ہیں۔

علاج

عام طور پر YATREN کی 4-6 گولیاں روزانہ دی جاتی ہیں۔ PYRANTEL کی دو گولیاں صبح ناشتہ کے بعد صرف ایک مرتبہ دی جاتی ہیں۔ دوبارہ 15 دن کے بعد۔

### TRICHURIS TRICHURIA

اس کیڑے کی شکل کو چوانوں کی چابک کی مانند ہوتی ہے۔ ایک طرف سے لمبا موٹا اور دوسری طرف باریک اور لمبا اس لئے انگریزی میں WHIP WORM بھی کہتے ہیں۔ کیڑے گندی غذا کھانے سے انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اور آنتوں میں جا کر پھیلتے پھولتے اور اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ زیادہ تر بڑی آنتوں میں رہتے ہیں۔

علامات

تعداد اگر کم ہو تو کوئی خاص تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ پیٹ میں ہلکا ہلکا درد جو سارے پیٹ میں محسوس ہوتا ہے۔ اسہال جس میں کبھی کبھی خون بھی شامل ہو جاتا ہے۔ پرانے مریضوں میں پیٹ درد کے ساتھ پاتخانہ کرتے وقت درد بھی ہوتا ہے۔ اور اجابہ کے دوران آنت کا کچھ حصہ باہر بھی آ جاتا ہے۔ آنتوں کے اندر ریل پڑ کر ان میں رکاوٹ بھی آ سکتی ہے۔

بیماری اگر کچھ عرصے اور قائم رہے تو بھوک اڑ جاتی ہے۔ اور خون کی کمی لاحق ہو جاتی ہے۔

علاج

(ZENTEL) ALBENDAZOLE کے 400mg صرف ایک مرتبہ کافی ہوتے ہیں۔ ہماری رائے میں اس کی یہی مقدار 15 دن کے بعد دوبارہ دے دینی زیادہ

مناسب رہتی ہے۔

MEBENDAZOLE (VERMOX) کے 200mg روزانہ 3 دن تک دینے

بھی مفید پائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ OXANTEL کے 800mg روزانہ دو روز تک دینا بھی مفید ہوتا ہے۔

## GIARDIA LUBALI

طفیلی کیڑوں میں اکثر سے چھوٹا یہ  $0.9 \times 0.2$  ملی میٹر کے رقبہ والا کیزا کھٹل سے بھی چھوٹا مگر خباثت میں اکثر سے زیادہ ہے۔ زندگی کے حالات جب اس کے لئے خوشگوار نہ ہوں تو یہ اپنے گرد حفاظتی حصار قائم کر کے چپ سا رہ لیتا ہے۔ یہ فریج کے برف بنانے والے خانہ میں دو ماہ تک اسی حیثیت میں زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اس میں گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اس لئے کھانے پینے کی کچی یا گندی چیزیں استعمال نہ کی جائیں تو اس کی سوزش نہیں ہوتی۔ جب زندگی کے حالات اس کے لئے نامساعد ہوں تو یہ اپنے آپ کو گول کر کے اوپر ایک خول چڑھا لیتا ہے۔ ناشپاتی شکل کے اس کیڑے کی ظاہری ہیئت بھی بڑی بھیا تک ہوتی ہے۔ مریض جبکہ پانخانہ میں خارج ہوتا رہتا ہے۔ اور کھینوں یا گندے پانی سے سندرست افراد تک جاتا ہے۔ بیماری پیدا کرنے کے لئے اس کی بڑی تھوڑی مقدار بھی کافی ہوتی ہے۔

غلاقت سے پھیلنے والی تمام بیماریوں کے بارے میں جیسے کہ مشہور ہے کہ وہ گرم اور استوائی ملکوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن غلاقت کی یہ بیماری روس کے علاقہ لینن گراڈ، امریکہ اور مشرقی یورپ کے ممالک میں زیادہ ہوتی ہے۔

جسم میں داخل ہونے کے بعد یہ کیزا آنٹوں کی لعاب پیدا کرنے والی جھلیوں کو گلانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ جھلیوں پر چٹا پھرتا ہے تو ان میں خیرش پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کے جسم سے ایک کیسیلوی ENTEROTOXIN پیدا ہوتی ہے۔ جس کی پہلی برائی یہ ہے کہ جھلیوں سے خوراک کا مکمل انجذاب نہیں ہوتا۔ نشاستہ دار غذائیں پوری ہضم نہیں ہوتیں جن سے اس سال کا آغاز ہوتا ہے۔

ماں کے دودھ میں موجود Ig-A جو ہر بچوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھتا ہے

جب کہ تیز معدنیاتی دوائیں، جلاب کی دوائیں کھانے اور شراب پینے والوں میں اس کے خلاف قوتِ مدافعت نہیں ہوتی۔ اس لئے وہ جلد بیمار ہوتے اور زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔

### علامات

جسم میں داخل ہونے کے کچھ دن بعد یہ آنتوں میں اپنے لئے جگہ بنانا اور پھر اپنی نسل بڑھا کر اس سال سے شرارت کی ابتدا کرتا ہے۔ دستوں کا رنگ زردی مائل، پتلے اور سخت بدبودار ہوتے ہیں۔ ان میں جھاگ کے پلٹے پڑتے ہیں۔ پیٹ میں ہر وقت ہوا بھری رہتی ہے اور بدبودار ہوا ہمیشہ خارج ہوتی رہتی ہے۔

بھوک کم لگتی ہے۔ اس سال، آنتوں میں خیرش اور کم خوراک کی وجہ سے وزن میں کمی آنے لگتی۔ دودھ کی محتاس، ہضم نہیں ہوتی۔ اس لئے دودھ پینے سے بد ہضمی میں اضافہ ہوتا ہے۔

بیمار اگرچہ اکثر نہیں ہوتا لیکن اس کا ہونا عجیب بات بھی نہیں۔

فولک ایسٹ کا انجذاب متاثر ہونے کی وجہ سے خون کی کمی لاحق ہوتی ہے۔ اس کے کیماوی جوہر آنتوں کی مصلیوں کو گلا کر ان میں ہمیشہ کے لئے خرابیاں پیدا کر سکتے ہیں۔

بیماری جب پرانی ہو جائے تو دست نہیں آتے۔ الہتہ اجابت دن میں متعدد بار ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار جسم ان پر غلبہ پا کر ان کو ختم کر کے اپنے آپ تندرستی لے کر آتا ہے۔ ورنہ بیماری پرانی ہو کر جسم میں تھکن، کمزوری اور اس سال کا مستقل ذریعہ بن جاتی ہے۔

اکثر اوقات ماں باپ بچوں کو اس شکایت کے ساتھ ڈاکٹروں کے پاس لاتے ہیں کہ بچہ بڑھ نہیں رہا، بھوک نہیں لگتی اور دن میں کئی بار حاجت ہوتی ہے۔ تفصیل میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ بچے کو ان ظیفی کیڑوں کی وجہ سے کمزوری پیدا ہوتی تھی۔ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں تیغیر معدہ، جلن اور دیاج کے اکثر مریض اسی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔

## تشخیص

آسان ترکیب یہ ہے کہ مریض کا پاخانہ ٹیسٹ کر دیا جائے عام طور پر پہلی ہی کوشش میں کیڑے یا ان کی CYST نظر آ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو یہ ٹیسٹ دو تین مرتبہ کیا جائے۔ پاخانہ دوبارہ ٹیسٹ کرانے کے لئے پہلے فروٹ سالٹ کا جلاب دینے کے بعد پھر سے لیبارٹری سے معلوم کریں۔

## علاج

سب سے پرانا اور سستا علاج MEPACRINE تھا۔ ایک گولی صبح، دوپہر، شام دس روز تک دینا اس بیماری کا مکمل علاج رہا ہے۔ لیکن اس پہلی کومین کی 30 گولیاں کھانے سے آنکھیں پھلی ہو جاتی ہیں۔

جدید ادویہ میں FLAGYL کو بڑی مقبولیت حاصل ہے۔ 200mg کی ایک گولی صبح، دوپہر شام کے حساب سے 14 دن دی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کی بجائے 400mg کی 5 گولیاں بیک وقت ناشتہ کے بعد دے کر بڑے اچھے نتائج حاصل کئے ہیں۔ لیکن چکر لانے والی اس دوائی کی اتنی زیادہ مقدار ایک دن میں کھانے کے بعد مریض کا برا حال ہو جائے گا۔

دوسری صورت میں 500mg FASIGYN کی چار گولیاں رات کے کھانے کے بعد دی جاتی ہیں یا اس دوائی کے 300mg دس روز تک کھانے کے بعد دینا کافی ہوتا ہے۔

## طب نبوی

قطہ البخری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جراثیم کش قرار دیا ہے۔ اس دوائی کو ہم نے اس نسخہ کے مطابق استعمال کیا۔

قطہ البخری — 3 گرام



### حب الرشاد۔۔۔۔۔ اگرام

اس کو پیس کر ملا کر اس طرح کی ایک خوراک صبح شام کھانے کے بعد دی جائے۔ اس میں حب الرشاد کیزے مارنے کی مشہور دوائی ہے۔ جسے بارگاہ نبوت سے افادیت کی سند حاصل ہے۔

اس نسخہ کو دو ہفتے استعمال کرنے سے کیزوں کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔ جس کا اطمینان پاخانہ کے ٹیسٹ سے کیا جاسکتا ہے۔ یہ دوائی ہر طرح سے محفوظ ہے۔ کیزوں کی تمام بیماریاں جراثیم آلودہ پانی پینے سے ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے والے پانی کے بارے میں ایک اہم اصول رحمت فرمایا۔  
 (پانی اس وقت تک پاک ہے جب تک کہ کوئی چیز اس کے رنگ، بو یا ذائقہ کو تبدیل نہ کر دے)

پینے والے پانی کو دھناپ کر رکھنا ضروری ہے اور اس سلسلہ میں ارشادات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں ”باب المیاء“ کے نام سے علیحدہ ابواب مزین کئے گئے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سایہ دار جگہوں پر اور گزرگاہوں کے قریب پاخانہ نہ کیا جائے۔

سایہ دار جگہوں پر کیزوں کی بامروری سے نکلنے والے بچے چھوٹے میں سستانے والوں کے پیروں کے راستے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ گزرگاہوں سے مراد جھیلوں، تالابوں، نہروں، ندی، نالوں اور دریاؤں کے کنارے اور گھاٹ لیتے ہیں۔ ان کے کناروں پر سستانے کے علاوہ راستے کے قریب غلاظت لوگوں کے کیزوں کو آلودہ کرنے کے ساتھ گزرگاہ ہونے کی وجہ سے کیزوں کے جسم میں داخل ہونے کا باعث بن سکتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کے گھاتوں کے قریب پاخانہ نہ کیا جائے۔ اس سے پانی میں غلاظت داخل ہونے کا امکان نہ رہے گا۔ نہایت وقت کھڑے پانی میں بھی پیشاب کرنے سے منع فرمایا گیا۔

ناخن باقاعدگی سے کاٹیں۔ کھانا کھانے سے قبل ہاتھ دھوئے۔ رفع حاجت کے دوران دایاں ہاتھ استعمال نہ کرے اور کھانے میں بایاں ہاتھ استعمال نہ کرے اور سنت نبوی پر عمل کرنے والے مسلمانوں کے پیٹ میں کیڑے نہیں ہوں گے۔

اشہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی بیماریوں اور نظر کی کمزوری کے لئے سرمہ تجویز فرمایا۔ یہ سرمہ ANTIMONY کا ہونا چاہئے۔ حضور اکرمؐ جب کسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں تو وہ نمونہ کے طور پر اس کا ایک آدھ فائدہ بنانے کے بعد مسئلہ تحقیقات کرنے والوں کو جستجو کی خوشی حاصل کرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں۔ محمد شین نے سرمہ سے آنکھ کی سفیدی اور ناخونہ کا علاج کیا ہے۔ اطباء نے اسے بال اگانے اور ہم نے اسے KELOIDS میں خوب پایا۔ اس کے فوائد کی تحقیقات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مصری ڈاکٹر محمد ظلیل نے سرمہ کے پتھر کو مختلف کیمیائی عمل سے گزار کر اس سے ایک کیمیائی مرکب BISCATECHOL DISULPHONATE

PENTASODIUM ANTIMONY تیار کیا جسے بعد میں NEOANTIMOSAN کا نام دیا گیا۔ یہ دوائی متعدد قسم کے کیڑوں کے علاوہ لاهوری پھوڑا، جنسی بیماریوں، کالا آزار اور FILARIASIS TRICHINOSIS میں بے حد مفید پائی گئی۔ عالمی شہرت کی جرمن دوا ساز کمپنی BAYER نے ڈاکٹر ظلیل کی اجازت سے اسے FOUADIN کے نام سے ٹیکوں کی صورت میں تیار کیا۔ اس زمانہ میں مصر پر شاہ فاروق حکمران تھا۔ ڈاکٹر محمد ظلیل نے ٹیکوں کا نام شاہ فاروق کے باپ شاہ فواد اول کے نام پر "فوادین" رکھا۔

اس کے ڈبہ میں 12 ٹیکے ہوتے ہیں جن میں پہلے دن کے لئے 1/2cc کا پھر بڑھتے بڑھتے مقدار 5cc تک چلی جاتی ہے۔ جب مریض کو اس محلول کے 40-75cc پہنچ جائیں تو وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ چونکہ دوائی تیز ہے اس لئے اس کی مقدار میں تدریجی اضافہ کیا جاتا ہے۔ اکثر مریضوں کو معمولی بخار، مکی اور پیٹ درد کے علاوہ جگر کی تکلیف ہو سکتی ہے دوران ان امور پر توجہ رکھنی چاہئے۔

HOOK WORM کے علاج کے دوران ایک اہم مسئلہ یعنی خون کی کمی کا تذکرہ کیا جا چکا ہے علاج کی ابتدا میں خون کی کمی کو دور کرنے سے اور مریض کی کمزوری کو کم کرنے کے لئے متعدد دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اتنی مصیبت میں بڑے بغیر مریض کو اگر کھجور کھلائی جائے تو اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔

کھجور میں تمام وٹامن موجود ہیں۔ کھجور پیٹ کی تکلیف کو کم کرتی ہے۔ قرآن مجید نے کھجور کو فوری توانائی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ بلکہ جہاں بھی کسی اچھے پھل کا ذکر ہوا اس میں کھجور ضرور شامل تھی۔ کھجور کے ہر 100 گرام میں 1.61 لی گرام فولاد ہوتا ہے جو کہ نامیاتی مرکب کی شکل میں ملتا ہے کہ توڑا سیدھ بچوں کو عمدہ رسالت میں اس کی ٹھنسی دی جاتی رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولنے کے لئے یعنی دن بھر بھوک اور پیاس کے بعد ہلکی اور توانائی بخش غذا کے طور پر کھجور کو پسند فرمایا۔ سفر کے دوران اور جنگی سرگرمیوں میں فوجیوں کو راشن میں کھجور اور ستودیئے جاتے تھے۔ جس سے ان کو مطلوبہ توانائی حاصل ہوتی رہتی تھی۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كُلُوا التمر على الريق، فإنه يقتل الدود

(مسند فردوس، ابو بکر غیلانیات)

(نمار منہ کھجوریں کھایا کرو کہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں)

کیڑے مارنے والی اکثر جدید ادویہ کا اصول بھی یہی ہے کہ ان کو خالی پیٹ دیا جائے کیونکہ غذا کی موجودگی کی بدولت کیڑے دوائی کے اثرات سے بچ جاتے ہیں۔ نمار منہ کھجور کھانے سے کیڑے مریں گے۔ خون کی کمی دور ہوگی اور جسم کی کھوئی ہوئی توانائی واپس آ جائے گی۔ اسی مسئلے کو مزید وضاحت عطا کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہؓ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اكل التمر امان من الفلوج (ابو نعیم)

(کھجور کھانا پیٹ کے قویٰ سے محفوظ رکھتا ہے)

کیزوں کی اکثر علامات اور پیٹ درد اور اسہال نمایاں ہوتی ہیں۔ کھجور میں PECTIN ہوتی ہے جو اسہال کا علاج ہے۔

اگر ہم کھجور کو کیزے مارنے کے لئے نہ بھی استعمال کریں تب بھی کیزوں کے علاج میں اس کا استعمال ضروری اور مفید بن جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ان کے سیاتی اثرات سے بچاتی ہیں۔ اکثر دوائیں جگر کو خراب کرتی ہیں۔ کھجور جگر کو تقویت دیتی اور اس کی فعالیت کو بحال رکھتی ہے۔

حضرت عمار بن سعد اپنے والد گرامی سے یوں روایت کرتے ہیں۔  
 سمعت سعدا بقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول  
 من تصبغ بسبح تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا  
 سحر

(بخاری، مسلم، ابوداؤد)

(میں نے سعدؓ (اپنے والد) سے سنا جو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس کسی نے صبح کو سات دانے عجوہ کھجور کے کھائے اس کو اس دن نہ تو زہر اور نہ ہی جادو تکلیف دے گا)

اس مضمون پر حضرت عائشہؓ سے مسلم نے عمار بن سعیدؓ سے امام احمد نے عبد اللہ بن عباسؓ سے ابن الجوزی نے حدود تائیدی احادیث بیان کی ہیں۔ کھجور کھانے کے بعد اگر زہر اثر نہیں کرتا تو وہ اس لئے کہ یہ جگر کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے کیونکہ ہمارے جسم میں زہروں اور کیمیائی مرکبات کو زائل کرنے کا فرض جگر ادا کرتا ہے۔

صعتر

گھروں میں ریختے اور اڑنے والے کیزوں اور جراثیم کو مارنے کے سلسلہ میں۔  
 حضرت عبد اللہ بن جعفرؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اغروا بھوتکم باللبان والشح (یعنی)

(اپنے گھروں میں لوبان اور شح کی دھونی دیا کرو)

اس ضمن میں ایک دوسری حدیث میں جو انیس سے موی ہے۔ مزید ارشاد ہوا۔

يَخْرُوا بِوَتَكُمْ بِالشَّحِّ وَالسَّرِّ وَالصَّبْرِ

(بخاری)

(اپنے گھروں کو الشح مرکبی اور صبر کی دھونی دیا کرو)

اس طرح دھونی دینے کے لئے لوہان، الشح (حب الرشاد) مرکبی اور صبر کا نسخہ میسر آتا ہے۔ اس نسخہ کا ہر جزو مرکب صورت کے علاوہ تن تھا بھی جراثیم کش اور کرم کش ہے۔ ہم نے گھروں میں دھونی دے کر دیکھا ہر قسم کے کیڑے ان سے مر گئے۔ اور اس کے بعد کمرہ میں خوشبو بھی رہی۔

مقر فارسی جنگلی پودہ کی قسم ہے۔ جسے علم نباتات میں THYMUS SERPYLLUM کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر پیٹ سے ہوا نکالتا، ہاضمہ اور کرم کش ہے۔ کیونکہ دور جدید کی ایک طاقتور کرم کش دوائی THYMOL اسی سے حاصل ہوئی ہے۔ اطباء نے اس کا جوشاندہ بنا کر پینے کا مشورہ دیا ہے۔

لوہان اور موگل کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر پانی میں بھگونے کے بعد صبح ان کا پانی پینے کا مشورہ عنایت فرمایا ہے۔ اس لحاظ سے اگر ان میں سے کوئی تین بھی اہل کران کا جوشاندہ بنا کر مریض کو دو چھ دن میں 2-3 مرتبہ پلائے جائیں تو اکثر و بیشتر اقسام کے کیڑے ہلاک ہو جائیں گے۔

پیٹ سے کیڑے نکالنے کی ادویہ کے بارے میں پروفیسر مگوش نے یہ اصول مقرر کئے ہیں۔

1۔ اس امر کا اطمینان کر لیا جائے کہ کیڑے موجود ہیں۔

2۔ اگر ایک مرتبہ کے ٹیسٹ سے نظرنہ آئیں تو پانچ دن کو 2-3 مرتبہ ٹیسٹ کروایا جائے۔

3۔ TAPERORM اور HOOK WORM کی ادویہ خالی پیٹ دی جائیں۔ دوائی کی مقدار اگر زیادہ ہو تو اسے دو تین خوراکیں میں تقسیم کر

لیا جائے۔

4- اکثر دوائیں دن پر برے اثرات رکھتی ہیں۔ اس لئے مریض دن کا زیادہ حصہ چارپائی پر لیٹا رہے۔ مشقت کا کام نہ کرے۔

5- گھوکوس اور نشاستہ دار غذائیں زیادہ مقدار میں دیئے جائیں۔ کیونکہ یہ غذائیں جگر کو اودیہ کے مضر اثرات سے بچاتی ہیں۔

6- علاج کے ان اصولوں کی روشنی میں طب نبوی کی ہر دوائی ان پر پوری اترتی ہے۔ کیونکہ وہ غذائی نوعیت کی ہیں اور ان کے مضر اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور، بھئی، شہد اور دوسری تمام غذاؤں کو جب دوا کے طور پر استعمال فرمایا تو علی الصبح خالی پیٹ کھانے کی نصیحت فرمائی۔ یہاں پر توجہ کے قابل یہ اہم بات ہے کہ دور حاضر کی تمام کرم کش اودیہ کیسادی زرمیہ سے حاصل ہوتی ہیں اور جب ان میں سے کسی ایک کو خالی پیٹ دیا جاتا ہے۔ تو ان سے معدہ اور آنتوں میں خراش پیدا ہوتی ہے جس سے وجہ سے مٹی، اسالی، طبیعت میں اختلاض اور گھبراہٹ کا پیدا ہونا ایک لازمی امر ہے۔ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجوزات غذائی صفات رکھتے ہیں ان کو خالی پیٹ کھانے سے نہ صرف کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ مریض کو دن بھر کے کام کاج کے لئے توانائی کی اچھی مقدار حاصل ہو جاتی ہے۔

انار

طب جدید میں ایک مدت تک انار کا چھلکا خشک کر کے پس کر کپڑے نکالنے کے لئے دیا جاتا رہا ہے۔ طب قدیم میں کپڑے نکالنے کے لئے رات کو کسٹر کا تیل پلانے کے بعد اگلی صبح انار کے پھلکے کا جوشاندہ پکا کر ہر ایک گھنٹہ بعد اس کے دو گھونٹ پلائے جاتے رہے ہیں۔ گھنٹوں میں چھوٹے سائز کے تمام کپڑے نکل جاتے ہیں۔

جس جگہ بھی بہترین پھلوں کا ذکر آیا قرآن مجید نے انار کا بار بار تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذکر سے بھری ہڈی ہے۔ اور ہر نعمت کے

ذکر کے ساتھ یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے تم اللہ کی نعمتوں کو کیسے جھٹلا سکتے ہو۔ جیسے کہ:

**لَهَا فَاكِهِتْ وَنَخْلٌ وَرَمَانُ لِبَايَ الْاَءِ وَكَمَا تَكْنِي**

(الرحمن: 69)

(وہاں پر ہر قسم کے پھل ہونگے اور کھجور اور انار، پھر تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے)

اس آیت کی مزید وضاحت میں حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں:

**اِنَّهٗ سَالٍ مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم عَنْ الرِّمَانِ لَقَالَ مَا مِّنْ رِّمَانٍ اِلَّا وَلَیْہٖ حَبْتٌ مِّنْ رِّمَانِ الْجَنَّةِ** (ابو نعیم)

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انار کے بارے میں پوچھا۔ (انہوں نے فرمایا کہ ایسا کوئی انار نہیں ہے جس میں جنت کے اناروں میں سے کسی ایک کا دانہ نہ ہو)

انار سے فائدہ اٹھانے کی آسان ترکیب حضرت علیؓ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

**كُلُوا الرِّمَانَ بِشَعْمِهِ فَإِنَّ دَهَاقَ الْمَعْدَةِ**

(ابو نعیم)

(انار کو اس کے گودے سمیت کھاؤ کہ یہ معدہ کو جلا دیتا ہے)

انار کے گودے سے مراد وہ باریک چھلکا ہے جو اس کے اندر پھیل کر اسے خافوں میں تقسیم کرتا ہے۔ طبی طور پر یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انار کا چھلکا پیٹ کے کیڑے مار دیتا ہے۔ اس چھلکے کی ہلکی کڑواہٹ بھوک بڑھانے کا باعث ہوگی اور اس طرح حضور اکرمؐ کے ارشاد پر عمل کرنے والوں کو یہ سولت رہے گی کہ اگر اس کے ان جانے میں بھی پیٹ میں کیڑے آگئے ہیں تو وہ انار کے اضافی فوائد سے مر جائیں گے۔ اس کی بھوک بہتر ہو جائے گی۔ انار جگر کی اصلاح کرتا ہے اور کھانسی کا بہترین علاج ہے۔

انار کے فوائد کے بارے میں حضرت علیؓ بڑے متاثر تھے اور فرمایا کرتے تھے۔

”من اكل ومانته نور الله قلبه“ (ذہبی)

(انار کھانے والے کے دل کو اللہ تعالیٰ روشن کر دیتا ہے)

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنا ریکل تعمیر کیا تو اس کے ارد گرد بنی آرائشی جالیوں پر نقاشی میں انار کی کلیاں بنائی گئی تھیں۔ ان کے تاج شاہی کے ارد گرد بھی جالی سے انار ہی کی کلیاں بنی تھیں۔ تو ریت مقدس کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انار کے فوائد سے آگاہ تھے اور اسے پسند کرتے تھے۔

کلونجی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی حضرت ابو ہریرہؓ سے یوں مروی ہے  
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في العبثه  
السوداء شفاء من كل داء الا السام والسم الموت و  
العبثه السوداء الشونيز

(بخاری، مسلم، ابن ماجہ، احمد)

(میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ان سیاہ دانوں میں شفا ہے ہر بیماری سے سوائے سام کے سام کا مطلب ہے موت۔ اور یہ سیاہ دانے شوئیز ہیں)

اسی متن اور معانی کی روایات بریدہ، سالم بن عبد اللہؓ اور حضرت عائشہؓ سے ابن ماجہ، مسند احمد، مسلم، ترمذی، ابن الجوزی میں ملتی ہیں۔ جب کہ بخاری اور ابن ماجہ نے خالد بن سعدؓ کی ایک روایت میں انہی سیاہ دانوں سے ایک مریض کی شفا لابی کا حال بھی بیان کیا ہے۔ محدثین نے ان سیاہ دانوں کو کلونجی قرار دیا ہے۔

حکیم جالینوس ہیٹ کی بیماریوں کے علاج میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ وہ اپنے ہیٹ کے مریضوں کو کلونجی اور شہہ دیتا تھا۔ اس حکیم نے ہیٹ کی بیماریوں کے علاج کا ایک ایسا مرکب تیار کیا تھا جسے ”ج بھی“ ”جوارش جالینوس“ کے نام سے استعمال کیا جاتا ہے۔ جس کے اصل نسخہ میں کلونجی کے ساتھ قسط کو بھی شہہ میں ملا کر دیا گیا



ہے۔ اور وہ اپنی افادیت کے باعث بڑا مقبول ہے۔

کلوئچی کیڑوں کو مارنے میں اتنی مفید ہے کہ اسے گرم کپڑوں کے منہ و تون میں رکھیں تو ان کو کیزا نہیں لگتا۔ حسب الارشاد کے ساتھ کلوئچی ملا کر دینے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔

## عملی علاج

مریض کو نہار منہ 4-7 کھجوریں کئی دن کھلائی جائیں۔

کلوئچی 100 گرام

حسب الارشاد 35 گرام

پیس کر رکھ لیں۔ اس مرکب کے 3 گرام صبح شام کھانے کے بعد دیئے جائیں۔ بچوں کو یہ نسخہ شہد میں ملا کر معجون کی صورت میں چٹایا جاتا ہے۔ عصر کے وقت مریض کو اتار کا پانی نکال کر پلایا جائے۔ پانی نکالتے وقت اس کی اندرونی جھلیاں بھی شامل رہیں۔ اس آسان نسخہ سے پیٹ کے ہر قسم کے کیڑے نکل جاتے ہیں۔

اگر انگریزی ادویہ سے علاج کرنا ہی مقصود ہو تو مریض کو نہار منہ کھجوریں اور شہد دینے سے ان ادویہ کا اثر دو بالا ہو جائے گا اور علاج کے سلسلہ میں خون کی کمی اور ہب ورم کیڑوں کے علاج کی مشکلات پر قابو پا لیا جائے گا۔ چونکہ کیڑے مار ادویہ زہریلی ہوتی ہیں اور جگر کو خراب کرتی ہیں۔ اس لئے ان کے ہمراہ شہد اور کھجور دے کر جگر کی کھل حفاظت ہو جاتی ہے اور ان کے استعمال کے تمام اندیشے ختم ہو جاتے ہیں۔

پیٹ کے کیڑوں پر اثر رکھنے والی جدید ادویہ اور کیڑے کی مناسبت سے ان کے انتخاب کا چارٹ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

	ASCARIS	HOOK WORM	ENTEROBIUS	TRICHURI	STRONGYLOIDES	H. NANA
PIPERAZINE (ANTEPAR)	++ +	+ + +	+ + +	--	--	--
PYRANTEL (COMBANTRIN)	++ +	++	++ +	--	--	--
OXANTEL	--	--	--	++ +	--	+
MEBENDAZOLE (VERMOX)	++	++	++ +	++ +	+	+
MEBENDA						
THIOBENDAZOLE	++	++	++ +	+	++ +	++
ALBENDAZOLE (ZENTEL)						
LEVAMISOLE	++ + +	+	+	--	--	++ +
NOCCARIS						
KETRAK						
PYRIVINUM	+	--	++ +	--	--	--
NICLOSOMIDE (YOMESAN)	+	++ +	++ +	++ +	++ +	
BENDAZOLE (ZENTEL)	++ +	++	--	++ +	++ +	++

## استسقاء (پیٹ میں پانی بھر جانا)

### ASCITIES (DROPSY)

پیٹ میں پانی بھر جانا بذات خود کوئی بیماری نہیں بلکہ یہ دوسری بیماریوں کی علامت ہے۔ اس کے بڑے بڑے اسباب یہ ہیں۔

1- غذائی کمی۔ خاص طور پر لحمیات اور وٹامن کی مسلسل کمی۔

2- دہ کی بیماریاں۔ خاص طور پر CONGESTIVE HEART FAILURE

3- گردوں کی بیماریاں از قسم NEPHRITIS

4- جگر کی بیماریاں۔ جن میں انحطاطی تہذیلیاں، نبلہ کی سوزش، پیٹ کے کیزے رسولیاں وغیرہ۔

5- پیٹ کی مصلیوں کی سوزش خاص طور پر چپ دق کی وجہ سے PERITONITIS اگرچہ مصلیوں کی دوسری سوزشوں میں بھی پانی پڑ سکتا ہے۔ لیکن وہ زیادہ عرصہ نہیں رہتا۔ کیونکہ سوزش اگر ٹھیک ہو گئی تو پانی ختم ہو گیا ورنہ مریض راجے عدم ہو جاتا ہے

6- بچے دانی کے ساتھ مہیض کی بیماریاں

7- اطباء قدیم نے اسے اسباب کی بجائے مختلف شعبوں کی اساس پر لکھی، طبلی اور ذقی قسموں کے لحاظ سے بیان کیا ہے۔ چونکہ وہ صاحبان جسم کے اندرونی حالات اور بیماریوں کے پھیلاؤ کے علم سے زیادہ طور پر آگاہ نہ تھے۔ اس لئے انہوں نے اس کی

اقسام کو ظاہری شکل و صورت کے مطابق بیان کیا ہے۔

دل۔ گردوں اور غذائی کسی سے پڑنے والے پانی صرف پیٹ تک محدود نہیں رہتے۔ بلکہ یہ جسم کے دوسرے حصوں میں بھی درم کا باعث ہوتا ہے۔ جگر کی بعض بیماریوں میں ٹخوں پر بھی درم آ جاتا ہے۔ جگر کی بیماریوں میں پیٹ پہلے پھوٹتا ہے اور باقی جسم بعد میں جب کہ دوسری بیماریوں میں ابتدا جسم پر درم سے ہوتی ہے۔  
مرض کا باعث سمجھنے کے لئے مریض کی غذائی حالت، خوراک کی نوعیت، نذر بازی، بیماریوں بالخصوص تپ دق، پیٹ کے پھیلاؤ، تدریجی اضافہ معمولی صحت کے بعد سانس کی دشواری، خواتین میں زچکیوں، استقامت اور جیت درد کے کیفیات اہمیت کا باعث ہوتے ہیں۔ دل اور گردوں کی وجہ سے استقامت کا فرق کچھ یوں ہے۔

#### NEPHRITIS CONGESTIVE HEART FAILURE

تمام جسم پر درم دل کی وجہ سے تمام جسم پر درم گردوں کی وجہ سے  
پیر سے شروع ہوتا ہے پیر سے شروع ہوتا ہے  
زیادہ درم شام کو ہوتا ہے زیادہ درم صبح کو ہوتا ہے۔  
ہونٹ غلیے پڑ جاتے ہیں ہونٹ غلیے پڑ جاتے ہیں  
ایکسرے پر دل پھیلا ہوا نظر آتا ہے ایکسرے پر دل پھیلا ہوا نظر آتا ہے  
جگر پیٹھ جاتا ہے ربانے سے درد جگر میں معمولی اضافہ ہوتا ہے  
پیشاب میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوتی پیشاب میں لیمبات زیادہ ہوتی ہیں  
استقامت کی اہم ترین علامات پیٹ میں پانی کی موجودگی ہے۔ جس کی وجہ سے مریض کو ٹھنک، بوجھ، شدید کمزوری ہوتی ہے۔ علامات کا زیادہ تر تعلق اس وجہ سے ہے کہ جس نے درم اور پانی پیدا کئے۔ جگر کی بیماریوں اور عملوں کی دق کی وجہ سے پیدا ہونے والے درم کے درمیان کافی فرق ہوتا ہے جیسے کہ

## TB, PERITONITIS

## CIRRHOSIS OF LIVER

چھوٹی عمر میں	درمیانی عمر	مگر
کبھی کم اور کبھی زیادہ	کافی زیادہ	پانی کی مقدار
جگر پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا	جگر محسوس ہونا مشکل ہوتا ہے	جگر کی حالت
	کیونکہ سکڑ جاتا ہے اور پانی کی موجودگی میں محسوس نہیں ہوتا۔	
اکثر رہتا ہے	نہیں ہوتا	بخار
کافی زیادہ	بست کم	پیٹ کو دبائے سے درد
بیمہ داروں میں تکلیف، باغم	بد ہضمی، کمزوری، جگر کے	دیگر علامات
چھاتی میں درد۔ پیٹ میں	فصل میں یا قاعدگی	
چھوٹے چھوٹے		
گوشت		پانی کی میٹ
گدلا	صاف ہوتا ہے	پیٹ کھولنے یا
	جگر سکڑا ہوا	(سوراخ سے اوزار
پیٹ کی عملیوں پر	دانے دار سطح	ڈال کر
دانے دار پھنسیاں		دیکھنے پر

ان کے علاوہ خون کی کمی سے پیدا ہونے والے پانی کی وجہ سے جسم پر ورم معمولی ہوتا ہے۔ تلی بڑھ سکتی ہے۔ خون میں لمبیات کی مقدار کم اور ایسومن کم ہو جاتی ہے۔ جب کہ وٹامن کی کمی سے ہونے والے اشتہاء میں دل معمولی سا پھیل جاتا ہے۔ دھڑکن تیز اور اختلاج ہوتے ہیں۔

## تشخیص

اسباب کو توجہ میں رکھیں تو اکثر اوقات کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر چیز واضح نظر آتی ہے۔ اس لئے ایک لمبی اور خطرناک بیماری کے جتنا پر ٹیسٹ کے اخراجات کا بوجھ کم سے کم ڈالنا مناسب رہتا ہے۔ پیشاب کے معمولی معائنہ سے

گرووں کی بیماری کا پتہ چل جاتا ہے۔ دل کی بیماری سانس چڑھنے وغیرہ کی علامات سے چھاتی کے انکریے یا سکرٹنگ پر پھیلا ہوتا ہے۔ الزاساؤنڈ ایک قابل اعتماد طریقہ ہے۔ جس سے پیٹ میں پانی کا پتہ چلانا۔ جگر کی صورت حال اور پیٹ میں موجود اعضاء کی صورت حال واضح ہو جاتی ہے۔

جگر کی فعالیت کے ٹیسٹ LIVER FUNCTION TEST مفید طریقہ ہے۔ چھاتی کے انکریے اور خون کے ESR سے تپ دق کا سراغ مل جاتا ہے۔ ایٹم کے ذریعہ جگر کے صلاحیت کا امتحان قابل اعتماد ہے۔ لیکن اس ترقی یافتہ دور میں واضح ثبوت کے بغیر جگر میں سوراخ ڈال کر اس کا ٹکڑا نکالنا دانشمندی نہیں۔ کچھ لوگ تفصیل میں جانے کی بجائے پیٹ کا آپریشن کر کے صورت حال کو براہ راست دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس سے قابل قدر معلومات تو حاصل ہو سکتی ہیں لیکن مریض کو بلاوجہ اذیت دینے میں معقول نظر نہیں آتی۔

### علاج

اگر بوجھ زیادہ ہو اور سانس لینے میں مشکل پڑے تو پیٹ میں سوراخ کر کے پانی نکال دیں۔ یہ عمل آہستہ آہستہ کیا جائے کیونکہ زیادہ مقدار میں ایک دم پانی نکالنے سے پیٹ کے پریشر میں فوری کمی آنے سے بے ہوشی یا موت ہو سکتی ہے۔

احادیث میں ایک مریض کا ذکر ملتا ہے کہ جس کے پیٹ میں زیادہ پانی بھر گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس میں سوراخ ڈال ڈال کر پانی نکالا گیا۔

اگر سوزش کی وجہ سے پانی نہ پڑا ہو تو نمک کھانا بند کر دیں۔ پیشاب اور ادریہ زیادہ مقدار میں دی جائیں۔ بار بار پیشاب آنے سے ورم اتر جاتا ہے۔ اگر تپ دق کی وجہ سے پانی بھرا ہے تو اس کا باقاعدہ علاج کریں۔ دل کے مریضوں کے لئے DIGITALIS کی گولیاں مفید رہتی ہیں۔

غذائی کمی یا جسمانی کمزوری کے لئے لحمیات کے سفوف وٹامن وغیرہ دیئے جاتے ہیں۔ زیادہ توجہ سوزش کے علاج پیشاب اور ادریہ پر دی جاتی ہے۔ تپ دق کا علاج آسان ہے۔ اس میں بچ جانے کے امکانات بھی ہیں لیکن CIRRHOSIS کا مسئلہ

خاصا پریشان کن ہے۔ کیونکہ طب جدید کے علاج سے بچنے والوں کو کبھی کبھی ہی دیکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کورٹی سون کے مرکبات بڑے مقبول ہیں۔ ہماری رائے میں کورٹی سون کے مرکبات سے زیادہ بری اور بد اثر دوائی آج تک ایجاد نہیں ہوئی۔

## طب یونانی

طب یونانی میں مرض کا باعث تلاش کرنے کی بجائے ہمارے دوست اب تک اس کی قسموں سے سبب کی نسبت لگا لیتے ہیں۔ ممکن ہے یہ درست ہو۔ طب اکبر کے مطابق اشتقاء لمبی میں ریوند چینی اور دیگر مسهل بار بار دیں۔ اشتقاء ذقی میں معجون کلکانخ حار کے ساتھ ہلیلہ زرد دیں۔ طبعی کے لئے تنقہ اور مسهل تجویز کئے گئے۔ پیوند لانے کے لئے مریض کو گرم ریت میں بار بار دفن کیا جاتا ہے یا کم گرم تور میں بٹھاتے ہیں۔ دوسری صورت میں بورہ ادنیٰ کو روغن پاو نہ ملا کر جسم پر لپ کیا جائے۔

حکیم کبیر الدین نے شیر شتر کے ساتھ کلغند دینے کی ترکیب بیان کی ہے۔ یہ دودھ اور کلغند کی مقدار میں روز بروز اضافہ تجویز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ معجون دہید الورود بھی ان کو پسند ہے۔ ہمارے خیال میں حکیم کبیر الدین کے نسخے مفید اور قاتل عمل ہیں۔ بلکہ اندازہ ہے کہ مریض کو اس سے فائدہ ہو گا۔

## طب نبوی

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے سلسلہ میں اکثر اوقات اصول علاج یا ادویہ کے فوائد مطلق فرما کر مشہد معالج کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ علاج خود تلاش کرے۔ لیکن چند بیماریوں کے مکمل علاج انہوں نے عطا فرمائے یا کسی مریض کو شفا یاب کر کے اپنے نسخہ کی افادیت خود آشکارا فرمائی۔ اس میں اشتقاء اہم ترین ہے۔

حضرت انس بن مالکؓ روایت فرماتے ہیں۔

قدم رھط من عربنتہ و عکھل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
فاجتو و المدینتہ لشکوا ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم  
فقال لوخرجتم الی اہل الصدقۃ فشرتم من اہلہا و البانہا  
ففعلموا فلما صحوا عمدوا الی الرعاۃ فقتلوا و استبا قوا الاہل  
و حاربوا اللہ و رسولہ

(بخاری، ابو داؤد، مسند احمد، ترمذی، النسائی)

ایک دوسری روایت میں پیاری کی زیادہ وضاحت یوں مذکور ہے۔

ان رھط من عربنتہ قوموا علی الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و  
سلم فقالوا اونا اجتوینا المدینتہ فعمطت بطوننا

(عربہ کے کچھ لوگ مدینہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں  
حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہمارے پیٹ مدینہ کی آب و ہوا کی وجہ سے پھول  
گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جس جگہ صدقہ کے اونٹ رکھے جاتے ہیں وہاں  
چلے جاؤ۔ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو۔ اس علاج سے وہ تندرست ہو  
گئے۔ شفا یاب ہونے کے بعد انہوں نے ساریا نوں پر حملہ کیا۔ اونٹ چوری  
کر کے لے گئے ممانفہ قتل کر دیئے اور اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول  
کے خلاف اعلان جنگ کر دیا)

اس نسخہ میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ عربہ کے مریضوں کے پیٹ پھولے ہوئے  
تھے اور چہرے پر ورم تھی۔ علامات سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً ان کے گردے  
خراب تھے اور پیٹ میں پانی اس کی وجہ سے ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ورم  
دل یا جگر کی وجہ سے ہو۔ یا لہجے سرفیس رہنے کی وجہ سے غذائی کمی کا نتیجہ ہو۔ آج  
کے اصل علاج کے مطابق سب سے پہلے یہ طے ہونا ضروری تھا کہ پیٹ میں پانی اور  
چہرے پر ورم کس وجہ سے ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خداداد علم کو  
استعمال فرماتے ہوئے ایک ایسا نسخہ تجویز فرمایا جو تمام اسباب پر حاوی تھا۔ اس میں



غذائی کمی کے علاج کے لئے دودھ کی لمبھات تھیں۔ یہی لمبھات دوسرے اسباب میں بھی جگر اور گردوں کو توانائی دے سکتی تھیں اور جسم میں جمع شدہ پانی کو نکلانے کے لئے ایک قدرتی مہرالیوں بطور پیشاب کے نسلہ میں شامل تھا۔ دل اور گردوں سے پیدا ہونے والے اور ام میں سوڈیم کے مرکبات پسند نہیں کئے جاتے اس لئے پیشاب آور ادویہ کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے۔ حضرت طارق بن شہابؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

**علیکم بالبان الابل فانھا توم من کل الشجر و هو شفاء من کل داء** (ابن عساکر)

(اتمارے لئے اونٹ کا دودھ موجود ہے۔ یہ ہر قسم کے درختوں سے

چرتا ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔)

انہوں نے علاج میں اونٹنی کے دودھ کی افادیت کا باعث بنا دیا کہ یہ اپنے مقررہ اجزاء کے علاوہ ہر قسم کے درختوں کی تھمیں بھی ساتھ رکھتا ہے۔

شہنشاہ جمائگیر شراب کا رسیا تھا۔ جب مسلسل شراب نوشی کی وجہ سے اس کو جگر کی تکلیف شروع ہوئی اور اس سے مسائل پیدا ہونے لگے تو دربار سے وابستہ تمام حکماء علاج میں ناکام ہوئے۔ آخر ایک حکیم نے اونٹنی کا دودھ تجویز کیا جس سے شفا ہوئی۔ جگر کی اصلاح کے بعد بھی شراب کا سلسلہ چلتا رہا اور وہ اسی کے باعث مر گیا۔ اس نے اونٹنی کے دودھ سے شفا پانی کا قصہ اپنی توڑک میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اعتراف کیا ہے کہ وہ شراب نہ چھوڑ سکا۔

آج کے دور میں میہ کالج دہلی کے پرنسپل حکیم نبیر الدین جب پیٹ میں پانی بھرنے کی بیماری کے تمام علاج اونٹنی کے دودھ اور گھنڈہ سے کرتے ہیں۔ ان کو اونٹنی کے دودھ میں افادیت نظر آتی ہے۔ اور وہ اسے گھنڈہ یا گلاب کے پھول کی پتیوں کی مٹیوں کے ساتھ ہی اس بیماری کے علاج میں مفید قرار دیتے ہیں۔ آج سے 800 سال پہلے امام زہبی نے اس علاج پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا۔

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا شافی علاج بتایا ہے۔ جس کا کوئی بھی

علاج طبیعوں کے پاس موجود نہیں۔“

کیمیاوی طور پر اونٹنی کے دودھ میں چکنائی کی مقدار تمام جانوروں سے کم بلکہ ماں کے دودھ سے بھی کم ہوتی ہے۔ چونکہ دل اور جگر کی بیماریوں میں جہاں چکنائی کا زیادہ استعمال مناسب نہیں ہوتا یہ دودھ اعتماد کے ساتھ دیا جاسکتا ہے۔

گو جراثیم سے چار سال کا ایک بچہ گردوں اور جگر کی خرابی کی وجہ سے میوہپنٹال لاہور کے بچہ وارڈ میں زیر علاج تھا۔ بچے کے پیٹ میں سے کئی بار پانی نکالا گیا اور کورٹی سون کی گولیوں کے مسلسل استعمال سے اس کی حالت قابلِ رحم تھی۔

وہ پہلا مریض تھا جس کو ارشاد نبوی کی قیصل میں اونٹنی کا دودھ اور پیشاب پلایا گیا۔ کورٹی سون کے اثرات کو زائل کرنے اور شدید کمزوری کو دور کرنے کے لئے کھجوریں اور شہد دیئے گئے۔ گردے کی بیماری میں شہد دینے کے لئے ایک اور ارشاد نبوی توجہ میں تھا۔

ایک ماہ میں پیٹ بالکل صاف ہو گیا۔ دوسرے ماہ کمزوری جاتی رہی۔ پیشاب کے نیسٹ نارمل آسنے لگے۔ خون سے یوریا وغیرہ زیادہ مقدار میں تھے جس کے لئے جو کا پانی استعمال کیا گیا۔ قطب شیریں حب الارشاد اور کاسنی کا مرکب گردوں کی سوزش کے لئے دیا گیا۔ اس کے لواحقین بڑے محتاط تھے۔ منع کرنے کے باوجود ایک سال تک دوائی دیتے رہے۔ شہد کا استعمال کبھی ترک نہیں کیا۔ اب اس لڑکے کی عمر 16 سال ہے۔ خوبصورت جسم کے ساتھ بفضلہ قاتل رشک صحت کا مالک ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان الغاصرة مرق الکلبہ اذا تحرك اذی صاحبها فداوها  
بالماء المحرق والعسل

(ابوداؤد، مستدرک الحاکم)

(گردے کا وسطی حصہ اس کی جان ہے۔ اگر اس میں سوزش واقع ہو جائے تو اس کا علاج ایلے ہوسے پانی اور شہد سے کیا جائے)

ہم نے کچھ مریضوں کو شہد اور دودھ اور پیشاب ملا کر پلایا۔ لیکن ذائقہ میں بھڑی نظر نہ آئی۔ اس لئے تینوں کو علیحدہ دیا گیا۔ البتہ بعض لوگ دودھ میں شہد کو مٹھاس کے طور پر ڈالنا پسند کرتے ہیں۔

حدیث نبوی پر غور کریں تو مریض کو دودھ والے علاج کے دوران کھانا میا نہ کیا گیا تھا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مریض ایک ہفتہ کے لئے غذا ترک کر کے صرف اونٹنی کا دودھ اور پیشاب ہی استعمال کرے۔ بعض مریضوں میں کچھ اور مسائل بھی ہوتے ہیں جن کے لئے اضافی علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے دل کے دورے کا علاج فرمایا تو دوا کی مریض کی بجائے حکیم کے لئے بتائی اور مریض کو باقاعدہ علاج کے لئے حکیم کے سپرد فرمایا۔ جب حضرت سعدؓ کو ساتھ میں کھانسی ہوتی تو حکیم نے ان کے لئے ایک خصوصی جو شانہ تجویز کیا۔ اس سند کے مطابق ہم اشتقاق کے مریضوں کے علاج میں ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کرتے رہے ہیں۔ لیکن بنیادی اصول علاج وہی رہا۔ جس سے شفا ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔



آیا۔

علوم طب کے جید استاد کرل الہی بخش مرحوم پرانی قبض کے کسی بھی مریض سے بیماری کے ساتھ ساتھ اس کے بیت الخلاء کے بارے میں معلوم کرتے تھے۔ اپنے شاگردوں کو فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ مریض کے گھر جائیں تو اس کا بیت الخلاء ضرور دیکھیں۔ اگر وہ غلیظ اور بدبودار ہے تو دوائیں دینے کی بجائے اس جگہ کو کم از کم ایسا بنوانے کی کوشش کریں کہ استعلاء کرنے والا وہاں پر اطمینان سے دس منٹ گزار سکے۔ کھیموں سے بھرے بدبودار بیت الخلاء میں کسی سے دس منٹ آرام سے گزارنے کی توقع عبث ہے جس کا لازمی نتیجہ قبض ہے۔

تھکے حاجت کے لئے عام طور پر صبح کا وقت متعین ہوتا ہے۔ بڑی بڑی عمارتوں کے کئین صبح اپنی منزلوں کی حاجت گاہوں پر قطار بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اور اندر جانے والوں کو باہر کی قطار اور بعض اوقات شدت سے حاجت محسوس کرنے والوں کی توازون کی گونج میں جلد سے جلد برآمد ہونا پڑتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ روزمرہ کے ان واقعات سے ان کو جلد فراغت کی عادت پڑ جائے۔ درنہ دن کے کسی اور حصہ میں یا تو وہ دوبارہ سنڈاس کا رخ کرتے ہیں درنہ قبض کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مشترکہ خاندانوں میں بھی صورت حال خوفناک نہیں ہوتی۔ بچوں کے سکول جانے کی افراتفری کے ساتھ مردوں کے کام پر جانے کے اوقات آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے بیت الخلاء پر ہجوم ہو جاتا ہے اور ہر فرد دوسروں کی آسائش کو توجہ میں رکھتے ہوئے جلد از جلد نکلنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے قبض کا ہونا ایک لازمی نتیجہ ہے۔

قبض کی ایک دوسری تعریف کے مطابق اگر فراغت نامکمل ہو تو پیٹ میں بوجھ باقی رہ جاتا ہے۔ نامکمل کی وضاحت جسم سے خارج ہونے والے فضلہ کی مقدار کو قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً یورپ میں ہر قسم کا گوشت مرغی کثرت سے کھایا جاتا ہے اور وہاں کے رہنے والوں کی خوراک میں ریشے دار غذاؤں کا تناسب کم ہوتا ہے۔ اس لئے ان کے فضلہ کی مقدار 160 - 120 گرام روزانہ ہوتی ہے۔ افریقی اقوام اور

ہمارے ریشتہ دار غذائیں زیادہ ہوتی ہیں اس لئے ان کے اجسام سے روزانہ خارج ہونے والے فضلہ کی مقدار 400 گرام کے لگ بھگ ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے شہروں میں مرکب غذا کھانے والوں کے بارے میں ابھی تک کسی میڈیکل کالج کے پروفیسر صاحبان کو فرصت تو نہیں ملی مگر اندازہ کے مطابق یہ 300 - 350 کے درمیان ہونی چاہئے۔

### غذا اور قبض

قبض کا تعلق غذا کے اوقات اور اس کی ماہیت سے بھی ہے۔ پیٹ میں داخل ہونے والا ہر کھانا اپنے سے پہلی خوراک کو آگے دھکیل کر اپنے لئے جگہ بناتا ہے۔ اس طرح ہر چار سے چھ گھنٹے بعد غذا کی مناسبت سے آنتوں میں حرکات کی مدد سے پہلی غذا کو آگے کرتے ہوئے اسے مقام اخراج کے قریب لے جاتا ہے۔ اس سے حاجت محسوس ہوتی ہے۔ اگر غذا ایسے اجزاء پر مشتمل ہو جو سارے کے سارے ہضم ہو جاتے ہوں تو جسم کے لئے باہر نکالنے کو کچھ نہیں پچتا جیسے کہ گوشت یا دودھ کا اکثر حصہ ہضم ہو جاتے ہوں تو جسم کے لئے باہر نکالنے کو کچھ نہیں پچتا جب کہ سبزیاں اور پھل ایسے اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں جو مکمل طور پر جزو بدن نہیں بنتے اور اس طرح آنتوں کے لئے باہر نکالنے کے لئے پھوک کی معقول مقدار بن جاتی ہے۔ اور فراغت کا عمل بڑے اطمینان سے انجام پاتا ہے۔

پہلے خیال تھا کہ سبزیاں ہمیں دٹامن اور معدنیات کے علاوہ کوئی خاص چیز سہا نہیں کرتیں۔ مگر اب معلوم ہوا کہ ان کے پھوک میں موجود ریشتہ غیر ضروری تسکیات کے اخراج کا باعث بن کر دل سے بوجھ کو کم کرتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں ریشتہ دار غذائیں دل کے دورے سے بچاتی ہیں۔

غذا کے اوقات کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے۔ چونکہ معدہ میں آنے والی ہر چیز کی اطلاع پر دماغ پہلے سے موجود اشیاء کو آنتوں میں حرکات پیدا کر کے آگے دھکیلتا ہے۔ اس لئے بعض لوگ صبح اٹھ کر نہار منہ چائے کا ایک پیالہ پیتے ہیں۔ جسے EARLY TEA یا BED TEA کا نام دیا جاتا ہے۔ منہ دھوئے بغیر گرم چائے

پینے سے منہ کی ساری غلاظت وصل کر بیٹھ میں چلی جاتی ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ان کی علی الصبح کی ضروریات میں پانی کے تین علیحدہ برتن ہوتے تھے۔ ایک برتن میں طہارت کا پانی دوسرے میں وضو اور تیسرے میں پینے والا پانی۔ کیونکہ وہ نماز کے وقت شہد ملا کر پیچے تھے۔ امراض کے علاج کے علاوہ انہوں نے زہروں سے بچاؤ اور قورلج سے نجات کے لئے کھجوریں اور دہن کی بیماریوں کے علاج میں بھی کو نماز منہ ہی استعمال کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ بھی کھجور اور شہد مکمل اور جامع غذائیں ہیں۔ ان کو علی الصبح کھانے سے آنتوں پر فزیالوجی کے مطابق CASTRO-COLIC REFLEX کی توقع کی جاتی ہے۔ یعنی معدہ میں غذا موصول ہونے پر آنتوں میں حرکت پیدا ہوتی ہیں۔ وہ ان چیزوں سے زیادہ ستر میسر آ سکتا ہے۔ ساتھ ہی توانائی کی ایک معقول مقدار جسم میں دن بھر کی ضروریات کے لئے حاصل ہوتی ہے۔ ان کے شفااتی اثرات اس سے علاوہ ہیں۔ ارشاد گرامی ہے۔

خير الغذاء هوا كره

بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح جلد کیا جائے۔

وہ لوگ جو صبح کا ناشتہ ایک کپ چائے یا اس کے ساتھ ایک رس بسکت کھانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کم خوراک کے ذریعہ جسم کو موٹاپے سے محفوظ کر لیا، احمقوں کی جنت میں ہیں۔ ناکافی غذا کی وجہ سے ان کو جسمانی کمزوری کے ساتھ قبض کا مرض ہو جاتا ہے۔

قبض کے اسباب

نفیس غذا اور کم خوراک۔ آرام طلب زندگی، پیدیں چلنے کی بجائے سواریوں کا زیادہ استعمال۔ بے وقت کا کھانا اور بیت الخلاء جانے کے غلط اوقات بیماریوں کے بغیر بھی قبض کا باعث بنتے ہیں۔

## شدید اور فوری قبض

تے یا دوسری وجوہات سے جسم سے پانی کی کافی مقدار کا فوری اخراج شدید بیماریاں از قسم نمونیہ، دل کا دورہ، گردوں کے فعل میں خرابی، اپینڈکس کی سوزش۔ آنتوں میں رکاوٹ، ٹانگانی طور پر قبض کا باعث بنتے ہیں۔ پانی کی کمی دور ہونے کے بعد اجابت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب کہ دل کے دورے کی دہشت اور مچھوٹی دور ہونا بہت سی دوسری باتوں پر منحصر ہے۔ اپینڈکس کی سوزش اور آنتوں میں فوری رکاوٹ کا حل عام طور پر آپریشن سے ہی ممکن ہوتا ہے۔

## پرانی قبض

نامناسب خوراک کا مسلسل استعمال۔ اوقات خوراک اور بیت الخلاء جانے میں ہمیشہ کی بے قاعدگی۔ قبض کشا ادویہ کا مسلسل استعمال، منشیات اور خواب آور ادویہ کا مسلسل استعمال، ادویہ میں الیومینم، فلوئو کے مرکبات قابض ادویہ خاص طور پر لوسول، فولاد کے مرکبات اور خون کی کمی کی دوائیں، شکر اور پیسی کے کھتے۔ جسمانی کمزوری، پانخانہ دالی جگہ پر سیون کا پھوڑا اور متورم بواسیر اس کا باعث بنتے ہیں۔

## جسمانی بیماریوں سے قبض

معدہ اور آنتوں میں زخم، کولون کے کینسر، جگر کی خرابیاں، ذیابیطس، گلے کے غدودوں کے جوہر کی کمی HYPOTHYROIDISM آنتوں میں سوزش کے علاوہ رسولیاں۔ پھولی ہوئی کولون (MEGACOLON) معدہ کی سوزش۔ غدہ کداسیہ کا بڑھنا، حمل کی وجہ سے پیٹ پر دباؤ، خون کی کمی، عضلات کو کمزور کرنے والی بیماریاں بھی عام طور پر قبض کا باعث ہوتی ہیں۔

قبض کا سب سے بڑا سبب قبض کشا ادویہ کا استعمال ہے۔ پرانے اطباء کا دستور تھا کہ وہ اکثر بیماریوں کے علاج سے پہلے مریض کو مسلسل دے کر اس کا بیت صاف کرتے تھے اور اس کے بعد علاج کیا جاتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح مریض کے



جسم میں موجود زہریلے مادے نکل جاتے ہیں۔ 1950ء تک طب جدید میں پیش کے علاج سے پہلے مریض کو کسٹر آئین پلایا جاتا تھا۔ پنجاب کے ہسپتالوں میں دی جانے والی ادویہ کے سرکاری نسخوں کی دوائی نمبر 1 گوند کیرا کے ساتھ کسٹر آئین کا حلال تھا جو پیش کے ہر مریض کو پلایا جاتا تھا۔ ٹیرا بخار کے علاج میں جلاب اتنا مقبول تھا کہ ہر محتاج ابتدا سیکیشیا سے کرتا تھا اور یقین کیا جاتا تھا کہ اس کی دوسے جسم سے زہریں نکل جاتی ہیں۔ یہ طبعی بات ہے کہ مرض کی کمزوری کے ساتھ علاج کے اسباب شامل ہو کر اسے آخری منزل سے قریب تر لے جاتے تھے۔ سندھ کے دہات میں پرانے ڈاکٹر اب بھی اسی قسم کا اصول علاج اپنائے ہوئے ہیں۔ اور اگر تنگی میں غلطی ہو جائے اور بخار جسے طبعی سمجھا گیا تپ محرقہ یا اینڈکس کی سوزش کا وجہ سے ہو تو آنتوں کا پھٹ جانا یقینی انجام ہوتا ہے۔ اور ہم نے درجنوں مریض اس قسم کے علاج یا جلابوں کی عیادت سے مرتے دیکھے ہیں۔

جلاب دے کر علاج کرنا اب متروک ہو چکا ہے۔ برطانیہ کی برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن نے عوام الناس کی آگاہی کے لئے ایک بڑی مفید کتاب اپنے ملک کے ماہر ڈاکٹروں سے BEWARE OF PURGATIVES کے نام سے لکھوائی تھی اور وہ اتنی مقبول ہوئی کہ اب تک دس سے زیادہ بار چھپ چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جلاب دینے سے آنتیں ہمیشہ کے لئے خراب ہو جاتی ہیں۔ دیگر عوارض کے علاوہ وہ ”دھکا شارت“ ہو جاتی ہیں۔ پھر جلاب لئے بغیر حاجت روائی نہ ہو سکے گی جب کہ مسلسل کی مقدار میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ وہ بڑی آنت میں پھیلاؤ پیدا کر کے نجاتوں کو راستہ میں روکنے والا ڈپو بنا دیتے ہیں اور اس طرح مریض کی کئی دن کے لئے قبض کا شکار ہو جاتا ہے۔

### علامات

اکثر ماہرین کا خیال ہے کہ اگر کسی کو کئی دن بھی حاجت نہ ہو تو اس سے جسم میں کوئی خاص خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ اس لئے بعض قبض ہو جانا بھی وحشت کا باعث نہیں ہوتا چاہئے جیسا کہ قبض کے اسباب میں ذکر کیا گیا۔ کبھی کبھی بعض میں

رکاوٹ یا رسولیاں یا سلطان کی وجہ سے فضلے کا آگے جانا ممکن نہیں رہتا۔ اور ایسی حالت میں جلاب دینے کا مطلب یہ ہے کہ دباؤ کے تحت تمنت پھٹ جائے۔ لیکن یہ کیفیت ایسی بھی نہیں کہ اس پر صبر کیا جائے۔ اس لئے قبض جب ایسے اسباب کی بنا پر ہو تو اس کا قبض کی بجائے سبب کی مناسبت سے علاج کیا جائے۔

ماہرین جب یہ کہتے ہیں کہ قبض بذات خود کسی تکلیف کا باعث نہیں ہوتی تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو پانچ سات دن اجابت نہ اور اس کے جسم میں کوئی خطرناک مسئلہ بھی پرورش نہ پا رہا ہو تو محض قبض کسی جسمانی عارضہ کا باعث نہ ہو گی۔ بعض استاد تو اس عرصہ کو بغلوں تک لے جانے کو بھی برا نہیں جانتے۔ اس لئے ان کے مشاہدات کی روشنی میں دیکھیں تو قبض سے کوئی علامت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن حالات اس کے برعکس ہیں۔

باقاعدہ اجابت نہ ہونے سے طبیعت مضطرب رہتی ہے۔ جسم تھکا تھکا زبان میلی اور بھوک روز بروز کم ہونے لگتی ہے۔ جب آنتوں میں پہلے سے جگہ موجود نہ ہو تو ان میں نئی غذا کا داخل کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اور جب غذا اندر نہ جائے تو توانائی میں کمی ایک لازمی نتیجہ ہے۔

آنتوں میں خوراک جب معمول سے زیادہ ٹھہرتی ہے۔ تو وہاں پر سڑاند پیدا ہو کر بدبو دار ریاح پیدا ہوتی ہیں۔ اگر رکاوٹ زیادہ ہو تو ان ریاح کا اخراج نہیں ہوتا۔ اس طرح پیٹ بوجھ کے ساتھ ڈھولک کی طرح تن جاتا ہے۔

قاہرہ سے روم جاتے وقت جہاز میں ہمارے ساتھ ایک مصری دوست تھے۔ ان کو پہلے سے قبض تھا۔ اس مختصر سفر کے دوران ایک جگہ بیٹھے رہنے سے ان کے پیٹ میں اتنی ہوا بھر گئی کہ جب وہ روم اترے تو وہ پھولا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہاں کے دوست ہمارے لئے پھل اور دوسری چیزیں لائے تھے۔ مگر ان کی طبیعت میں بیزارگی بوجھ اور بد مزگی اتنی زیادہ تھی کہ وہ کسی چیز کو ہچکھنے تک تیار نہ ہوئے۔

ان کو ہوائی اڈہ کے میدان میں لمبی سیر کروائی گئی جس سے کچھ ہوا

نکلی اور لندن جاتے جاتے ان کا پیٹ ہلکا ہو گیا۔

ایسی کیفیات میں لوگ ہاضمہ کے چورن، سوڈا واٹر کی بوتلیں استعمال کر کے پیٹ کی گیس میں از خود اضافہ کر لیتے ہیں۔ سوڈا واٹر کی بوتل میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس کافی مقدار میں ہوتی ہے۔ اس کا سیال تیزابیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ خاص طور پر وہ بوتلیں جن میں لیمرن کا ست قسم کی چیزیں شامل ہوں۔ بلاشبہ کچھ لوگوں کو ان کے استعمال سے وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ مگر وہ لوگ جن کے پیٹ میں تیزاب کی مقدار ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے۔ جن کو انصر یا تیزابیت ہو ان کے لئے چورن یا بوتلیں ایک خطرناک نسخہ ہیں۔

پیٹ میں ریاح کی کثرت کی وجہ سے دلہا پر بوجھ، پکڑ، بے خوابی لازمی نتائج ہیں۔ پیٹ میں جب بوجھ محسوس ہو رہا ہو تو آسانی سے خینہ نہیں آتی۔ ڈکار مارنے کی کوشش بذات خود ایک بیماری ہے جس سے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔

ان علامات میں سے اکثر کسی خاص خرابی کی آئینہ دار نہیں۔ لیکن مریض کو دہشت زدہ کرنے کے لئے کافی زیادہ ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ اگر دو چار روز اجابت نہ ہوتی تو کوئی بات نہیں۔ مسئلہ چند دن میں حل ہو جائے گا۔ مریض ایسے معالج سے تنگ آکر جلاب دینے والے کے پاس چلا جائے گا۔

## علاج

غذائی علاج طب جدید میں قبض کے علاج کے سلسلہ میں ابتدائی اہم بات غذا ہے۔ پرانی قبض میں جلا لوگوں کو کھانا وقت پر کھانا چاہئے۔ ہر 4-5 گھنٹے بعد کچھ دینا۔ غذا کسی ایک چیز پر مشتمل نہ ہو بلکہ یہ مرکب ہو۔ جیسے کہ فیشن ایبل رسی، ڈیز میں کھانا قسطوں میں آتا ہے۔ ابتدا بھوک بڑھانے والی چیزوں مثلاً جوس پھر شوربہ۔ پھر اصل کھانا جو ایک ہی پلیٹ میں ہو یا کئی قسم کے کھانے، ان کے بعد میٹھا۔ پھر چائے کافی یا اب سبز لیمرن والی خوشبودار چائے۔ اس کھانے میں کئی قسم کے کھانے ہیں جن سے خوراک کی جملہ ضرورت کی تمام اقسام حاصل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح

گوشت کے ساتھ سبزیاں جو کہ سالن میں شامل ہونے کے علاوہ شوربہ میں بھی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ دال کا سوپ، کھنبی کا سوپ، ملی جلی سبزیوں کا سوپ۔  
 کھانا جو بھی ہو اس میں چھوک یا ریشہ کی معقول مقدار ہونی چاہئے۔ گوشت کے ساتھ اگر سبزیاں شامل نہ ہوں تو ان کی کمی پھلوں سے دور ہو سکتی ہے۔ لیکن پھلوں کا جوس یا عرق ہرگز اس ضرورت کو پورا نہیں کرتے۔ آٹا ان چھتا ہو۔ سفید اور باریک آنے کی بجائے براؤن آٹا یا براؤن بریڈ زیادہ مفید ہے۔

رفع حاجتہ کے لئے کوڑی کی ثبت پیروں پر بیٹھنا زیادہ مفید ہے۔ اس شکل میں مریض اپنے بائیں گھٹے کو جو کہ پیٹ کے ساتھ لگا ہوتا ہے اگر اندر کی طرف دبا کر رکھیں تو یہ بڑی آنت کے آخری حصوں پر دباؤ ڈال کر اس میں موجود اشیاء کو اپنے دباؤ کی مدد سے آگے کو اٹھیل کر باہر نکلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پانی کی زیادہ مقدار بھی قبض کشا ہے۔

ان جدید مشاہدات کے مقابلہ میں آج سے 1400 سال پہلے علمِ اقداء کے بارے میں بڑی اہمیت کا ایک دلچسپ واقعہ پیش آگیا۔  
 حضرت ام ایمنؓ سفر پر تھیں تو وہاں سے واپسی پر ایک نئے کھانے کی ترکیب سیکھ کر آئیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نئے کھانے کی دعوت دی جس کا حال وہ خود بیان فرماتی ہیں۔

انھا عزملت دلیقا فصنعتہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وغمفا۔

فقال ما هذا قالت : طعام نصنعه باوضنا۔ فاحببت ان اصنع

منہ لک وغمفا۔ فقال ردہا لہا ثم اعجنیہ۔ (ابن ماجہ)

(انہوں نے چھان کر سفید آٹا گوندھا اور بتایا کہ ہمارے ملک کا یہ کھانا ہے جو کہ میں آپ کے لئے تیار کر رہی ہوں۔ حضورؐ نے باریک آٹا دیکھ کر فرمایا کہ تم نے آٹے میں سے جو کچھ نکالا ہے اس کو اس میں دوبارہ شامل کر دو اور پھر تیار کر دو)

یہ واقعہ حدیث کی کئی کتابوں میں آیا ہے۔ حضرت سل بن سعدؓ روایت کرتے

ہیں کہ حضورؐ کے عہد مبارک میں انہوں نے چھٹی نہ دیکھی تھی اور تنگے وغیرہ پھونک مار کر اڑا دیتے تھے۔ یہی بات حضرت عائشہؓ سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں نہ چھان کر استعمال کرنے کا رواج نہ تھا۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے سے چھان کر جس چیز کو بڑی محنت اور کاوش سے نکال کر پھر اس کی سفید روٹیاں پکائیں مگر ان کو ہدایت فرمائی گئی کہ وہ چھان کو پھر سے شامل کر کے روٹی پکائیں جس سے چھان کی اہمیت کو آشکارا کیا گیا۔

جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ آنے کا چھان پرانی قبض اور زیا بیٹس کے مریضوں کے لئے بہترین دوائی ہے۔ اس میں ریشے کے علاوہ وٹامن ب طاقت کا باعث ہو سکتی ہے۔ وٹامن ب عضلات کے لئے مقوی ہے۔

قبض کا دوسرا اہم علاج غذا اور حاجت کے اوقات کا تعین ہے۔ جب جی چاہا بیت الخلاء چلے جائیں اور جب فرصت نہ ہو یا جی نہ چاہے ملتوی کر دیا جائے۔ ایسے میں قبض کو صرف ادویہ کی مدد سے وقتی طور پر دور کیا جاسکتا ہے۔ باقاعدہ علاج سے نہیں۔ صبح اٹھ کر کچھ کھانے کے بعد ایک مقرر وقت پر بیت الخلاء جانا اہم نکتہ ہے بلکہ مقرر وقت پر اگر حاجت نہ ہو تب بھی جانا چاہئے۔ اس طرح وقت پر حاجت ہونے کی عادت بن جاتی ہے۔ مگر اس کے لئے تین اہم لوازمات ہیں۔

○ خالی پیٹ "بیت الخلاء" نہ جائیں ضرور کچھ کھا کر جائیں جیسے کہ سار منہ شمد پینے کے بعد۔

○ رات کو کھانا ضرور کھایا جائے۔ کیونکہ رات کا کھانا نہ کھانے سے صبح تک 19 - 18 گھنٹے کا فاقہ بن جاتا ہے۔ اتنے لمبے فاقہ سے خون میں ششاس کی مقدار گر جاتی ہے۔ کمزوری کے علاوہ سابقہ غذا کو آگے بڑھانے والا عنصر نہ ہونے کی وجہ سے قبض ہوتی ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لا تدعوا العشاء ولو بکف من تمر فانه ترکہ یهرم (ابن ماجہ)

(رات کا کھانا ہرگز ترک نہ کیا جائے۔ خواہ مٹھی بھر کھجوریں کھا لیں۔ کیونکہ رات کا کھانا ترک کرنے سے پوچھاپا (کمزوری) طاری ہوتی ہے)

اس سلسلہ میں متعدد روایات میسر ہیں جیسے کہ ”رات کا کھانا امانت ہے۔“ اور ارشاد گرامی میں واضح فرمایا گیا کہ رات کا کھانا نہ کھانے سے کمزوری ہو جائے گی۔  
○ رات کو کھانے اور سونے کے درمیان کم از کم 3 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہئے۔ اور اس وقفہ کے درمیان 500 قدم چلنے سے آنتوں کی توانائی میں اضافہ ہے۔ اور اگلے دن اجابت اطمینان سے ہوتی ہے۔

### قبض کشا ادویہ — عجب یونانی

قبض کے بارے میں جب لوگوں کو زیادہ معلومات حاصل نہ تھیں تو علاج کا زیادہ تر دوا دھار قبض کشا ادویہ پر تھا۔ اطباء نے ان کو ملین، مسهل اور مسهل شدید کے عنوانات تلے بیان کیا ہے۔ وہ ادویہ جو معمولی قبض میں مفید ہیں اور ان کے استعمال سے ایک ادھ اجابت کھل کر ہو جاتی ہے ان کو ملین کہا گیا جو اس سے زیادہ کریں وہ مسهل ہیں اور اس سے آگے مسهل شدید جیسے کہ حب السلاطین، کسی بھی چکنائی کی زیادہ مقدار آنتوں میں پھسلن پیدا کر کے اجابت لاتی ہے۔ اس غرض کے لئے روغن بادام، روغن بیدانجیر (کسٹر آئیل) اور گھی شہرت رکھتے ہیں۔ بادام روغن اور کسٹر آئیل دودھ میں ملا کر رات کو دیئے جاتے ہیں۔ دودھ میں گھی بھی جلاب کے لئے دیا جاتا ہے۔ مگر اس کا فصل غیر یقینی اور بعض اوقات اتنا سرخ ہوتا ہے کہ مریض کو غسل خانے جانے کی مہلت بھی نہیں ملتی اور کپڑے راستہ میں بھی خراب ہو سکتے ہیں۔

آنتوں میں خراش پیدا کرنے والی تمام ادویہ جلاب کا باعث بنتی ہیں۔ جیسے کہ جمال گوہ (حب السلاطین)۔ جلاب، ریوند چینی، کنوار گندل کا گودا (صبر) المکاس وغیرہ۔ ان میں جمال گوہ اس حد تک مخزش ہے کہ اس کا تیل اگر تندرست جلد پر لگایا جاتے تو وہاں پر آبلہ اور پیپ پڑ جاتے ہیں۔ اپنے معطر اثرات کی وجہ سے جمال

گوٹھ علاج کے طور پر استعمال نہیں ہوتا۔ اس طرح کے اثر والی دیگر ادویہ قدرے محفوظ ہیں اس لئے ان کو دوسری چیزوں سے ملا کر پورے اعتماد کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جن میں ریوند چینی اور جلاپہ بچوں کو بھی کسی خطرے کے بغیر دیئے جاتے ہیں۔

حکماء نے ابتدا ہی میں محسوس کر لیا تھا کہ عضلات میں اگر کمزوری ہو تو یہ بھی قبض کا باعث بنتا ہے۔ اس لئے وہ تمام ادویہ جو جسم کو اور بالخصوص اعصاب اور عضلات کو طاقت دیتی ہیں قبض کا علاج بن جاتی ہیں جیسے کہ کپلا، اور ہلبیلہ سیاہ، لوگ اسی امید پر تنکھیا سفید بھی دیتے آتے ہیں۔ لیکن تنکھیا معدہ اور آنتوں میں شدید قسم کی خراش ہی نہیں بلکہ سوزش پیدا کرتا ہے۔ شاید اسی لئے دورہ اور گھی میں آمیز کر کے دیا جاتا ہے۔

لاہور میں آوارہ کتوں کو تلف کرنے کی مہم کے دوران جب مناسب ادویہ میسر نہ آسکیں تو ہم نے چاہا کہ ایسی ادویہ کے مراکز سے لئے والی زہریں استعمال کی جائیں۔

ان کے افعال سے واقفیت حاصل کرنے کی غرض سے چند کتوں کو مختلف زہریں دی گئیں۔

جن کتوں کو تنکھیا دیا گیا تھا ان کی موت میں کم از کم چار گھنٹے لگے اور ان کو مرنے سے پہلے شدید تے اور اسال ہوئے۔ بالکل بیضہ کی سی علامات تھیں۔ اس غلاظت اور اذیت کی وجہ سے تنکھیا استعمال نہ کیا گیا۔

بیماریوں کے علاج میں بھی تنکھیا ایک غلط اور اذیت دہاں دوائی ہے۔ اتفاق سے ہم کو میو ہسپتال لاہور کے شعبہ امراض مخصوصہ کی سربراہی کے زمانہ میں آتشک کے علاج کے لئے تنکھیا کی ایک محفوظ قسم استعمال کرنے کا وسیع تجربہ حاصل کرنے کا موقع ملتا رہا۔ یہ دوائی اپنے برے اثرات کی وجہ سے اب ہر طرح سے متروک کر دی گئی ہے اس کا ایک مرکب ہدیودار زخموں کی مرہم میں بھی شامل تھا جسے نقصان دہ مشاہدات کی وجہ سے خارج کر دیا گیا ہے۔

کھانسی بخار اور نزلہ کے علاج میں جو شائدہ ایک قسم کا گھریلو علاج بن چکا ہے۔ جو شائدہ اگر مکمل اور صحیح نسخہ کے مطابق ہو تو یہ بھی مسلسل ہے۔ کیونکہ ایسی کیفیت میں کھل کر اجابت ہونا مفید رہتا ہے۔

مغزوات میں پیش بہا خزانے از قسم ستونیا، چلاپ، صبر تربد، خرق شیل الطیب، غارلقون، مگردندہ، مازدیون، من، حب النیل، اسپند، پائے کھنب، بڈال موجود ہیں۔ المستنہن مسلسل بھی ہے اور ہیٹ کے کیڑے مارنے کے علاوہ بہترین مسکن اعصاب ہے۔

حکیم مفتی فضل الرحمن صاحب کی ہسٹریا کے علاج میں بڑی شہرت تھی۔ ان کے دوا ساز نے بتایا کہ وہ ان مریضوں کو ایک گرین المستنہن کا سفوف دیتے تھے اور اسی تھوڑی سی مقدار سے ذہنی خلجان دور ہو جاتا تھا۔

اندراکن ایک مشہور دہکی دوائی ہے۔ جسے یورپ والے لے گئے تو یہ COLCYNTH بن گئی۔ یہی حال ارند کا ہے۔ دیہات کے باہر ملنے والا یہ خود رو پودا اپنے پہلو میں ایک شاندار مسلسل لئے ہوئے ہے۔ جس کا تیل روغن ارند کی بجائے روغن بیدانجیر کھلاتا ہے۔ مغرب والوں کو یہ اتنا پسند آیا کہ یہ روغن بیدانجیر کشر آئیل CASTROL OIL بن گیا اور طب جدید کے مسلوں میں سرفہرست پایا جاتا ہے۔

سانکی ایک قابل اعتماد محفوظ اور مفید دوائی ہے۔ اس میں تھوڑی سی خرابی پیٹ میں مروڑ ڈالنے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسندیدگی کی شاندار سند عطا فرمائی اور اس کا مروڑ ڈالنے والا نقص سنت یعنی سوئے اور شد ملا کر دور کر دیا۔ انہوں نے اسے ہمیشہ کے لئے استعمال کے قابل بنا کر طب پر احسان عظیم فرمایا۔ وہ تو اس کی افادیت میں یہاں تک گئے کہ اسے موت کے علاوہ ہر بیماری کے علاج میں مفید قرار پایا۔ سوئے (DILL) پیٹ سے ہوا نکالتے ہیں۔ شد آنتوں کو سکون دیتا اور مقوی ہے۔ اس طرح قبض کا باعث اگر آنتوں کی کمزوری بھی ہو تو سنا اور سنت سے فائدہ ہو گا۔



اطباء قدیم انجیر کے فوائد سے آشنا نہ تھے حالانکہ اس کا توریت مقدس میں ذکر موجود تھا۔ لیکن اس کی اہمیت ایک عام پھل سے آگے نہ جاسکی۔ قرآن مجید نے اس کو اہمیت عطا فرمائی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بواسیر کے علاج میں تجویز فرما کر اپنی قبض کے لئے ایک چھنی علاج مرحمت فرما دیا۔ انجیر کے کیساوی اجزاء کے علاوہ اس میں پایا جانے والا دودھیا مواد مسلسل ہے اور اس کے اندر کے چھوٹے چھوٹے دانے معدہ کے لعاب میں استغول کی مانند پھول کر بڑی آنت میں بوجھ کی کیفیت پیدا کر کے اجابت لاتے ہیں۔ ہمارے مشاہدہ میں یہ آنتوں کے اعصاب کو بھی تحریک دیتی اور وہاں کے دوران خون کو بہتر کرتے ہوئے عضلات کو بہتر کارکردگی پر تیار کرتی ہے۔

انگور بذات خود مسلسل ہیں۔ لیکن ان میں OXALATES زیادہ ہوتے ہیں اس لئے زیادہ مقدار میں کھانے سے پیشاب میں جلن ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے ان کو اہمیت عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرماتے ہوئے ان کو ایک ایسے جوشاندہ میں پسند فرمایا جہاں یہ پھل ~~بہتر~~ سے بلغم نکلنے کے ساتھ مریض کے دل کی اصلاح بھی کریں۔

ہرڈ لمبی طب کی ایک مشہور دوائی ہے۔ جس کی تین چار قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کی مشہور ترین شکل مربہ ہرڈ ہے۔ جو خوش ذائقہ اور لطیف ہونے کے ساتھ لطیف مسلسل بھی ہے۔ اطباء اسے بلبلہ بھی کہتے ہیں۔ بلبلہ سیاہ کا سفوف لاہور کے ایک سول سرجن ڈاکٹر مظہر حسین مرحوم کو بڑا پسند تھا اور وہ اسے بڑے اعتماد کے ساتھ خود استعمال کرتے اور اپنے مریضوں کو تجویز کرتے تھے۔

ریوند چینی بچوں کے لئے ایک مفید مسلسل ہے۔ دواخانہ نور الدین میں اسے دوسری ادویہ کے ساتھ ملا کر جگر کی بیماریوں کے لئے ایک عمدہ نسخہ کی صورت میں پچاس سالوں سے اچھے نتائج کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ طب جدید والے اسے بھی اچک کر لے گئے اور RHUBARB کا نام دیا۔ ان کی ایک مشہور دوائی PULV.RHEI CO. اسی سے مرتب ہوئی ہے۔

عشق بچاؤ کی نیل اور اس سے لگنے والے سیاہ دانے بھی شرت رکھتے ہیں لوگوں نے اسے سمونیا اور جلاپ کا مرکب بھی قرار دیا ہے۔ اس کے بیج چونکہ سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں اس لئے بھارتی ماہرین علم الادویہ ان میں گزیو کر گئے ہیں۔ انہیں فارماکوپیا میں COMPOUND POWDER OF KALADANA میں بچوں کا سفوف اور ک اور پوٹاشیم ٹارٹریٹ ملا کر 60 گرین کی مقدار میں دیا جاتا ہے۔ یہ کالا دانہ ہرگز کلوئی نہیں ہے کیونکہ حدیث شریف میں مذکور بہت السودا کے لفظی معنی کالے دانے ہیں اور اس سے مراد کلوئی ہے جبکہ یہ کالا دانہ دوسری چیز ہے۔

کچلہ ایک قابل اعتماد مقوی اعصاب اور عضلات ہے۔ جسے صحیح معنوں میں ٹانک کہا جاسکتا ہے۔ طب جدید نے اسے NIX VOMICA کے نام سے پہلے اپنایا پھر اس کا جزر عامل STRYCHNINE علیحدہ کیا اور اسے خوب استعمال کیا۔ اپنے مقوی اثرات کی وجہ سے یہ آنٹوں میں حرکات کو مضبوط کرتا اور غلاظت کے اخراج کے عمل کو طاقت دینے کی وجہ سے مسلسل ہے۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ معدہ سے ملحقہ اعصاب کا ایک مرکز PLEXUS OF AUERBACH واقع ہے۔ کچلہ دیر تک آنٹوں میں رہتا اور اس مرکز کو تحریک دیتا ہے۔ جس سے آنٹوں میں حرکات شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اجابت عمل میں آتی ہے۔

مرکب ادویہ میں طب یونانی کی مکتبہ خوشبودار خوش ذائقہ ہونے کے علاوہ معطر اثرات سے خالی ایک قدرتی مسلسل ہے۔ اسی طرح اطریفل طین، اطریفل زبانی اور اطریفل بسطخو دوس مفید اور قابل اعتماد ادویہ ہیں۔

### طب جدید اور قبض

طب جدید کو قبض کشا ادویہ کے بارے میں کوئی واقفیت نہ تھی۔ ان کے تمام تر عمل کی ابتدا یونانی ادویہ سے ہوتی جو انہوں نے چین اور ہندوستان سے حاصل کیں اور بیسویں صدی تک انہوں نے اس سلسلے میں کوئی قابل قدر اضافہ نہیں کیا تھا۔ پھر انہوں نے اس ضمن میں پہلے ایک مفید کام یہ کیا کہ ادویہ کو خوبصورت شکل میں اور قابل برواشت ذائقہ دیا۔ جیسا کہ سناکی کے ساتھ سونف، ملٹھی، چینی اور گندھک

ملا کر اسے کھانے والوں کے لئے آسان اور لذیذ بنا دیا۔ ایکارول اور PETROL-AGAR والے مرکبات پیتے وقت یوں لگتا ہے جیسے دوائی نہیں پی رہے بلکہ آئس کرم کھا رہے ہیں۔

دوا سازی کے علم اور فعالیت اعضاء کے اشتراک سے انہوں نے قبض کے مسئلہ کو علاج اور ادویہ کے انتخاب کے لئے باضابطہ اور آسان بنا دیا ہے۔

قبض کے علاج کو اس کے اسباب کو توجہ میں رکھتے ہوئے ترتیب دیا جاسکتا ہے۔

### اعصابی محرکات

چونکہ آنکھوں میں حرکات اعصابی نظام کے تابع ہیں اس لئے اعصاب کو تحریک دینے والی ادویہ میں کچلہ STRYCHNINE دیئے جاتے ہیں۔ اعصابی نظام کے پیچیدہ عوامل کو متاثر کرنے والی ادویہ میں CARBACHOL - ERGOT - PHYSOSTIGMINE وغیرہ دیئے جاسکتے ہیں۔ مگر ان کا استعمال ماہر ہاتھوں میں خاص حالات میں کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپریشن کے بعد اگر آنکھیں مفلوج ہو جائیں۔

### جسم بڑھانے والی ادویہ BULK PURGATIVES

۱۔ وہ ادویہ جو پیٹ میں جا کر پھول جاتی ہیں۔ مثلاً اسٹول جتنا پانی میں پھیلتا ہے۔ اس سے دس گنا زیادہ معدہ کے تیزابی لعاب میں پھیلتا ہے۔ اس لئے اسٹول (۵) (ب) دلائی گھاس (AGAR-AGAR)۔

(ب) نمکیات پیٹ میں جا کر پانی کو اپنی جانب کھینچ کر اپنے حجم میں اضافہ کر کے اجابت لانے کا باعث بنتے ہیں جن میں SEDLITZ POWDER - SOD.POT - TARTARATE - MAGNESIUM SULPHATE -

FRUIT SALT - SODIUM SULPHATE - KRUSCHEN SALT SODIUM PHOSPHATE وغیرہ۔ بازار میں ملنے والی اکثر قبض کشا نمکیاتی

دوائیں انہی میں سے کسی ایک سے مرکب ہوتی ہیں۔

### چکنائیاں (LUBRICANTS)

یہ آنتوں میں نری پیدا کر کے فضلہ کو آگے بھسلنے پر مجبور کرتی ہیں یا آنتیں جب چکنائی کی زیادہ مقدار ہضم نہیں کر پاتیں تو اپنی جان چھڑانے کے لئے اسے آگے دھکیل دیتی ہیں۔ جیسے لیکوئڈ پیرافین (LIQUID PARAFFIN) - زیتون کا تیل۔

### آنتوں میں خراش پیدا کرنے والی

(IRRITANTS) کسٹر - ٹیل - گندھک (PHENOLPHTHALEIN) کسٹر  
آئیل کی چکنائی آنتوں کو چکانائیں کرتی بلکہ یہ ہضم ہو کر ایک مخرش عنصر پیدا کرتا ہے تو آنتوں میں جلن پیدا کر کے ان کو تحریک دیتا ہے۔

### کیمیادوی جلاب (ANTHRACENE PURGATIVES)

اس خاندان کی تمام ادویہ نباتاتی ذرائع سے ہیں۔ یہ بذات خود جلاب نہیں۔ لیکن پیٹ میں جا کر جب ہضم ہوتی ہیں تو ان سے ایک کیمیادوی جوہر ANTHRACENE بنتا ہے۔ جو کہ آنتوں میں حرکات پیدا کر کے جلاب لاتا ہے۔ اس خاندان میں سنائی، ریونڈ چینی، کنوار گندل کا خشک گودا یعنی مصر (ALOE) اور ایک امریکی نباتات CASCARA SAGRADA شامل ہیں۔

### دہشت ناک جلاب (DRASTIC PURGATIVES)

اس گروہ میں جمال گوند کا تیل (CROTON OIL) - عشق بچہ کولو سنتھ اور کالا دانہ شامل ہیں۔ یہ آنتوں میں شدید جلن اور خراش پیدا کر کے ان میں حرکات کا ایک لامتناہی سلسلہ پیدا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے درجنوں دست آسکتے ہیں۔ اس خاندان میں PODOPHYLLUM بھی شامل کی جاتی ہے۔ یہ دوائی عام طور پر

پیروں کی ٹھیکوں CORNS پر مرہم کی صورت ملتی ہے۔ جو دوائی پیروں کی موتی جلد کے آثار دیتی ہے وہ انہوں کا کیا حال کرتی ہوگی؟

### لمس کے جلاب CONTACT PURGATIVES

یہ طب جدید کی اپنی ایجاد ہیں۔ یہ کیمیادی مرکبات جب آنتوں کی اندرونی تھیلیوں کو لگتے ہیں تو ان میں براہ راست تحریک پیدا کر کے جلاب لاتے ہیں۔ اس میں ابھی تک ایک ہی دوائی BISACODYL تیار ہوئی ہے۔

### قبض کی جدید دوائیں

اس تعارف کے بعد بازار میں عام طور پر ملنے والی ادویہ کی وضاحت یہ ہے۔  
CREMAFIN یہ ایک دودھیا سیال ہے جس میں لیکویڈ پیرافین کا امیلسن بنا کر اس میں پوپینڈ کی خوشبو اور ذائقہ شامل کیا گیا ہے۔ عام طور پر رات کو ایک بڑا چمچہ کافی ہوتا ہے۔

MAG SULPHATE کو EMSOM SALT بھی کہتے ہیں۔ سب سے سستا جلاب ہے۔ معتدل مقدار میں ضرر نہیں دیتا۔ عام خوراک ایک سے دو بڑے چمچے پانی میں گھول کر دی جاتی ہے۔

SEDLITZ POWDER یہ سفوف دو رنگ کی پڑیوں میں فہیلا ہوتا ہے۔ دونوں پڑیوں کو علیحدہ علیحدہ پانی میں گھولنے کے بعد یہ پانی جب آپس میں ملاتے ہیں تو گیس نکلتی ہے۔ اس کا اہٹا ہوا پانی لیا جاتا ہے۔ تھوری دیر بعد اجابت ہو جاتی ہے۔ فردت سالت کو بھی پانی میں حل کر کے پیتے ہیں۔ ذائقہ کی اصلاح کے لئے کھانڈ ملائی جاسکتی ہے۔

BISACODYL اس کی گولیاں اور اندر رکھنے والی جلیاں عام ہوتی ہیں۔ عام طور پر یہ دوائی ہوہر نگر کہنی کی DULCOLAX کے نام سے ملتی ہے۔ سوتے وقت 2-3 گولیاں کھانے سے اگلے دن اطمینان ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی سوزش اور کمزور مریضوں کو اسی نام کی قبض دور کرنے کی جلیاں نیچے سے دی جاتی ہیں۔

PHILP'S MILK OF MAGNESIA پرانی اور مشہور دوائی ہے۔ جن میں

MAGNESIUM HYDROXIDE 9.7 % کا محلول ہوتا ہے جسے خوش ذائقہ

بنانے کے لئے پیپر منٹ کی خوشبو شامل ہے۔ تیزابیت کو دور کرنے کے لئے چھوٹا بچے دن میں 3 مرتبہ اور قبض کے لئے رات کو دو بڑے بچے عام مقدار ہے۔

AGAROL یہ دودھ کی طرح گاڑھی خوش ذائقہ اور خوشبودار دوائی ہے جس

کے اجزاء یہ ہیں۔

PHENOLPHTHALEIN 1.32 %

PARAFFIN LIQUID 31.75 %

AGAR 0.20 %

اس کا بڑا بچہ رات کو سوتے وقت لیا جاتا ہے۔

PETROL - AGAR دودھ یا میٹھی اور خوشبودار دوائی مختلف شکلوں میں دستیاب

ہیں جس میں مشہور ہیں۔ PLAIN, WITH PHENOLPHTHELIN یا WITH

CASCARA SAGRADA اس کی غلیوی اساس لیکویڈ پیرافین اور دوائی

گھاس پر ہے۔ اضافی طور پر دو مختلف دوائیں شامل کی گئی ہیں۔ ہمارے تجربہ کے مطابق اس کی سادہ قسم سے CASCARA آمیز بہتر ہے۔ اگر اسے زیادہ دن بھی استعمال کرنا پڑے تو عام طور پر عادت پڑنے کے علاوہ اور کوئی برا اثر نہیں ہوتا۔

سناکی کے جدید مرکبات

AGIOLAX جرمنی سے بن کر آئے والا یہ دار مرکب مندرجہ ذیل

ادویہ پر مشتمل ہوتا ہے۔

PLANTAGO OVATA 52.0 gm

ISPUGHUL HUSK 2.2 gm

SENNA PODS 12.4 gm

اس کی 100 گرام کی ڈیسہ بازار میں 70 روپے میں ملتی ہے۔ اجزاء کو آسان

زبان میں بیان کریں تو غم بالغو۔ اسپغول کا چھلکا اور سناکی پر مشتمل ہے۔ اسی نسخہ

کے 110 گرام کسی بھی ہنسی کے برائے دو روپے میں مل سکتے ہیں۔ چونکہ یہ جرمی سے بن کر آتا ہے اور بڑے ڈاکٹر اسے لکھتے ہیں اس لئے لوگوں کو برا نہیں لگتا۔

چھوٹا بچہ رات کھانے کے بعد کافی رہتا ہے مگر پرانی قبض کے مریضوں کو دن میں چھ گھنٹوں کے بعد ایک بچہ / چھوٹا بچہ پانی کے ہمراہ دیا جاتا ہے۔

SENOKOT ان گولیوں میں سناہ کی کے اجزاء عامل اس صورت میں ملتے ہیں۔ SENOSIDES -B7.5 gm رات سوتے وقت اس کی 2-4 گولیاں پانی کے ہمراہ کھائی جاتی ہیں۔ 20 گولیوں کا پیکٹ پونے دو روپے میں ملتا ہے۔ بازار میں سناہ کی سب سے اعلیٰ شکل ہے۔

PURSENNID کی گولیوں میں سناہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔

SENOSODIES - A & B

as Calcium Salt 12 mg

رات سوتے وقت 1-3 گولیاں کھائی جاتی ہیں۔ دس گولیوں کا پتہ سوا تین روپے میں ملتا ہے۔

LIQUORICE COMP POWDER- برٹش فارما کوپیا میں سناہ کی کا یہ اہم اور مقبول صنف اس نسخہ سے ترتیب پاتا ہے۔

برگ سناہ	SENNNA PODS	160	gm
گندھک	SULPHUR	80	gm
ملٹھی	LIQUORICE POWDER	160	gm
سونف	FENNEL	80	gm
کھانڈ	SUCROSE	520	gm

بچہ سالوں میں پہلے ہی زیادہ دیا جاتا تھا۔ کھانڈ کی وجہ سے ذائقہ برا نہیں رہتا۔ رات سوتے وقت 1-3 چھوٹے چمچے دودھ یا گرم پانی کے ساتھ کھا کر صبح اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔

## طب نبوی

قبض کے مسئلہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شاندار سائنسی طریقہ سے حل فرمایا ہے طب جدید تاج بھی اس سے بہتر لاکھ عمل تجویز نہیں کر سکی جس پر عمل کرتے ہوئے قبض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

### حفظ ماہی

انہوں نے اوقات خوراک متعین فرما کر معدہ اور آنتوں کے GASTRO COLIC REFLEX سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ جیسے کہ نمار منہ شد کا استعمال ان کی اپنی روز مرہ کی عادت تھی۔ انہوں نے ریشہ دار غذاؤں پر اصرار فرمایا۔ ان چھنے آنے کی تاکید فرمائی۔

اپنے دسترخوان کو سبز چیزوں سے مزین کرو۔

یہ ایک جامع ارشاد ہے۔ جو کہ بیٹ میں اتنا پھوک پیدا کرتا ہے کہ آنتوں میں انحراف کا عمل خیرد خوبی سے وقوع پذیر ہوتا رہے۔

### علاج بالانفا

قبض کی ابتدائی حالتوں میں انہوں نے ادویہ کی بجائے کھانے پینے کی چیزوں کو دوا کے طور پر استعمال فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ روایت فرماتی ہیں۔

(جب ان کے پاس کسی کو لایا جاتا کہ اس کو بھوک نہیں لگتی تو ارشاد ہوتا کہ اس کو جو کا سفید دلیا کھلایا جائے۔ پھر فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ پیغمبری عطا کی ہے۔ یہ بیٹ کو اس طرح صاف کر دیتا ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت کو اتار دیتا ہے)

یہ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کیونکہ جو میں باریک ریشہ کثیر مقدار میں ہوتا



ہے یہ پیٹ میں جا کر پھونتا ہے اور آنکھوں میں بوجھ کی کیفیت پیدا کر کے اجابت کے عمل کو تیز کرنا ہے۔ جو میں لحمیات کے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو جسم کو توانائی مہیا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو کمزوری کی وجہ سے قبض محسوس ہو رہی ہو تو جو کھانے سے اس کا مداوا بھی ہو جائے گا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کی میاں تک تعریف فرمائی کہ اسے جنت کا میوہ قرار دیا۔ ان کی زبان مبارک سے حضرت ابو ذرؓ روایت فرماتے ہیں۔

كَلُوا التَّيْنَ۔ فَلَوْ كَلْتُمْ اَنْ لَا كَهْتُمْ، نَزَلَتْ مِنْ الْجَنَّةِ قُلْتُ هَذِهِ  
فَاَنْ لَا كَهْتُمْ الْجَنَّةِ لَا عَجَمَ لَهَا لَكَلُّوْهَا فَاَنْهَا تَقَطُّعُ الْبَوَاسِرَ وَ  
تَنْفَعُ مِنَ النُّفُوسِ

(الدمحلی، ابن السنی، ابو نعیم)

(انجیر کھایا کرو۔ اگر مجھ سے کھا جائے کہ کیا کوئی پھل جنت سے زمین پر آسکتا ہے تو میں کہوں گا کہ ہاں! یہی ہے۔ یہ بلاشبہ جنت کا پھل ہے۔ اسے کھایا کرو کہ یہ بواسیر کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے اور تشنیا میں مفید ہے۔)

اسی مضمون کی حدیث ابو بکر ابن الجوزی نے حضرت ابو الدرداءؓ سے بھی روایت کی ہے۔ قرآن مجید نے اسے اتنی اہمیت دی کہ اسی کے نام پر ایک سورت نازل فرمائی اور پھر اس کی قسم کھا کر اس کی افادیت اشکارا فرمائی۔

حدیث شریف کے مطابق یہ بواسیر کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بواسیر پرانی قبض، جگر کی خرابیوں اور پیٹ کے آخری حصہ میں خون کی نالیوں میں دوران خون سست پڑ جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ ان کا علاج ہے تو مطلب یہ ہوا کہ انجیر قبض کو دور کرتی ہے۔ جگر کے لئے مصلح ہے اور خون کی نالیوں میں دوران کو درست کرتی ہے۔

بھارتی ماہر ادویہ نذکارنی اور ابن البطلون نے انجیر کو مقوی، واضح قبض قرار دیا ہے۔ ان کی رائے میں انجیر کی ساخت میں دودھ کی شکل کا ایک سیال ہوتا ہے۔ جو طبی طور پر قبض کشا ہے۔ انجیر میں موجود چھوٹے چھوٹے دانے پیٹ میں جا کر پھوں

جائے ہیں۔ ان کا اسبغول کی مانند پھولنا بھی قبض کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔  
 حضورؐ کی خوراک میں کدو اور مسور کی دال خاص طور پر شامل ہوتے تھے۔ یہ  
 دونوں چیزیں پھوک رکھنے کے علاوہ قبض کشا ہیں۔ بلکہ کدو میں اضافی فضیلت یہ ہے  
 کہ وہ دماغ کو طاقت دیتا۔ عقل کو بڑھاتا اور کسی بھی مقدار میں کھانے کے باوجود نہ تو  
 خون میں شکر کی مقدار بڑھاتا ہے اور نہ جسم کو موٹا کرتا ہے۔

جب یہ چیزیں غیر موثر یا کسی نے مدتوں ان سے فائدہ اٹھایا ہو اور بات ادویہ کے  
 استعمال کی آجائے تو انہوں نے مفید نسخے بھی عطا فرمائے ہیں۔

### قبض کے علاج میں ارشادات نبوی

حضرت اسماء بنت عمیسؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشدامن تھیں اور وہ ان کا  
 احترام کرتے تھے۔ فرماتی ہیں۔

قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما ذا کنت تستمشن  
 قلت یا نسیرم قال حار ثم استمشیت بالنساء فقال لو کان شی  
 یشفى من الموت کان النساء والنساء شفاء من الموت

(ابن ماجہ)

(مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں اپنے ہانپ کو چلانے کے لئے  
 کیا استعمال کرتی ہوں۔ میں نے بتایا کہ میں شیرم لیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا  
 کہ وہ تو بہت گرم ہے۔ پھر اس کے بعد میں ساء استعمال کرنے لگی کیونکہ  
 آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی چیز موت سے شفا دے سکتی ہے تو وہ ساء  
 ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ساء موت سے بھی بچاتی ہے۔)

حضرت عبداللہ بن حزامؓ بیان فرماتے ہیں۔

سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علیکم بالنساء  
 والنسوت فان فیہما شفاء من کل داء الا السام قبل رسول  
 اللہ وما السام قال الموت (ابن ماجہ، ابن عساکر، مستدرک الحاکم)

(میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ساء اور نسوت میں

ہر بیماری سے شفا ہے سام کے سوا۔ میں نے پوچھا کہ سام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ موت)

ترمذی، نسائی، طبری، ابن عساکر میں ام المومنین حضرت ام سلمہؓ ابو ایوب انصاریؓ حضرت عبداللہ بن عباسؓ، انس بن مالکؓ اور ابو نعیمؓ میں ابن مندہؓ سے اسی مضمون کی روایات تاکید مزید کے طور پر ملتی ہیں۔ جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور نے سنا کو فی الواقع شفا کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ احادیث میں سنا کے ساتھ سنوت کی شمولیت کی تحویل بعد کے لوگوں کے لئے مختص بن گئی۔ محدث عبداللطیف بغدادی کی رائے میں گھی والی مٹک میں شہد ڈال کر اسے خوب ہلا کر نکال لیں تو یہ سنوت ہے۔ دیگر علماء نے اسے سونف، زیرہ، کھجور وغیرہ قرار دینے کی کوشش کی ہے۔

ابن ماجہ کو سنا اور سنوت والی حدیث عمرو بن سعک کی وساطت سے میسر آتی تھی اور اس بارے میں شیخ سعک کا خیال ہے کہ اس میں سنوت سے مراد ”شبت“ (سویا) ہے۔ ہمارے یہاں سوئے کا ساگ عام ہوتا ہے اور اس کے بیج کا عرق نکال کر بد ہضمی اور پیٹ کی متعدد بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بچوں کی بد ہضمی کے لئے آنے والا مشہور سیال ”گرناپ واٹر“ بھی اسی جزو عامل سے مرتب ہے۔ انگریزی میں ان کو DILL کہتے ہیں اور گرناپ واٹر کی ہر خوراک میں سوڈا بائی کارب کے ساتھ OIL OF DILL کی معمولی مقدار ملی ہوئی ہے کیونکہ سوئے یا ان کا تیل پیٹ میں قوی نہیں پڑنے دیتے۔

سنا کی میں صرف ایک بری بات ہے کہ اس کو اگر براہ راست کھایا جائے تو اس سے پیٹ میں بل پڑتے ہیں اور صفحہ پیدا ہو سکتی ہے۔ برٹش فارما کوپیا میں اس کے ذیلی اثرات کو ختم کرنے کے لئے نسخہ میں سونف یا زیرہ کا تیل شامل کیا جاتا ہے۔ جبکہ اطباء قدیم کے اکثر نسخوں میں اورک تراشیدہ شامل کیا گیا ہے۔ ان مشاہدات کو سامنے رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے سنا کے ساتھ جس چیز سنوت کا تذکرہ فرمایا وہ قویج کو روکنے اور ریاح کو خارج کرنے والا جزو ہو گا اور جب اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو محمدؐ میں کرام نے جتنے بھی اندازے کئے ہیں

ان میں سے ہر ایک درست نظر آتا ہے۔ شہد اور زیرہ یا کھجور میں سے جس چیز کو بھی شامل کریں قونج کو روکنے میں یکساں مفید ہو گی۔ البتہ عمرو سنکلی کی دریافت سوائے دوسری چیزوں سے زیادہ مفید ہیں جس کا مشاہدہ گراپ وائر کے نسخہ میں کیا جا سکتا ہے۔

### طب یونانی میں سناء کا استعمال

سناء کی مفید قسم وہ ہے جو وادی مکہ میں پیدا ہوئی ہے۔ اس کے پتے نشتر کی شکل کے اور دونوں طرف سے چکنے ہوتے ہیں۔ ان کی پھلی گول اور پھول سبزی مائل سنہرے لگتے ہیں۔ اس کا جع مصر میں بویا گیا مگر زمین کی وہ تائید حاصل نہ ہو سکی۔ اسی طرح بھارت اور سکھر میں پیدا ہونے والی سناء فوائد کے لحاظ سے تیسرے درجہ پر ہے کیونکہ ان میں اجزاء عاقل کی مقدار کم ہوتی ہے۔

اطباء نے سناء کا استعمال دسویں صدی سے شروع کیا۔ البتہ یو علی سینا اسے مفید قرار دے چکے تھے۔ عربوں کو دیکھ کر بھارتی وید بھی اس کے مداح ہو گئے اور اب اس سے متعدد عمدہ نسخے مرتب ہوئے ہیں۔

برگ سناء۔ سوٹھ تراشیدہ۔ آب مقطر

160 گرام 31/2 گرام ایک لیٹر

ان کو چینی کے برتن میں 2-3 گھنٹے پڑا رہنے دیں۔ پھر چھان کر خیساندہ علیحدہ کر لیں۔ اس کے دو گھونٹ عام طور پر کافی ہوتے ہیں۔

برگ سناء سوٹھ تراشیدہ لوگ پانی

2 1/2 تولہ 31/2 تولہ 31/2 تولہ 25" تولہ

ان کو ملا کر ایک گھنٹہ چینی کے برتن میں رکھ کر بلائیں۔ پھر چھان کر 31/2 سے 5 تولہ کی مقدار کو قبض کے لئے دیں۔

ان دونوں نسخوں میں ادراک اور لوگ کی وجہ سے قونج نہ ہو گا۔ اگر کوئی چاہے تو مزید اصلاح کے لئے کھانڈ کا اضافہ کر سکتا ہے۔ ان کو پینے کے دو گھنٹہ بعد پیشاب میں سرخی آجاتی ہے۔ جس کا کوئی مضائقہ نہیں۔

ثناء کے قبض کشا ہونے کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں۔ جن میں جلد کی بیماریاں۔ بالوں کا گرنا، پھنسیاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کیونکہ اس میں ایک نہایت مفید جراثیم کش دوائی DONOMYCIN بھی ہوتی ہے۔

بیسویں صدی کے نصف تک نباتاتی اور کیمیائی ذرائع سے حاصل ہونے والی قبض کشا ادویہ کی تعداد سو سے زائد تھی۔ مگر بیس سال کے اندر 95 دوائیاں متروک ہو گئیں ہیں۔ اور آج طب جدید کے پاس قبض کو رفع کرنے والی ادویہ کی کل تعداد پانچ سے زیادہ نہیں جن میں سے ایک سنا ہے اور دوسرا اسبغول دوسرے الفاظ میں ایک ہزار سال کے مسلسل مشاہدات کے بعد سنا کی وہ منفرد دوائی ہے جو آج بھی اتنی ہی مقبول اور قابل اعتماد ہے جیسی کہ پہلے تھی اس سے حاصل ہونے والے فوائد کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ جیسے کہ بالوں کو رنگنے اور گرتے بالوں کو روکنے یا سر اور جسم سے بھدہ اور انگڑیا کو دور کرنے میں از حد مفید پایا۔

### نہتون

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے علاج میں ایک اہم اضافہ نہتون کے تیل کی صورت میں فرمایا ہے۔ اگرچہ ان سے پہلے دور کے اطباء اس تیل سے آشنا تھے مگر وہ اسے ایک عام تیل سے زیادہ اہمیت نہ دیتے تھے۔ البتہ مصر قدیم میں اس کی مقبولیت اس کی روشنی رہی ہے۔ کیونکہ اسے جب دیئے میں جلایا جائے تو دھواں نہیں دیتا۔ جو چیز اس میں رکھی جائے اس میں سزاند پیدا نہیں ہوتی۔ اس لئے بادشاہوں کی لاشوں کو حنوط کرنے کے عمل میں نہتون کا تیل اہم کردار تھا۔ آجکل بھی ڈپوں میں بھجھلیاں اسی تیل میں بیک ہو کر آتی ہیں اور کئی سال تک ان کا گوشت تازہ اور لذیذ رہتا ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ النحل، النور، المؤمنون اور التین میں اس کی یہاں تک تعریف فرمائی کہ اس کو ایک مبارک درخت کا پھل قرار دیا۔ پھر اس کی عادات اور فوائد پر خصوصی غور و فکر و توجہ دینے کی تلقین فرمائی گئی۔

حضرت اسید الانصارؒ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

كلوا الزيت وادهنوا به فان من شجرة مباركة

(ترمذی ابن ماجہ بخاری)

(اس تیل کو کھاؤ اور لگاؤ کیونکہ یہ ایک مبارک درخت سے ہے)

یہی روایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے بیٹی اور ابن ماجہ نے بیان کی ہے۔ تیل کی اہیت کو اجاگر فرمانے کے بعد حضرت علقمہ بن عامرؓ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

عليكم بزيت الزيتون كلوه وادهنوا به لانه تنفع من البواسير

(ابن الجوزی)

(تمہارے لئے زیتون کا تیل موجود ہے اسے کھاؤ اور لگاؤ یہ بواسیر میں فائدہ

دیتا ہے)

احادیث میں زیتون کے تیل کو 70 بیماریوں کے لئے اسیر قرار دیا گیا ہے۔ جن میں ہمارے موجودہ موضوع میں بواسیر اہیت کی حامل ہے۔ بواسیر کا اہم ترین سبب پرانی قبض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیتون کا تیل نہ صرف کہ قبض کو دور کرتا ہے بلکہ آنکھوں کے دوران خون میں بہتری پیدا کرتا ہے۔ اس طرح آنکھوں کے آخری حصہ میں جمع ہو کر مسے بنانے والے خون کو پھر سے گردش میں لا کر مسوں کا سبب دور کر دیتا ہے۔ ہم نے پرانی قبض کے مریضوں کو رات کو سوتے وقت ایک سے دو بڑے چمچے زیتون کا تیل پلایا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور کوشش نہ بھی کی گئی ہو تو اس کے باوجود اسی مقدار سے قبض دور ہو کر فراغت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دوائی کی طرح اسے خالی پیٹ استعمال کرنا بہترین فوائد کا باعث ہوتا ہے۔ بعض لوگ تیل کے ساتھ دودھ یا چائے پسند کرتے ہیں جو کہ درست نہیں۔

ختم رحمان

قبض کے لئے اسبغول بڑی مشہور دوائی ہے۔ اور اب طب جدید میں یہ مختلف صورتوں میں بیرونی ممالک سے بھی آتا ہے۔ وہ فوائد جو اسبغول میں ہیں اس سے کہیں زیادہ رحمان میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابی عثمان المذنیؒ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا۔

اذا اعطى احدكم الريحان فلا يردده فانما خرج من الجنة (ترمذی)

(جس کو ریحان پیش کیا جائے وہ انکار نہ کرے کہ یہ جنت سے آیا ہے)

انہوں نے اپنے پیارے نواسوں کو دنیا کے ریحان قرار دیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا کہ اپنی عمدہ خوشبو کے ساتھ نہایت لطیف عمل کرنے والا ہے۔

قرآن مجید نے سورۃ الرحمن میں جنت میں مئے والی بہترین چیزوں کو شمار میں لاتے ہوئے ریحان کو وہاں کا تحفہ قرار دیا۔ سورۃ الواقعة میں اس کی خوشبو کو لطیف فرمایا گیا۔

کھانا کھانے کے دوران تخم ریحان کا آدھ چھوٹا میچ ڈگر پانی کے ساتھ نگل لیا جائے تو یہ پیٹ میں جا کر پھولتا اور آنتوں میں حرکات پیدا کر کے قبض کو دفع کرتا ہے۔ ابتدا میں بعض مریضوں کو ایسی خوراک دن میں دو مرتبہ دی جاتی ہے۔ پھر مشاہدے سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کون سے کھانے کے ساتھ ریحان کھانے سے مطلوبہ فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو اپنے لئے مشعل راہ بنانے میں ہمیشہ رو کھدی۔ لوگوں نے کبھی شد کو گرم اور انجیر کو خشک بنایا لیکن باہر والوں نے ان کی اتنی قدر کی ہے کہ امریکہ کی ایبٹ کمپنی نے ایک نیا مسلسل FIBERAD کے نام سے پیش کیا ہے جو آنے کے چھان اور اسبغول سے تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت ام ایمنہؓ کی دعوت سے سُننے کے چھان کی اہمیت جان کر اس میں اسبغول ملا کر 70 روپے کا ڈبہ تیار کر لیا۔ جسے آجکل بڑی مقبولیت حاصل ہے۔

خلاصہ

اس وقت بازار میں طب جدید کی صرف چھ ادویہ قبض کے لئے ملتی ہیں۔ جن میں سے ایک سناکی سے مرتب ہے جب کہ خالص انگریزی دوائی DULCOLAX کی گولیاں ہیں۔ ان کے علاوہ اشتہاری دوائی فروٹ سالٹ مشہور ہے۔ ایمنہ کے لئے KLEEN کا بند ڈبہ یا بچوں کے لئے گلیسرین کی بٹیاں ملتی ہیں۔

اسبغول کے مرببات میں KANORMAI, SIBLIN, VISIBILEN, ISOGL, AGIOLAX, FIBERAD فٹے ہیں۔  
 ماہرین کی تازہ ترین رائے کے مطابق قبض کا علاج ادویہ کی بجائے غذا میں ریشہ دار  
 اشیاء کے استعمال میں اضافہ (پھل اور سبزیاں) سے کیا جائے۔ آج کے تمام  
 مشاہدات اور ایک ہزار سال کے تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نبی صلی  
 اللہ علیہ وسلم نے قبض کے علاج میں جو ارشادات مرحمت فرمائے ہیں سائنس اپنی  
 تمام تر کاوشوں کے باوجود ان کے برابر بھی نہیں آسکتی۔ ان کے اہم نکات کا خلاصہ یہ  
 ہے۔

- کھانا وقت پر کھایا جائے۔
- رات کے کھانے کے بعد جلد نہ سویا جائے اور پیدل چلا جائے۔
- کھانے سے پہلے تروزی یا فروزہ پیٹ کو صاف کرتا ہے۔
- ناشتہ میں جو کادلیا آنتوں کو صاف کرتا ہے۔
- ریشے دار غذائیں کھائی جائیں جیسے کہ سبزیاں یا پھل۔
- آٹا چھان کر نہ پکایا جائے کیونکہ اس کی بھوسی قبض اور دل کا علاج ہے۔
- خشک انجیر کے 3-2 دانے ہر کھانے کے بعد کھانے سے نہ صرف قبض ختم ہو  
 جاتی ہے بلکہ یہ بوا میر کا علاج بھی ہے۔
- ان تمام کوششوں کے باوجود اگر قبض میں بہتری نہ ہو تو سب سے پہلے  
 زیتون کا تیل استعمال کریں۔ یہ محفوظ اور مفید ہے۔
- تمام ادویہ سے ٹھیک نہ ہونے والی قبض کے لئے سناکی استعمال کی جائے  
 اس کے استعمال کے دسی نسخے بیان کر دیئے گئے ہیں۔ ورنہ بازار میں غنے والی  
 SEKNOKOT یا PURSENNID کی دو گولیاں اس کا قابل عمل حل ہیں۔
- اگر ان تمام کوششوں سے قبض دور نہ ہو یا اس کے ساتھ درد، سوزش یا بخار  
 ہو تو ایسے میں آنتوں میں رکاوٹ یا اپنڈکس کا شبہ کیا جاسکتا ہے۔ جس کے لئے خود  
 علاج کرنے کی بجائے کسی مستند معالج سے رجوع کریں کہ یہ بیماریاں خطرناک ہو سکتی  
 ہیں۔



## ہوا سیر

### HAEMORRHOIDS (PILES)

انسان نے جب سے آرام طلب زندگی اختیار کی ہے اور جب سے اس نے نہیں اور پر تکلف خوراک اپنائی ہے اس وقت سے ہوا سیر کی بیماری اس کے لئے اذیت کا مستقل سامان بنی رہی ہے۔ طب میں ہوا سیر اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں پانخانہ والی جگہ کے آس پاس کناروں پر سے نمودار ہوتے ہیں۔ اطباء قدیم نے اس کو خونی اور بادی اقسام میں بیان کیا ہے۔ بادی سے مراد مسوں کا وجود ہے۔ اس میں جلن ہوتی ہے۔ یہ پھوں جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کے ساتھ مقعد کے کنارے اور اندر کی نصیمیاں زور لگانے پر باہر کی سمت الٹ جاتی ہیں۔ خونی قسم میں قبض یا اجابت کے دوران زور لگانے پر پھولے ہوئی مسوں میں سے کوئی ایک پھوٹ جاتا ہے جس سے خون بنے لگتا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض مریضوں کو جس روز خون آتا ہے اس وزن کو قبض نہیں ہوتا۔

اطباء قدیم باہر سے نظر آنے والے ہوا سیر کے مسوں کو ان کی شکل و صورت کے لحاظ سے توتی، انگوری، انجیری اور کھجوری وغیرہ کے ناموں سے بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی دریدوں میں جب فہراؤ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پھوں کر کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی ہیں۔ یہ شکل انگور جیسی ہو یا توت جیسی۔ لیکن اصول علاج ان سب قسموں کے لئے یکساں ہے۔

طب جدید میں ہوا سیر کو اس کے مسوں کے محل وقوع کے اعتبار سے بیان کیا جاتا

ہے۔ سے اگر باہر ہوں تو وہ EXTERNAL PILES اندر ہوں تو INTERNAL PILES اور ایک قسم ایسی ہے جس میں سے اندر بھی ہوتے ہیں اور باہر بھی جسے INTERNAL EXTERNAL PILES کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔

بواسیر کا اہم ترین سبب پیٹ کے نچلے حصے اور ٹانگوں کے دوران خون میں ٹھہراؤ بیان کیا جاتا ہے۔ جو لوگ پیدل نہیں چلتے سارا دن گدے دار کرسیوں پر بیٹھے رہتے ہیں ان کی خون کی ٹالیوں میں دوران متاثر ہوتا ہے اور مقعد اور اس سے اوپر کی وریدیں پھول جاتی ہیں۔ پہلے خیال تھا کہ بواسیر کو پیدا کرنے میں جگر کی خرابی کا بھی بڑا دخل ہے۔ لیکن ایڈنبرا کے ایک سرجن میکفرسن نے بواسیر کے 150 مریضوں کے جگر ہر لحاظ سے چیک کئے اور ان میں سے کسی ایک کا بھی جگر خراب نہ پایا گیا۔ جس سے اب یہ نظریہ زیادہ قوت پکڑ رہا ہے کہ بواسیر جگر کی خرابیوں سے پیدا نہیں ہوتی۔

آج کے ماہرین اس کا اہم ترین سبب وراثت قرار دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو بواسیر کی بیماری رہی ہو ان کی اولاد کی خون کی ٹالیاں بھی کمزور ہوتی ہیں اور وریدوں کی دیواروں کی کمزوری ان کو بھی بواسیر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی باعث 23 سال کے بچوں کو بھی بواسیر کے سے اور جانب کے ساتھ خون آتے دیکھا گیا ہے۔

جانوروں کو بواسیر نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ چار پیروں پر چلتے ہیں تو ان کے مقعد کے ارد گرد کی وریدوں پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑتا۔ اس لئے ان کی وریدوں کی دیواریں پچک کر سے نہیں بنا سکتیں۔ جبکہ انسان دو پیروں پر چلتا ہے اور مقعد کے ارد گرد کی وریدوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور وہ کمزور پڑنے پر مسوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔

بواسیر کے سے پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ پرانی قبض کی وجہ سے مریض اجابت کے لئے جب زور لگاتا ہے تو پیٹ کے اندر دباؤ بڑھنے کی وجہ سے ان میں خون بھرنا اور کمزور دیواروں کی وجہ سے خون بنے لگتا ہے۔ قبض کے برعکس مزمن اسہال پیچش اور جلاب کی دواؤں کے مسلسل استعمال کی وجہ سے بھی دباؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور خون بنے لگتا ہے۔ یونانی زبان اور طبی اصطلاح میں ان کو HAEMORRHOIDS کہتے ہیں۔ جس کے لفظی معنی خون بہنا ہے۔ 1370ء کے

ایک فرانسیسی ادیب نے ان کے بارے میں ایک دلچسپ بات کہی ہے۔

”عام لوگ ان کو PILES کہتے ہیں۔ جبکہ روڈا سے HAEMORRHOIDS

کہتے ہیں۔ فرانس کے لوگ ان کو انجیر کہتے ہیں۔ میرے لئے اس کے نام میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میری دلچسپی اتنی ہے کہ کیا تم ان سے اگر میری جان چھڑا سکتے ہو۔“

خواتین میں حمل کے دوران بیٹ کے اندر خون کی نالیوں پر بوجھ اور دباؤ سے

اکثر بواسیر ہو جاتی ہے۔

بواسیر کا اہم ترین اور خطرناک سبب بڑی آنت کا کینسر ہے، آنت میں کینسر کے

بوجھ اور اس کی وجہ سے دوران خون میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور دریدیں پھول کر

بواسیر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ایسے ایسے ماہریناں غلطی کھا جاتے ہیں۔ مدتوں بواسیر

کا علاج ہوتا رہتا ہے اور جب بات کھلتی ہے تو علاج کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس

لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بواسیر کے ہر مریض کا اوزار ڈال کر اندرونی معائنہ کیا

جائے اگر مقعد کی نالی میں کوئی رسولی ہوئی تو آسانی سے نظر آجائے گی۔

### بواسیر کی علامات

مسوں کی موجودگی اور ان سے خون بہنا بواسیر کے اہم نکات ہیں۔

بواسیر کے مسوں کی موجودگی کو بیماری کا پہلا درجہ قرار دیا جاتا ہے۔ اگر سے

اجابت کے دوران الٹ کر باہر آجائیں یا ان کے ساتھ مقعد کی جھلی بھی باہر آجائے تو

اس کو دوسرا درجہ کہتے ہیں۔ اس میں شرط یہ ہے کہ جھلیاں اور سے جب ایک مرتبہ

اندرواطل کر دیئے جائیں تو پھر وہ بقیہ وقت اپنے اصل مقام پر ہی رہیں۔

جب سے اور جھلی اجابت کے دوران الٹ کر باہر آجائیں اور معمولی کوشش سے

بھی اندر نہ جائیں تو بیماری کا تیسرا درجہ ہوتا ہے۔

بواسیر جب تیسرے مرحلہ تک آتی ہے تو اس میں سوزش، مقعد پر خارش، بوجھ،

جلن اور بخار ہوتے ہیں۔ جب جھلیاں باہر لٹک رہی ہوں تو ان سے لیس دار رطوبت

نکل کر کپڑے خراب کرتی ہے۔ اگر اضافہ میں سوزش ہو جائے تو پھر خون اور پیپ

بھی نکلنے رہتے ہیں۔

## پہچیدگیاں

مائدہ عورتوں کے ہیٹ میں بوجھ کی وجہ سے ہاضمہ اور اجابت کا سارا سلسلہ مڑ ہو جاتا ہے۔ ان کو بواسیر کی وجہ سے جب خون آتا ہے تو اس سے ان کو خون کی کمی اور بڑھ جاتی ہے۔

مسوں میں سوزش کی وجہ سے وہاں پھوڑا بن جاتا ہے۔ اس پاس کا سارا علاقہ ورم کی زد میں آجائے تو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی اس میں چپ پڑ جاتی ہے اور معاملہ لمبا ہو کر آپریشن کی فوری ضرورت تک آجاتا ہے۔

## علاج

بواسیر کی مشکل قسم وہ ہے جب یہ بڑی آنت کے کینسر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لئے ادویہ سے علاج نامناسب اور خطرناک کام ہے۔ حمل کے دوران بواسیر اگر تکلیف دے تو اس کا علاج مرضوں اور ملین تیلوں سے کیا جائے۔ عام طور پر لیکوٹ پیرافین کے مرکبات جیسے کہ CREMAFIN وغیرہ یا AGAROL دے کر قبض نہ ہونے دیں۔

دوسرے مریضوں کے لئے اسفیول کو طب جدید نے بہترین قرار دیا ہے۔ اس کے فیشن ایبل مرکبات AGIOLAX - KANORMAL - VISIBLIN کے نام سے ملتے ہیں۔ اسفیول آنتوں میں جا کر پھول جاتا ہے جس سے قبض نہیں ہوتی اور یہ پاخانہ میں اپنی لیس شامل کر کے اس کے اخراج کو آسان بنا دیتا ہے۔ شدید قبض کے مریضوں کو شام کی دلائی گولیاں تجویز کی جاتی ہیں۔ مثلاً PURSENNID - SENOKOT کی دو گولیاں رات سوتے وقت کافی رہتی ہیں۔ AGIOLAX کے نسخہ میں اسفیول کے ساتھ شام کی بھی شامل ہوتی ہے جس سے دونوں مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔

بواسیر کا سارا زور نچلے حصہ پر ہوتا ہے۔ اس لئے طب جدید میں ابتدا سے ہی اسے مزہم تیار کئے جاتے رہے ہیں جن کو لگانے سے مسوں میں درد۔ جلن اور تیارش

رفع ہو جائیں۔ وہاں پر درم نہ رہے اور اس طرح خون نہ بہے۔ برٹش فارما کوہیا میں  
 الفون اور مازو سے بنا ہوا ایک مرہم UNG - GALL CUM OPII تجویز کیا گیا تھا  
 جو بے فائدہ ہونے کے باوجود خاصا مقبول رہا ہے۔ گلیسرین اور نیک ہسٹ کی مرہم بھی  
 شہرت رکھتی ہے۔ اب دوا ساز کمپنیوں نے مسوں کی سوزش کے علاج میں مختلف ادویہ  
 کو ملا کر اپنی دانست میں آرام دینے والے نئے تیار کئے ہیں جن میں ایک مرہم مقامی  
 طور پر سن کرنے والی دوائی LIGNOCAINE سے تیار کی گئی ہے۔ اسی طرح  
 - HADENSA - PROCTOID - ANUSOL SCHERIPROCT  
 ULTRAPROCT کی مرہمیں مشہور ہیں۔ ان سے مریضوں کو وقتی فائدہ ہو جاتا  
 ہے۔

طبع جدید میں قبض کے علاج کے علاوہ بواسیر کے مریضوں کو کھانے کی کوئی  
 دوائی نہیں دی جاتی۔ چند سال پہلے ایک گولیاں بازار میں آتی تھیں، ان کا دعویٰ تھا کہ  
 ان سے بواسیر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن کسی کو شفا یاب ہوتے دیکھا نہیں گیا۔ سوزش  
 پھوڑا یا دوسری پیچیدگیوں کے لئے حالات کے مطابق علاج کیا جا سکتا ہے۔

## انجکشن

پہلے اور دوسرے درجہ کی وہ بواسیر جس سے خون بہتا ہو کو انجکشن سے فائدہ ہو  
 سکتا ہے۔ روغن بادام میں 5 فیصد کاربالک ہسٹ (PHENOL) ملا کر یہ دوائی مقعد  
 میں اوزار سے ڈال کر بواسیر والی دریدوں کے خراج کے ساتھ جھلی کے نیچے ایک  
 خصوصی سرنج اور سوئی سے 4cc داخل کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر ایک گومڑ بن جاتے  
 اور یہ ابھار درید کو دبا کر اسے بند کر دیتا ہے۔ اس طرح خون بہنا تو ایک دو دن میں  
 بند ہو جاتا ہے۔ اور اکثر مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔

اس نیچے کی دوائی اور اوزار خصوصی طور پر تیار کئے جاتے ہیں۔ ان کی تیاری  
 کسی ایسے ہسپتال میں درست طور پر ہو سکتی ہے۔ جہاں اوزاروں اور دوسری چیزوں کو  
 جراثیم سے پاک کرنے کا معقول بندوبست موجود ہو۔ بعض اشتہاری اداروں کے  
 1 سے میں سنا گیا ہے کہ وہاں لوگوں کو یہ نیکہ لگایا جاتا ہے۔ اس نیکہ کو لگانے والا ماہر

سرجن ہونا چاہئے۔ کیونکہ اسے درست جگہ پر اور صحیح طور پر لگانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اماڑی لگانے والوں کے ہاتھوں سے افسوسناک حادثات اکثر دیکھنے میں آتے ہیں۔

### اپریشن

اکثر اکثر بوا سیر میں انجکشن لگانا پسند نہیں کرتے اور ان کے نزدیک اس کا بہترین اور پائیدار علاج اپریشن ہے۔ مریض کے جسم کے نچلے حصہ کو سن کرنے یا بیہوش کرنے کے بعد اس کی مقعد کے ارد گرد کی تمام چیزیں کاٹنے کے بعد سرجن ان دریعوں کا منبع تلاش کرتے ہیں جو پھول کر سے بنا کر لگ جاتی ہیں۔ اپریشن کے بعد اکثر سرجن زخم کو ٹانگے نہیں لگاتے اور زخم کے اندر مصفاہی کی کافی مقدار داخل کر کے پاخانے کا راستہ عملی طور پر بند کر دیتے ہیں۔ یہ پٹی تیسرے روز نیم بیہوشی کی حالت میں نکالی جاتی ہے۔ اس وقت تک اجابت بند کر دی جاتی ہے اور پھر اجابت کی اجازت ملتی ہے تو خاصی تکلیف ہوتی ہے۔ فراغت کے بعد مریض کو جراثیم کش ادویہ کے ٹپ میں بلٹھایا جاتا ہے اور زخم ہفتہ بھر کے بعد مندمل ہو جاتا ہے۔

بدقسمتی یہ ہے کہ اکثر سرجن یہ اپریشن ایسے نامکمل انداز میں کرتے ہیں کہ بوا سیر دوبارہ ہو جاتی ہے۔ اپریشن کے عذاب اور کثیر اخراجات کے بعد پھر اسی مرحلے سے دوبارہ گزرنا آسان کام نہیں۔ گویت یونیورسٹی کے لئے بوا سیر پر تحقیقی مقالہ لکھتے وقت ہم نے سرجری کے تین بہترین استادوں پروفیسر امیر الدین، پروفیسر حاتی ریاض قدیر اور پروفیسر ایچ ایچ مرزا صاحبان سے اس اپریشن کے بارے میں مشورہ کیا اور ان سے اپریشن کے بعد بوا سیر کے دوبارہ ہو جانے کے سلسلہ میں سوال پوچھا۔ ان تینوں استادوں کی رائے میں اپریشن کرنے والا اگر دریعوں کو ان کی جڑ سے کھینچ کر نہ لائے تو بوا سیر اسی صورت میں دوبارہ ہوتی ہے۔ یعنی اپریشن کرنے والے نے نیم دلی سے یہ کام کیا ہو تو دوبارہ ہوتی ہے ورنہ نہیں۔

## طب یونانی

طب یونانی میں مفید ادویہ کا ایک عظیم ذخیرہ موجود ہے۔ جس میں ہر بیماری اور حالت کے مطابق مناسب دوائیں موجود ہیں۔ اگر ایک سے فائدہ نہ ہو تو اس کے بدل میں دس بھی مل سکتی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نسخہ لکھنے والا دواؤں کے اثرات اور ان کی مہیت سے آشنا ہو۔ مشہور اطباء کی مباحث سے نسخہ نقل کرنے والا کام علم کی ترقی میں رکاوٹ اور مریضوں کے لئے مفید نہیں ہوتا۔ اطباء قدیم نے بو اسیر کے علاج میں زیادہ تر ایسی ادویہ استعمال کی ہیں جو پرانی قبض کو دور کرتی تھیں۔ اس سے اکثر کو فائدہ ہوا۔ لیکن مقدمہ میں دوران خون کی ست رفتاری کا مسئلہ محتاج توجہ رہا۔ بنے والے خون کو روکنے میں بکائن بڑی مفید ہے۔ آریو ویدک طب کی یہ نہایت مفید دوائی خونی بو اسیر میں دوسری دواؤں کے ساتھ مل کر خون بند کرنے میں لاجواب ہے۔ ایک مشہور نسخہ میں رسونت کو عرق گلاب میں کھل کر کے اس میں ختم نیم۔ ختم بکائن اور گل ارمنی کو آب گندما میں کھل کر کے گولیاں بنائی جاتی ہیں۔

ختم نیم، ختم شتالو اور رسونت کو آب ترب میں کھل کر کے گولیاں بنائی جاتی ہیں۔ برادہ صندل، الہچی خورد، اندر جو شیریں اور تلخ، دم الاخوین، متیس، مرجان بسد، کانور، سہامہ کو مختلف صورتوں میں تیار کر کے شربت انجبار یا شیرہ بارنگک کے ساتھ دیا جاتا ہے۔

حکیم کبیر الدین نے بو اسیر کے لئے جو نسخے ترتیب دیئے ہیں ان میں سے دو بطور نمونہ پیش ہیں۔

گندھک آملہ سار مدربہ شیر گاؤ رسونت مصفی آرد ہندقی ہندی

1 قولہ 1 قولہ 1 قولہ

ہجو کھار مغز ختم نیم کشتہ سونا کبھی در برگ ستا

1 قولہ ڈیزھ قولہ 9 ماشہ

ان کو پیس کر پنے برابر گولیاں بنا کر 2 گولی صبح شام کھن میں ہمراہ عرق کاسنی دیں۔

ایک دوسرے نسخہ میں تجویز ہوا۔

ترہلہ مغز خم نیم یک سالہ خم ترب یکسالہ رسوت مصفی

15 تولہ 15 تولہ 15 تولہ

شکر سفید، خم نیم اور مکھن ہر حکیم کے نسخہ میں پایا گیا۔

حکمر صحت پنجاب کے ایک افسر ایک روز ایک ایسے حکیم کے مطب کے باہر انتظار میں تھے جو کچھ عرصہ پہلے خود کسی دفتر میں کلرک تھے۔ افسر صاحب ان سابقہ کلرک سے ہواسیر کا علاج کروانے آئے تھے۔ معلوم ہوا کہ چھ ماہ سے زیر علاج ہیں۔ تیس روپے ہفتہ کی دولتی سے اب قبض کو ناکندہ ہے۔ مگر ہواسیر وکی لیا ہے۔

اور بھی بہت سے ایسے مریض دیکھے گئے جو اپریشن کی دہشت کی وجہ سے ایسے استشاری حکیموں کے زیر علاج ہیں جو جسم انسانی سے تو درکنار اپنے نسخہ کے اثرات سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ مرض تو خیر کیا ٹھیک ہو گا مسلسل جلاب سے اپنی آنکھوں کا ستیاناس کروا لیتے ہیں۔

اطباء نے اسے غلیظ خون کے فساد یا صفراوی اسباب سے قرار دیا ہے اور قصد کرنا مفید بتایا ہے۔

## طب نبوی

ہواسیر ان چند بیماریوں میں سے ہے جن کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست عطا فرمایا اور اس سے بچاؤ کے متعدد طریقے بھی بتلائے۔

غذا کے نظام ادوات کا تعین فرما کر انہوں نے قبض کا بندوبست فرما دیا۔ بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح جلد کیا جائے۔ رات کا کھانا جلد اور ضرور کھایا جائے۔ کھانے کے بعد پیول سیر کی جائے اور دن میں بھی متعدد مرتبہ پیول چلنے کی صورت پیدا کی جائے۔ خوراک میں سبزیوں کی شمولیت اور روٹی میں چھان کو شامل کرنے کو اہمیت دی۔ یہ تمام امور ہیں جن پر عمل کرنے والے کو ہواسیر نہ ہوگی۔ اگر ہو جائے تو پھر قبض کے



بدولست میں ایک ایسی دوا مرحمت فرمائی کہ وہ آج بھی جدید ترین سمجھی جاتی ہے۔  
ایڈنبرا میں ہواسیر کے علاج پر تحقیق کرنے والوں کے مشاہدات کے مطابق ایسے  
مریضوں کے لئے بہترین جلاب ساء کی ہے۔ کیونکہ یہ آنتوں میں خراش پیدا نہیں  
کرتا۔ اس سے اسہال نہیں ہوتا۔ اسے کسی اندیشہ کے بغیر کافی عرصہ استعمال کیا جا  
سکتا ہے اور اس کے رد عمل سے قبض نہیں ہوتی۔

حضرت ابو الدرداءؓ روایت فرماتے ہیں۔

اھدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم طبق من تین فقال کلوا و  
اکل منه و قال لو قلت ان لا کھتہ نزلت من الجنتہ فقلت ہذہ  
لان لا کھتہ الجنتہ بلا عجم لکلوا منها فانھا تقطع البواسیر  
وینفع من النقرس

(ابوبکر الجوزی)

(نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک تھال تحفہ آیا۔ انہوں  
نے لوگوں کو کھا کر اس میں سے کھاؤ۔ اگر کوئی کہے کہ اگر کوئی پھل جنت  
میں سے زمین پر آسکتا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ یہی ہے۔ بلاشبہ یہ جنت کا  
میوہ ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں اس کو کھاؤ کہ یہ ہواسیر کو کاٹ کر  
پیچنک دیتی ہے اور نقرس میں فائدہ دیتی ہے۔)

اسی روایت کو دہلوی، ابن السنی اور ابو نعیم نے حضرت ابو ذرؓ سے بھی بیان کیا  
ہے جس میں قطع البواسیر کی جگہ یدھب بالبواسیر بھی آتا ہے۔

انجیر میں گلوکوس والی سطحاس کی مقدار 2-6 فیصدی تک ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ  
درخت پر پک چکی ہو تو سطحاس کی مقدار 3-8 فیصدی کے درمیان رہتی ہے۔ اس میں  
نشاستہ 'گلوکوس' لحمیات اور چکنائیوں کو ہضم کرنے والے خامرے ENZYMES  
معتول مقدار میں ملتے ہیں۔ اس لئے کھانے کے بعد انجیر کھانے سے کھانا ہضم ہو جاتا  
ہے جن لوگوں کو کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ ہوتا ہے ان کو اس کے کھانے سے  
آرام آجاتا ہے اور پیٹ سے ہوا نکل جاتی ہے۔

انجیر بنیادی طور پر قبض کشا ہے۔ اس میں ایک خاص قسم کا دودھ ہوتا ہے جو لطین اثرات رکھتا ہے۔ انجیر میں پائے جانے والے پھوٹے پھوٹے دانے معدہ کے تیزابوں میں جا کر پھول جاتے ہیں اور اس طرح آنتوں میں بوجھ کی کیفیت پیدا کر کے قبض کشائی کا باعث بنتے ہیں۔

حکیم جالینوس کہتا ہے کہ انجیر اور کلونچی کو نمار منہ کھانے والا ذہروں کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ انجیر بھوک لگانے والی۔ سکون آور، دافع سوزش و اورام، لطین، جسم کو لٹنڈک پہنچانے والی اور نخرج بلغم ہے۔ کچھ مدت کھائی جائے تو پتہ اور گردوں سے پتھریاں گھا کر نکال دیتی ہے۔ محمد احمد ذہبی اسے پیاس کو مٹانے والا اور آنتوں کو نرم کرنے والا قرار دیتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کے علاج میں اکثر اوقات غذائی عناصر کو استعمال فرمایا ہے۔ جب وہ کسی غذا کو دوا کے طور پر دیتے ہیں تو اسے نمار منہ کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس طرح وہ پوری مقدار میں جذب ہو کر آنتوں اور جسم کے اندر اپنے افادات کا پورے اطمینان سے مظاہرہ کر سکتی ہے۔ نمار منہ 5-6 دانے انجیر کھانے سے حیات کی جملہ خرابیوں کی اصلاح کے ساتھ خون کی ٹالیوں اور دوسرے غیر ارادی عضلات سے بوجھ کو ختم کرتی ہے۔ ہم نے اسے پتے اور گردوں کی پتھریوں کو نکلانے کے ساتھ ذیابیطس کے مریضوں میں خون کی ٹالیوں کی بندش جیسے کہ (BUERGER'S DISEASE) میں از حد مفید پایا ہے۔

جب کسی مریض کا کھانا وقت پر ہضم ہو گا۔ اس کی خون کی ٹالیوں سے غلاقت نکل جائے گی اور جگر کی اصلاح ہونے کے ساتھ قبض نہ رہے گی تو بواسیر کا ختم ہو جانا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ انجیر بواسیر کے تمام اسباب کو ختم کر دیتی ہے۔ انجیر کھانے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اسے نمار منہ کھایا جائے اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کھانے سے آدھ گھنٹہ پہلے کھالیا جائے۔

حضرت عقیلم بن عامرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

عليكم بهت الزيتون كلوه وادخنوا به فانه يفتح من البواسير  
(ابن الجوزي)

(تمہارے لئے زیتون کا تیل موجود ہے اسے کھاؤ اور لگاؤ کیونکہ بواسیر میں  
فاقہ دیتا ہے۔)

حضرت علقمہ کے بھائی عقبہ بن عامر بھی ابن السنی اور ابو نعیم کی اسی مضمون کی  
ایک روایت بیان کرتے ہیں جس میں بواسیر کی جگہ ”الباسور“ منقول ہے۔ باسور کا  
پھوڑا مقعد میں شکاف ڈال کر وہاں پر ہمیشہ رستا رہتا ہے۔ کسی ڈاکٹر نے اس پھوڑے  
کا کبھی بھی دواؤں سے علاج نہیں کیا۔ اس کا علاج اپریشن ہے اور وہ اذیت ناک  
ہونے کے علاوہ نامکمل۔ کیونکہ اکثر مریضوں کو دوبارہ شکایت ہو جاتی ہے۔ ہم نے  
بواسیر کے رستے والے مسوں۔ باسور اور مقعد کی سوزش کے زخموں کے لئے ایک اور  
حدیث مبارکہ سے سند لے کر یہ مرکب تیار کیا۔

برگ مندی (پس کر) 50 گرام

دوغن زیتون 250 گرام

ان کو اچھی طرح ملا کر 5 منٹ ابلانے کے بعد چھانے بغیر کھلے منہ کی کسی ڈیسے  
میں رکھ لیا گیا۔ رات سونے سے پہلے مریض اسے اپنے مسوں پر اور روئی سے تھوڑا  
اندر کی طرف لگا لیتا ہے۔ اسی طرح صبح اٹھ کر یہ تیل لگایا جاتا ہے۔ اللہ کا فضل رہا  
کہ ہر مریض کو سات دن سے کم عرصہ میں تمام شکایات جاتی رہیں۔ اضافی طور پر  
سوئے وقت بڑا میچہ خالص تیل پلایا بھی جاتا رہا۔

قرآن مجید نے اسبغول والے اثر کے حامل دھن کی تعریف کی ہے۔ نبی صلی  
اللہ علیہ وسلم نے چھپے ہوئے آنے کی روئی ناپسند فرما کر چھان کو اس میں دوبارہ شامل  
کودایا۔ اسب ایک امریکی فرم نے آنے کے چھان اور اسبغول کو ملا کر  
(FIBERAD) کے نام سے ایک مرکب تیار کیا ہے۔ جو پرانی قبض کا علاج کرتے  
ہوئے بواسیر کے لئے تریاق ہے۔

ہم نے جس چیز کو توجہ نہ دی دوسروں نے اسے اپنا لیا۔

مریض اگر دن کے وقت انجیر کھائے۔ سو دنت تیل پی لے اور اگر مسوں پر کوئی مقامی علامات ہوں تو وہاں تیل لگائے۔ اس کے بعد بواسیر کی تکلیف باقی نہیں رہ سکتی۔ جہاں تک اس کے بطور مرض کا تعلق ہے انجیر کافی مدت تک کھانا ضروری ہے۔ قبض کے باقاعدہ علاج کے ساتھ ساتھ جگر کی اصلاح کے ساتھ ادویہ کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ جن کا تذکرہ ہیٹ کی متعلقہ بیماریوں کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔

## ذیابیطس

### (DIABETES MELLITUS)

یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم میں شکر اور اس سے حاصل ہونے والی چیزوں کو اپنے کام میں لانے کی صلاحیت کھو جاتا ہے۔

آنکھوں میں جانے اور وہاں سے ہضم ہونے کے بعد نشاستہ والی تمام غذاؤں اور شکر کی ہر قسم کو گلوکوس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ گلوکوس جب خون کے راستے جگر میں جاتا ہے تو وہ فوری طور پر ایسے بندوبست کرتا ہے کہ خون میں اس کی مقدار ایک خاص حد سے بڑھنے نہ پائے۔ تجرباتی طور پر اگر کسی کو 400 گرام گلوکوس پلا دیں تو اصولی طور پر یہ مقدار اس کے خون میں شکر کی مقدار میں بے حد اضافہ کر دے گی۔ لیکن چند منٹ بعد معلوم ہوتا ہے کہ جگر سے باہر جانے والے خون میں گلوکوس کی مقدار معمول سے قدرے زیادہ ہو گی۔ جگر نے یہ کیا کہ 100 گرام تو اپنے یہاں آئندہ ضرورت کے لئے محفوظ کر لی۔ کچھ عضلات کو روانہ کر دی تاکہ وہ بھی اسی طرح ذخیرہ کر لیں۔ جو پھر بھی بچ گئی اسے پکنائی میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ ذخیرے فاقہ کشی اور دوسری ضرورتوں کے مواقع پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ لیکن ذیابیطس کے مریض میں یہ سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔

ذیابیطس بڑی پیچیدہ بیماری ہے۔ اس میں خون میں شکر کی مقدار بڑھتی اور اس کے نتیجہ میں جسم کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ جسم کے متعدد خلیے پھول جاتے ہیں۔ پکنائی کے ہضم کا نظام بگڑ جاتا ہے اور ذہریلے مادے جسم میں سرایت کرنے لگ

جاتے ہیں۔ یہ صورت حال بالکل ایڈز کی سی ہو جاتی ہے۔ جس میں مریض کے پاس سے بھی کوئی بیماری گزر جائے تو اسے لگ جاتی ہے اور پھر اس کا مقابلہ کرنے کی سکت نہ ہونے کی وجہ سے وہی بیماری اس کی موت کا باعث بن جاتی ہے۔

ایک مرتبہ اندازہ لگایا گیا تھا۔ کہ امریکہ میں ذیابیطس کے 12 لاکھ مریض ہیں۔ لیکن یہ وہ مریض ہیں جو ہسپتالوں میں زیر مشاہدہ رہے۔ وہ مریض جو اپنے مقامی ذرائع سے علاج کرواتے رہے یا جن کو ابھی بیماری ہونے کا احساس نہیں اس سے دہ گئے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ لاہور میں مئی 1991ء میں ذیابیطس کے بارے میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ جس میں لوگوں نے اس بیماری کے بارے میں بڑی دہشت ناک خبریں سناں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس کے کم از کم 36 لاکھ مریض موجود ہیں۔

## اسباب

ذیابیطس ایک موروثی بیماری ہے۔ جو ماں باپ سے اولاد میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اگرچہ لاکھوں بچے ایسے ہیں جن کی ماں یا باپ کو یہ تکلیف تھی لیکن انہوں نے ایک لمبی صحت مند زندگی گزاری۔ یہ بیماری عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں اس سے بچ جاتی ہیں۔ ان کے جملہ ہونے کے امکانات بھی بڑے وسیع ہیں۔ کوئی عمر اس سے محفوظ نہیں۔ وراثت میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہوتی ہے اور جب وہ اس کا شکار ہوتے ہیں تو دونوں میں لاغر ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ موجودہ علاج سے وہ ایک لمبی عمر پالیتے ہیں لیکن ان کی طوالت عمر اپنے جیسے دوسرے بچوں کے مقابلے میں 20 فیصدی کم ہوتی ہے۔

ایک عام دیکھے جانے والی بیماری جس پر تحقیق کے ذرائع میسر ہیں۔ ابھی تک ماہرین کے لئے معرہ بنی ہوئی ہے۔ ایک زمانے میں خیال تھا کہ غذا میں حیاتین ب کی مسلسل کمی اس کا باعث ہوتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ غذا میں نشاستہ دار غذاؤں کی کثرت۔ آرام طلب زندگی۔ جسمانی کالی اس کا باعث بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے سونے جسم والے حضرات کے لئے اس کا شکار ہونے کا زیادہ اندیشہ موجود ہے۔ ہم نے نازک

اندام لوگوں کو بھی اس میں مبتلا دیکھا ہے۔ لیکن کم۔

میڈیکل کالج میں علم طب کے جید استاد کرمل محمد ضیاء اللہ مرحوم ہوا کرتے تھے۔ ان کے یہاں ذیابیطس کے ایک مریض زیر علاج تھے۔ مریض کو ایک مرتبہ احساس ہوا کہ وہ تو کروڑ پتی ہے اس لئے اس کو علاج کے لئے ولایت جانا چاہئے۔ کیونکہ اس کے خیال میں ولایت والے ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس نے کرمل صاحب سے مشورہ کیا اور ولایت کے کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ لندن کے PROFESSOR ALLEN اس بیماری کے علاج میں عالمی شہرت رکھتے ہیں۔ وہ پروفیسر ایلن کے پاس گیا اور اگر جو روکھ او سنائی وہ کرمل صاحب بتاتے ہیں۔

”پروفیسر ایلن نے مریض سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ مریض نے بتایا کہ وہ مسلمان ہے اور پاکستان سے آیا ہے۔ پروفیسر ایلن نے کہا مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں۔ مریض نے کہا مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں۔ بھگوان مسلمان ہوں اور وہاں میرا اچھا خاصا کاروبار ہے۔

پروفیسر ایلن نے کہا اگر تم مسلمان ہو تو تم کو ذیابیطس نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تمہارے نبی نے کم کھانے کی تلقین کی ہے۔ جس نے اس حکم پر عمل کیا اسے یہ بیماری نہیں ہو سکتی۔ اور اگر تم نے اپنے نبی کے کلمے پر عمل نہیں کیا اور بسیار خوری کے نتیجہ میں شکر کی بیماری ہو گئی ہے تو پھر اپنے مذہب کو بدنام نہ کرو۔“

پروفیسر ایلن نے مریض کو تقریباً دہائی اودیدہ تجویز کیں جو ان کو پاکستان میں چلائی گئی تھیں۔ اس نے ان کو واضح کر دیا کہ علاج عمر بھر ہوتا رہے گا۔ اس مکالمے اور نسخہ کے بعد ان کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ بیماری ان کی اپنی طاقتوں کا ثمرہ ہے اور اب ہاتھ روکنے سے جان نہ چھوٹے گی۔ ولایت جانے کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوا۔

پروفیسر ایلن کا یہ مشاہدہ کہ ذیابیطس بسیار خوری سے ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کم کھاتے ہیں ان کو یہ بیماری نہیں ہوتی۔ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تازہ ترین تحقیقات

کے مطابق وہ لوگ جو ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں یا جن کی غذا میں چکنائیاں زیادہ ہوتی ہیں ان کا بلب سنتوں میں چکناہٹوں کی آمد کا جان کر بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ اور جب آہستہ آہستہ توجہ دیتا ہے تو آنسو لین کی مطلوبہ مقدار مہیا نہیں کرتا اس طرح موٹاپے کے شکاروں کو چربی کے مسائل کے علاوہ شکر کا مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔

شکر کی صلاحیت کی وجہ سے ایک تندرست شخص کے خون میں گلوکوس کی مقدار اس طرح سے ہوتی ہے۔

نمار منہ یا کھانے کے چھ گھنٹے بعد = 100cc خون میں 80 - 120 ملی گرام (حال ہی میں عالمی ادارہ صحت نے یورپی ممالک میں نمار منہ شکر کی مقدار کو 140 ملی گرام تک نارمل قرار دیا ہے۔ غریب اور اسطوانائی ملکوں میں یہ اضافہ درست نہیں۔)

کھانا کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد = 180 - 120 ملی گرام فی 100cc خون۔

تندرستی کی حالت میں گلوکوس کی مقدار 180 ملی گرام سے بڑھنے نہیں پاتی۔ کیونکہ جسم کے تمام اعضاء اسی مقدار تک گوارا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گردوں سے گزرنے والے خون میں جب گلوکوس کی مقدار 200 ملی گرام سے تجاوز کرتی ہے۔ تو وہ اسے واپس جذب کرنے یا اس کی موجودگی سے انغماض کرنے کی بجائے فالٹو مقدار پیشاب کے راستے خارج کر دیتے ہیں۔ ذیابیطس کے اکثر مریضوں میں کھانا کھانے کے بعد خون میں گلوکوس کی مقدار 300 ملی گرام یا اس سے بھی زیادہ رہتی ہے۔ مقدار جب 300 ملی گرام ہو تو گردوں کے ذریعہ روزانہ 100 گرام گلوکوس پیشاب کے راستے جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ اتنی زیادہ مقدار کا ضائع ہونا بڑا خود ایک المیہ ہے۔

مولانا عبدالجید سالک مرحوم طنزیہ کالم لکھنے میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ لکھا کہ لاہور کے رہنے والوں کے جسم سے شکر کی جتنی مقدار ذیابیطس کی وجہ سے خارج ہوتی ہے اگر اس کو جمع کر لیا جائے تو کسی چھوٹے شکر کی چمچی کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔



ہمارے غدودوں کا نظام متعدد ہارمون پیدا کرتا ہے۔ خاص طور پر دماغ کی تہ میں پایا جانے والا غدہ نخاسہ PITUITARY GLAND دوسری تمام غدودوں کو کنٹرول کرتا اور اپنے کیمیائی جوہروں کے ذریعہ ان کو مناسب کارکردگی کی سمت لاتا رہتا ہے۔ جگر سے ذرا نیچے چھوٹی آنت کے ابتدائی موڑ کے درمیان ایک مشہور گینڈ بلب یا PANCREAS واقع ہے۔ یہ گینڈ خوراک ہضم کرنے کے لئے PANCREATIC JUICE کھانا آنے پر آنتوں میں ڈالتا ہے۔ اور جب غذا ہضم ہو کر جسم کے اندر چلی جاتی ہے تو یہاں سے ایک جوہر INSULIN برآمد ہوتا ہے۔ انسولین خون میں موجود گلوکوس کو جلا کر اسے کاربن ڈی آکسائیڈ اور پانی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس عمل سے جسم کو حرارت اور توانائی حاصل ہوتی ہے۔ گلوکوس کی بھی میں چکنائی جلتی ہے۔ اگر ذیابیطس یا کسی اور وجہ سے گلوکوس نہ چل رہا ہو تو چکنائیوں سے حاصل ہونے والے زہریلے عناصر جسم میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ زہریلے عناصر KETONES سانس میں بدبو پیدا کرتے خون کی ٹالیوں میں جم کر ان کو موٹا کرتے اور دوسری خطرناک علامات کا باعث بنتے ہیں۔

انسولین کے علاوہ غدودوں سے اور بھی جوہر پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے اثرات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً کچھ ہارمون ایسے ہیں جو یہ پسند نہیں کرتے کہ جسم میں گلوکوس کی مقدار کم پڑے۔ وہ اسے بڑھاتے رہتے ہیں۔ ان کا اگر بس چلے تو تندرستی کی حالت میں بھی گلوکوس کی کافی مقدار خون میں موجود رہے۔

ذیابیطس کے مریضوں میں بلب میں انسولین پیدا کرنے والا کارخانہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب انسولین کم پیدا ہوتی ہے تو اس کے مخالف جوہر تیز ہو جاتے ہیں۔ اور خون میں گلوکوس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔

### علامات

بیماری کی ابتدا بار بار پیٹاب آنے، پیاس میں اضافہ، بڑھتی ہوئی کمزوری، تھکاوٹ، پڑمردگی، وزن میں کمی، بھوک میں زیادتی سے ہوتی ہے۔ ہاتھ پیر بھاری ہونے لگتے ہیں۔ ان میں سونیاں چھپتی ہیں۔ اگر کوئی بیماری لاحق ہو تو وہ آسانی سے

ٹھیک نہیں ہوتی۔ بار بار پھنسیاں بھٹی ہیں اور جلد ٹھیک نہیں ہوتیں بلکہ بعض اوقات کوئی پھنسی یا پھوڑا کاربکل بن جاتی ہے۔

جب خون میں گلوکوس کی مقدار ہر 100cc میں 200 ملی گرام سے بڑھ جائے تو گردے اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور وہ اسے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چکنائیوں کے تحول میں بے فکھگی کی وجہ سے KETONES پیدا ہوتے ہیں جن کو اگر باہر نہ نکالا جائے تو جسم کے اندر متعدد خرابیوں کا باعث ہو سکتے ہیں۔ جوں جوں خون کے ساتھ شکر کی زیادہ مقدار اور تیزابی مادے گردوں کو موصول ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ان کو جسم سے خارج کرتے جاتے ہیں۔ اس لئے پیشاب کی حاجت بار بار محسوس ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ رات کو اٹھ کر بھی پیشاب کرتا پڑتا ہے۔

بار بار پیشاب آنے سے جسم سے پانی کی کافی مقدار خارج ہو جاتی ہے۔ جس کی کمی کو پورا کرنے کے لئے پیاس لگتی ہے۔ مریض بار بار پانی پیتا رہتا ہے۔ چونکہ جسم اپنے اندر گلوکوس کو استعمال نہیں کر سکتا یا انسولین کے نہ ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے گلوکوس کے جلنے سے جسم کو جو حرارت اور توانائی حاصل ہوتی تھی اب وہ میسر نہیں آ رہی یا وہ بہت کم مقدار میں ملتی ہے۔ اس لئے تھکن اور کمزوری محسوس ہوتی ہیں۔ جبکہ جسم اس کمزوری کو دور کرنے کے لئے مزید خوراک کا تقاضا کرتا ہے۔ بھوک بڑھ جاتی ہے۔

گلوکوس کے نہ جلنے سے جسم میں توانائی کی کمی واقع ہوتی ہے۔ وہ بیماریوں کا مقابلہ کرنے میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ کسی سوزش کا مقابلہ کرنے کے لئے جسم کے اپنے دفاعی نظام میں کمزوری ہو جاتی ہے اور بیماریاں جلد ٹھیک نہیں ہوتیں۔ قوت مدافعت کی اسی کمزوری کے باعث پھنسیاں نکلتی ہیں۔ عام حالات میں جب جراثیم کسی خراش کے راستے جسم میں داخل ہو کر سوزش پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جسم کا دفاعی نظام ان کو ختم کر دیتا ہے یا ان کی تخریب کاری محدود کر دیتا ہے۔ اور اس طرح وہ جلد میں پھیل نہیں سکتے اور ایک پھنسی کی صورت محدود کر کے حملہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ذیابیطس کے مریضوں میں ان کو پھیلنے سے روکنے والی طاقت ماند پڑ جاتی ہے اور

پھنسی پہلنے والی سوزش یا پھوڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اگر پھوڑا پھیل جائے تو وہ کار بکل ہو جاتا ہے۔

ہڈیوں میں درد، کھجواں، ہاتھ پیر بھاری اور ان میں سونیاں چھتی ہیں۔ مینا کی کمزور ہونے لگتی ہے۔ چیزیں دھندلی ہوتی جاتی ہیں۔ رانوں کے درمیان اکثر خارش ہو جاتی ہے۔

### ویجد گیاں

یہوشی، تیزابیت، خون کی ٹالیوں کی وسعت روز بروز کم ہونے لگتی ہے۔ جسم کے دور افتادہ حصوں خاص طور پر پیروں کی انگلیوں میں دوران خون کم ہوتے ہوتے GANGRENE کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پیر کالا پڑ جاتا ہے۔ جلد پر چھالے نکلتے ہیں انگلیوں کی حس ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے نتیجے میں ٹانگ کانٹا پڑ سکتی ہے۔ خون کی ٹالیوں کی موٹائی دل کے دورے کا باعث بن جاتی ہے۔

مینا کی دھندلی ہونے کے ساتھ آنکھوں میں سفید اور کالا موتیا اترتے ہیں۔ قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے متعدد اقسام کی سوزشیں، پھوڑے، پھنسیاں بلکہ کار بکل حملہ آور ہوتے رہتے ہیں۔ ان مریضوں کو اکثر تپ دق ہو جاتی ہے۔ اور بے ہوشیوں میں پانی پڑا اکثر دیکھا گیا ہے۔

اعصاب پر ذیابیطس کے اثرات بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اعصابی دردیں، اعصاب میں انعطاف کی وجہ سے اہم معمولات میں کمی، فالج، اختلاج قلب، پھیوں کی کمزوری، لگنت، نامروی، نیشاب میں رکاوٹ، ہڈیوں اور جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں۔ خواتین میں ماہواری کا سلسلہ جلد ختم ہو جاتا ہے۔

ذیابیطس اگر چھوٹی عمر میں ہو تو جنسی اعضاء کی نشوونما مکمل نہیں ہوتی۔ لڑکیوں کو مدتوں ماہواری نہیں آتی۔ ایسی لڑکیوں کی اگر شادی ہو تو عام طور پر خواہشات نہیں ہوتیں۔ ان کو بچے ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ حمل اگر ہو بھی جائے تو اکثر اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔ بچہ اگر پیدا ہو جائے تو اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ان بچوں کے جسم پر ورم ہوتا ہے۔ زیادہ تر بچے مرود تولد ہوتے ہیں۔ زندہ پیدا ہونے

والے بچوں کو 'برقان' سکرے ہوئے پھینک دئے۔ روز نئی بیماریاں ہوتی رہتی ہیں۔ خون میں تیزابیت کی زیادتی کی وجہ سے پیٹ کی بیماریاں رفتی زندگی بنتی ہیں۔ معدہ اور ستوں میں زخم، جگر میں پھیلاؤ اور کبھی کبھی اپنڈکس بھی ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسے مریضوں کی آنتوں میں بظاہر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔

ذیابیطس کا پیٹ کی بیماریوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم نے جتنے بھی مریض دیکھے ان میں سے ہر ایک کو اپنے پیٹ سے شکایت موجود تھی۔ پیٹ میں نفخ کا رہنا، بد ہضمی، کھانے کے بعد پیٹ کا بھاری ہونا، ڈکار آنے، قبض ہر ایک کو ہوتے ہیں۔ بلکہ ہمیں شبہ ہے کہ ان علامات کا اس بیماری سے کوئی گہرا تعلق ہے اور شاید انہی کی وجہ سے بلب میں انسولین کی پیدائش کم ہو جاتی ہے۔ ابھی تک یہ ایک مفروضہ تھا جو مسلسل مشاہدات پر مبنی ہے۔ لیکن اس امر کی بالواسطہ نشان دہی دوسرے ذرائع سے بھی میسر آرہی ہے۔

پیٹ کی خرابیاں، بد ہضمی، خون کی تیزابیت، خون میں گلوکوس کی زیادتی گردوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ پیشاب میں شکر کے ساتھ چربی بھی نظر آتی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فلٹر کرنے کا نظام بھی خراب ہو گیا ہے۔ گردوں میں خرابی پیدا ہونے کے بعد خون میں ذہریلے مادے بڑھتے ہیں۔ ان میں اضافہ ہوتا ہے اور گردے قفل ہو جاتے ہیں۔ گردوں میں خرابیوں سے جسم میں ذہریلے مادے سرایت کر جاتے ہیں۔ گردوں کی خرابی مسلسل اذیت کے بعد موت کا باعث ہو جاتی ہے۔

### تشخیص

جب خون کے 100cc میں گلوکوس کی مقدار 200 ملی گرام سے تجاوز کرتی ہے تو پیشاب میں شکر آنے لگتی ہے۔ شکر کی مقدار کو بعض لیبارٹری والے

برائے نام +

معمولی مقدار ++

بہت زیادہ مقدار +++

جیسے اشارات سے ظاہر کرتے ہیں اور بعض اداروں میں ان کو فیصدی سے ظاہر کیا جاتا

ہے۔ ایک مریض کے پیشاب کا نتیجہ درج ذیل ہے۔

## URINE - EXAMINATION - REPORT

### PHYSICAL EXAMINATION

Colour \_\_ Deep yellow

Sp. Gravity \_\_ 1038

Trubidity \_\_ Turbid

Deposit \_\_ yes

### CHEMICAL EXAMINATION

pH \_\_ 5

Sugar \_\_ 4.8 %

Protein \_\_ Traces

Blood \_\_ Nil

Ketones \_\_\_ +

Urobilinogen \_\_ Nil

Bilirubin \_\_ Nil

### MICROSCOPIC EXAMINATION

Pus Cells \_\_\_ 3 \_ 5 HPF

RBCs \_\_\_ Nil HPF

Epi Cells \_ Rare HPF

Casts \_ \_ Nil HPF

Crystals \_\_ Few Cal. oxalate crystles HPF

Organisms \_\_\_ Nil HPF

یہ ایک ایسی خاتون کے پیشاب کا نتیجہ ہے۔ جن کو کئی کھانے کا بہت شوق رہا۔ چاول

ان کے یہاں ہر رات پکتے تھے۔ مٹھائی بھی اچھی لگتی تھی۔ گھر میں خدا کا دیا سب کچھ تھا اس لئے پیدل چلنے کی ضرورت نہ تھی۔

ان کو شکایت تھی کہ پیٹ جلتا ہے۔ ڈکاریں آتی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ چڑا ہتھیلیاں اور ٹکڑے جلتے ہیں۔ بازو کندھے اور ٹانگیں ہر وقت دکھتے ہیں۔ بائیں ٹانگہ اکثر سو جاتی ہے۔ دن میں پیشاب زیادہ نہیں آتا۔ البتہ رات میں دو تین مرتبہ اٹھنا پڑتا ہے۔ پہلے کسی ڈاکٹر کو دکھایا تھا اس نے ماحول کھانے سے منع کیا۔ وہ پھینکی جائے پینے کو کتنا تھا۔ اس لئے اس کا علاج پھوڑ دیا۔ ان کے خون کا کیمیادی معائنہ کروانے پر یہ معلومات میسر آئیں۔

BLOOD GLUCOSE (Random) 280 mg / 100cc

BLOOD UREA 58 mg / 100cc

خون میں گلوکوس کی مقدار نارمل سے 100 ملی گرام زیادہ رہی جبکہ یوریا 58 (خون میں یوریا 20-40 ملی گرام تک ہوتا ہے۔) اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گردے بھی خراب ہو رہے ہیں۔ لیکن ابھی زیادہ خراب نہیں ہوئے۔ جس کا پتہ پیشاب میں لحمیات کی موجودگی سے بھی لگ چکا تھا۔

پیشاب میں شکر آنے کے اور بھی اسباب ہیں۔ اس لئے تشخیص کو مزید واضح کرنے کے لئے ایک ٹیسٹ (GLUCOSE TOLERANCE TEST) کیا جاتا ہے۔ یہ آسان اور قابل اعتماد ہے۔

مریض صاف منہ لیبارٹری میں جاتا ہے اور اسی وقت خون اور پیشاب کا ایک نمونہ تجزیہ کے لئے لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مریض 50 گرام گلوکوس کا پوڈر ایک پاؤ پانی میں گھول کر شربت کی صورت میں پی لیتا ہے۔ اس کے ہر آدھ گھنٹہ بعد خون اور پیشاب کا نمونہ لیا جاتا ہے۔ آخری نمونہ گلوکوس لینے کے اڑھائی گھنٹے بعد تک لیا جاتا ہے۔ اس قسم کے تجزیہ کی ایک رپورٹ یہ ہے۔

## GLUCOSE TOLERANCE TEST

BLOOD SUGAR	URINE SUGAR
FASTING BLOOD SUGAR 150 mg ----	0.5 %
1/2 Hour after Glucose 190 mg ----	1.5 %
1 --- 300 mg ----	3 %
1 1/2 --- 280 mg ----	2.5 %
2 --- 250 mg ----	2 %
2 1/2 --- 200 mg ----	1.5 %

اس رپورٹ میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ مریض کے خون میں خالی پیٹ گلوکوس کی مقدار 150 ملی گرام تھی اور پیشاب میں 0.5 فیصدی تھی۔ مگر جب اسے گلوکوس دیا گیا تو خون میں بڑھتی ہوئی مقدار اڑھائی گھنٹوں کے بعد بھی اس مقام پر واپس نہ آسکی جہاں سے چلی تھی۔ کیونکہ اس مریض کے جسم میں خون میں گلوکوس کو اعتدال پر رکھنے کا انتظام خراب ہو چکا تھا۔

اس کے مقابلے میں ایک تندرست شخص کو اسی طرح گلوکوس دیا گیا تو یہ نتیجہ رہا۔

### AFTER 50 / gms. OF GLUCOSE DOSE

	F	1/2 hr.	1 hr.	1 1/2 hr.	2 hr.	2 1/2 hr.	3 hr.
Acetone	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
Urine Sugar	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	
Blood Sugar	600 mg	900 mg	1500 mg	1100 mg	700 mg	550 mg	

اس کے جسم نے 2 گھنٹے بعد گلوکوس کی اضافی مقدار کا بندوبست کر کے خون میں اعتدال کو قائم رکھا۔ پیشاب میں شکر اس لئے نہ آسکی کہ اضافی مقدار اندر ہی ختم کر دی گئی تھی۔ لے کر دوں سے انداز حاصل کرنے کی ضرورت نہ پڑی۔

## علاج

زیا بیٹیس میں علاج کا مقصد مرض کی شدت کو کم کرنا اور صحت کے لئے مسائل پیدا کرنے سے روکنا ہے۔ بد قسمتی سے طب جدید میں زیا بیٹیس کا کھل اور شافی علاج دریافت نہیں ہو سکا اس لئے اب تک کی معلومات کے مطابق صرف بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ مسلسل علاج سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ مریض ایک لمبی صحت مند زندگی گزار سکے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے یہ کام کئے جاتے ہیں۔

## مقاصد

- 1- باقاعدگی سے ہلکی ورزش دوران خون کو درست رکھتی ہے۔ پنوں میں اکڑاؤ کو روکتی ہے اور دل کے فعل کو معمول پر رکھتی ہے۔
2. خون اور پیشاب میں گلوکوس کی مقدار پر مسلسل نظر رکھتے ہوئے اور حالات کی مناسبت سے درست ادویہ کی تجویز اور ان کو خون میں شکر کی مقدار کے مطابق کم و بیش کرتے رہنا۔ پیچیدگیوں کی پیش بندی کرنا اور ان کا بروقت علاج کر کے ان کو نقصان دہ سے روکنا جیسے کہ پیروں میں خون کی نالیوں بند ہو رہی ہوں تو ان کے کھولنے کے لئے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نالیوں کے بند ہو جانے اور (GANGRENE) شروع ہو جانے کے بعد پیریا ٹنگ کو کاٹنا پڑتا ہے۔
- 3- مریض کو بیماری اس کی ماہیت اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں پوری طرح تربیت دی جائے۔ اسے ٹیکہ لگانا سکھایا جائے۔ ٹیکہ سے ہونے والی خرابیوں اور ان کا تدارک سکھایا جائے۔ زیا بیٹیس سے ہونے والی علامات کی پہچان بتائی جائے تاکہ اسے معلوم ہو کہ اس نے کب کب اور کس کس مرحلہ پر اپنے معالج کو مطلع کرنا ہے۔

اس سے مریض کے ذہن سے دہشت نکل جاتی ہے۔ وہ دوسروں کا دست عمر نہیں رہتا۔ وہ اپنے علاج میں ایسے طریقے اختیار کرنے پر عبور حاصل کر لیتا ہے جس سے وہ اور بیماری آپس میں صلح صفائی سے گزارا کرتے چلے جائیں۔ پاکستان میں



(DIABETIC ASSOCIATION) اور اس کی قاتل قدر سرگرمیاں اسی مفید عام مقصد کا حصہ ہیں ان لوگوں نے اپریل 1993ء میں مریضوں کے لئے تعلیم اور تربیت کا بڑا شاندار پروگرام منعقد کیا۔ جو ہر لحاظ سے مفید تھا۔ مریضوں نے اپنے مسائل کو سمجھنا سیکھا اور ان کے علاج پہلے سے زیادہ واقف ہو گئے۔

### علاج بالادویہ

پیشاب میں شکر اس لئے آتی ہے کہ بلب انسولین پیدا نہیں کر رہا یا ضرورت سے کم پیدا کر رہا ہے۔ اس کی کو انسولین باہر سے دے کر پورا کیا جاسکتا ہے۔ ابتداء میں انسولین سور کے بلب سے حاصل کی گئی تھی۔ جسم کی اپنی انسولین غذا کی مقدار کے مطابق آہستہ آہستہ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ جبکہ باہر سے دینے میں مشکل یہ ہے کہ اسے تھوڑی تھوڑی مقدار میں بار بار دینا پڑتا ہے جو کہ آسانی سے ممکن نہیں۔ انسولین اگر منہ کے راستے دی جائے تو یہ معدہ اور آنتوں میں ہضم ہو کر کچھ اور بن جاتی ہے۔ اس لئے جسم میں انسولین داخل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اسے انجکشن کے ذریعہ داخل کیا جائے۔

یہ ایک تجربہ کار ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ کسی مریض کے لئے انسولین کے استعمال کا فیصلہ کرے اور پھر یہ طے کرے کہ اس کو کتنی مقدار دی جائے۔ چھوٹی عمر کے مریضوں، حاملہ عورتوں اور سوزش کے دوران انسولین کے علاوہ اور کوئی طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔ انتخاب کے لئے بازار میں انسولین کی متعدد اقسام جیسے کہ یہ ہیں۔

نام انسولین	ماخذ	اثر کا آغاز	عرصہ اثر
NEUTRAL SOLUBLE	گائے	آدھ گھنٹہ	2-4 گھنٹے
HUMAN - ACRAPID	انسانی	آدھ گھنٹہ	2-4 گھنٹے
HUMULIN-S	انسانی	1/2 سے 3/4 گھنٹہ	1-3 گھنٹے
INSULATED PROTAMINE	سور	1-2 گھنٹے	5-7 گھنٹے
ZINC - LENTE	سور - گائے	1-2 گھنٹے	3-12 گھنٹے

7-15 گھنٹے	3-1 گھنٹے	سور	MONOTARD - ZINC
8-12 گھنٹے	3 گھنٹے	انسانی	HUMULIN - PROT. ZINC
8-16 گھنٹے	2 گھنٹے	انسانی	HUMAN - ULTRARETARD

عام طریقہ یہ ہے کہ مریض کا پیشاب ٹیسٹ کرنے کے بعد SOLUBLE INSULIN کے 30 یونٹ سے صبح شروع کرتے ہیں۔ یہ ٹیکہ جلد کے نیچے کھانے سے آدھ گھنٹے پہلے لگنا ضروری ہے۔ چونکہ اس کا اثر تھوڑی دیر رہتا ہے۔ اس لئے ٹیکہ صبح شام لگایا جاتا ہے جو کہ مشکل آور مہر آنا عمل ہے۔

آغاز یوں کرتے ہیں کہ مریض کے خون میں گلوکوس کی مقدار خالی پیٹ اور کھانے کے بعد معلوم کی جائے۔ پیشاب میں شکر کی مقدار روزانہ دیکھتے ہوئے یہ تعین کیا جائے کہ اس خاص مریض کی شکر کو نارمل حدود میں لانے کے لئے انسولین کی کتنی مقدار درکار ہوگی؟ بار بار کے انجکشن سے بچنے کے لئے ہر مریض کی خواہش ہوتی ہے۔ کہ اسے لمبے اثر والی انسولین دی جائے۔

ابتداً فوری اثر والی انسولین سے کی جاتی ہے۔ جب مریض اس کو برداشت کر لے۔ اس کے خون میں شکر کی مقدار قابو آجائے اور بیماری کی علامات غائب ہو جائیں تو اس مرحلہ پر انسولین کی قسم تبدیل کرنے کا سوچا جاسکتا ہے۔ عام طور پر استعمال ہونے والی انسولین کی اکثر قسمیں گلے یا سور کے بلبہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس لئے انسانوں میں ان سے حساسیت ہو سکتی ہے۔ مریض کو ٹیکہ لگنے کے بعد جسم پر خارش ہو یا پتی اچھلنے لگے (URTICARIA) ہو جائے۔ سانس بند ہونے لگے تو ظاہر ہوتا ہے کہ انسولین کی اس قسم سے الرجی ہو گئی ہے۔ فوری اثر والی (SOLUBLE INSULIN) سے اکثر الرجی نہیں ہوتی۔ لیکن لمبے اثر والی مختلف قسموں میں ڈالی گئی اضافی چیزیں جیسے کہ زنک۔ پروٹائین وغیرہ سے الرجی ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔

مریض کو اگر الرجی نہ ہو تو سادہ انسولین کے ساتھ لمبے اثر والی کسی انسولین کی تھوڑی سی مقدار شامل کی جاتی ہے۔ اور ان کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھا کر اس مقام

پر لے آتے ہیں جب دن میں ایک غلی بیکہ کافی ہو جائے۔

ذیابیطس کے جس مریض کو اضافی مسائل پیدا ہو گئے ہوں جیسے کہ ہڈیوں میں سوزش یا کاربیکل یا پیروں میں دوران خون کی سوزش، ہندش وغیرہ تو ان مریضوں کو خواہ وہ پہلے گولیاں کھا رہے ہوں انسولین ہی پر لانا ضروری ہے۔ ورنہ ان مشکلات پر قابو پانا ممکن نہ ہو گا۔ فوجیوں کے ذیابیطس میں بھی علاج انسولین کی سادہ قسم سے شروع کیا جائے۔

### ٹیکہ لگانے کا طریقہ

انسولین کا ٹیکہ لگانے کا فن ہر مریض کو خود سیکھ لینا چاہئے۔ باہر سے ٹیکہ لگوانے کی صورت میں اخراجات اور ادویات کے علاوہ اوزاروں کی صفائی یقینی نہیں ہوتی۔ وہ سرنج جو آپ کے سامنے ابالی گئی اگر وہ اس سے پہلے یہ قان یا تشیع کے مریض پر استعمال ہوتی ہے تو ابالنے کے باوجود وہ سرنج بیماریاں پھیلانے کا باعث ہو سکتی ہے۔ سرنج مریض کی اپنی ہونی چاہئے۔ جو اس کے علاوہ کسی اور کے جسم میں نہ گئی ہو اور اسے علیحدہ کر کے اچھی طرح دھو کر صاف کپڑے میں لپیٹ کر ٹھنڈے پانی میں رکھ کر چوٹے پر چڑھا دیا جائے۔ جب پانی پانچ منٹ تک کھولا ہے تو اتار کر ٹھنڈا کر کے استعمال کی جائے۔ ٹیکہ لگانے کی جگہ اور مقدار کے بارے میں مستند ڈاکٹر سے مشورہ ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ٹیکے والی جگہ ہمیشہ بدلتی رہے۔ ایک ہی جگہ لگانے سے وہ جگہ سخت ہو جاتی ہے اور آئندہ کے ٹیکے دشواری سے لگتے ہیں۔ ہر شخص اپنی ٹانگ میں آسانی سے ٹیکہ لگا سکتا ہے۔ بعض کمپنڈر چوتروں پر ٹیکہ لگاتے ہیں۔ خواتین میں خاص طور پر یہاں ٹیکہ لگوانے کا رواج زیادہ ہے۔ چوتروں میں چربی زیادہ ہونے کی وجہ سے دوران خون نہیں ہوتا۔ اگر وہاں پر سوزش کے جراثیم داخل ہو جائیں تو پھوڑے سے کم پر خلاصی نہیں ہوتی۔ چوتروں میں بعض نازک رگیں اور پٹھے ہوتے ہیں جن پر ٹیکہ لگ جائے تو کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لئے ٹیکہ لگانے کے لئے چوتربترین جگہ ہے۔ ران کا باہر کا وسطی حصہ بہترین انتخاب ہے۔

## انسولین کی زیادتی کے نقصانات

انسولین میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ خون سے گلوکوس کو فوری طور پر کم کر دے۔ سادہ انسولین یہ کام آدھ گھنٹہ میں شروع کر دیتی ہے۔ کسی مریض کے لئے انسولین کی مطلوبہ مقدار کا تعین کرنے میں اگر غلطی ہو جائے تو خون میں شکر کی مقدار معمول سے کم ہو کر خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے۔ اس کیفیت کو (HYPOGLYCAEMIA) کہتے ہیں۔ جس کی علامات یہ ہیں۔

ہیٹ میں اس طرح کا درد جیسے زور کی بھوک لگی ہو۔ ٹھنڈے پینے آتے ہیں۔ سر میں شدید درد جسم پر کچلی طاری ہوتی ہے۔ نعرہ دھنلا جاتی ہے۔ چکر آنے لگتے ہیں۔ دل ڈوبنے لگتا ہے اور مریض کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کا دم نکلنے والا ہے۔ پھر بیوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اگر اس دوران کچھ نہ کیا جائے تو واقعی دم نکل سکتا ہے۔

ہر مریض کو یہ علامات سمجھا دی جائیں۔ تاکہ اگر وہ کبھی ایسی کیفیت کا شکار ہو جائے تو فوری طور پر گلوکوس یا شکر پچا کر لے۔ بلکہ مریضوں کے لئے یہ لازم ہے کہ ان کی جیب میں ہر وقت شکر کی پڑیا موجود رہے۔ کیونکہ گلوکوس کی کمی کا حملہ ہونے کے بعد اکثر اوقات جسم میں اتنی سخت نہیں رہتی کہ وہ اٹھ کر کوئی چیز لا سکے یا الماری سے شربت کی بوتل نکل کر اسے گھول کر پی لے۔ اس کیفیت کی پیش بندی کے لئے ایک عام اصول یہ ہے کہ مریض کو انسولین کی اتنی مقدار دی جائے کہ اس کے بعد پیشاب میں شکر کی تھوڑی مقدار آتی رہے۔ پیشاب سے شکر اگر بالکل ختم کر دی جائے تو اس امر کا امکان موجود رہے گا کہ اس کو شکر کی کمی کی علامات پیدا ہو جائیں۔ محفوظ طریقہ یہی ہے کہ مریض کو انسولین کی ہر خوراک اس کی شکر کی مقدار سے ذرا کم دی جائے۔ اس طرح ایک محفوظ حد قائم رہے گی۔ اور احتیاط یہ کی جاتی ہے کہ مریض اپنے کام پر خالی ہیٹ نہ جائے۔ ورزش یا جسمانی کام کرنے والوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ کام کرنے سے پہلے اور بعد میں کسی قسم کی غذا ضرور کھائیں۔ کیونکہ کام کے لئے توانائی جسم میں موجود گلوکوس کے چلنے سے حاصل ہوتی

ہے۔ شکر کی کچھ مقدار کام یا ورزش میں صرف ہو جائے اور دوسری طرف اس کو انسولین کا ٹیکہ لگا ہو تو اس کا انجام خطرناک ہو سکتا ہے جس کو روکنے کے لئے غذا کی فالتو مقدار ضروری ہے۔

جب انسولین نئی نئی شروع کی گئی تھی تو ہر مریض کی جیب میں بیماری کے احوال کے ساتھ کھانڈ کی ایک پڑیا اور پانچ روپے کا نوٹ ہوتا تھا۔ اس ہدایت کے ساتھ کہ یہ شخص اگر کبھی سڑک پر گرا ہوا یا بیہوش پایا جائے تو کھانڈ کی پڑیا اس کے منہ میں ڈال دی جائے اور ٹیک دل راہ گیر پانچ کا نوٹ بطور معاوضہ لے لے۔

خون میں گلوکوس کی کمی سے پیدا ہونے والی خطرناک کیفیت صرف انسولین سے ہی نہیں بلکہ زیاہٹس کے علاج میں کام آنے والی گولیوں سے بھی ہو سکتی ہے۔

### زیاہٹس کی گولیاں

ٹیکہ لگانا ایک اذیت ناک عمل ہے۔ کوئی بھی خوشی سے سوئی کے ذریعہ علاج اور وہ بھی دن میں 2-3 بار کو پسند نہیں کرتا۔ پہلے کوشش کی گئی کہ انسولین کو کسی ایسی شکل میں تیار کر لیا جائے جو معدہ کے راستہ جسم میں داخل ہو سکے اس میں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ سلفا گروپ کی کیمیادی ساخت میں کچھ تبدیلیاں کر کے ایسے مرکبات بنائے گئے ہیں جو انسولین کی مانند خون میں موجود شکر کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل حالات میں زیاہٹس کے کسی مریض کا علاج گولیوں سے کیا جانا مناسب ہو سکتا ہے۔

- مریض کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو۔
  - مریض کا جسم درمیان ہو۔
  - ایسے مریض جن کا وزن نارمل ہو ان کی شکر کو قابو میں رکھنے کے لئے روزانہ 30 یونٹ انسولین سے زیادہ درکار نہ ہوتے ہوں۔
  - جن مریضوں کا وزن کوشش کے باوجود کم ہونے میں نہ آتا ہو۔
- ایسے مریضوں کو ایک طویل عرصہ تک گولیوں کے ذریعے صحت مند رکھا جاسکتا ہے۔ لیکن کچھ حالات ایسے بھی ہیں جن میں گولیوں کا استعمال مفید نہیں رہتا بلکہ ان

سے الٹا نقصان ہوتا ہے جیسے کہ۔

- چھوٹے بچوں میں شکر کی بیماری
- جن کے پیشاب میں KETONES کی زیادہ مقدار مسلسل آرہی ہو۔
- بہت موٹے مریض جن کی شکر کی مقدار گولیوں کے باوجود کم نہ ہو رہی ہو۔
- دل جگر اور گردوں کی بیماریوں میں خاص طور پر گردوں میں پتھری اور یرقان کے دوران۔

○ مریض کو شراب پینے کی عادت ہو۔

گولیوں کی مدد سے شکر کا علاج اگرچہ نسبتاً آسان ہے۔ لیکن ان کے استعمال سے کچھ جسمانی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔

1- مریض اگر نیند کی گولیاں یا سکون آور ادویہ یا سلفا ڈایازین وغیرہ کھا رہا ہو تو ان کی موجودگی میں خون میں شکر کی مقدار ایک دم سے کم ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح شکر کی فوری کمی کی شدید علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

2- بد ہضمی

3- حساسیت اور اس کی وجہ سے جلد کا اترنا۔

4- اس دوران شراب پینے سے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔

5- یرقان اور جگر کی خرابیاں۔

6- کچھ مریضوں کے خون پر بھی دوائی کے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن وہ دیر پا نہیں ہوتے اور آسانی سے درست ہو سکتے ہیں۔

جب کسی مریض کا گولیوں کے ذریعہ علاج کیا جا رہا ہو تو اسے مندرجہ ذیل ادویہ نہ دی جائیں۔ کیونکہ ان کی موجودگی میں مریض کی حالت خراب ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔

B-Blockers- Sulphonamides- Phenyl- butazones- chloramphenicol  
cyclophosphamide- salicylates (Asprin)- dicoumarol- ACTH  
Cortisones- Phenytoin- Oestrogens.

ان کے علاوہ مانع حمل گولیاں بھی خطرناک ہیں۔  
 ان گولیوں کو کھانے کے دوران مٹی، کمزوری، چتر، بھوک کی کمی، بد ہضمی، اسہال،  
 تیزابیت اور خوراک سے وٹامن B کے انجذاب کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔  
 شوگر کا علاج کرنے کے لئے جو گولیاں بازار میں ملتی ہیں۔ ان کی عام خوراک اور  
 طریقہ استعمال یہ ہے۔

نام دوائی	عمر اور ابتدائی خوراک روزانہ کی خوراک
24-42 TOLOBUTAMIDE	1.3 gm 1.0-1.5 gm کھئے
12-24 CHLORPROPAMIDE (Diabinese)	300-600 mg 100-250 mg کھئے
24 ACETOHEXAMIDE (DIMELOR)	0.25-1.0 mg 250-500 mg کھئے
12-14 GLIBENCLAMIDE (DAONIL)	2.5-25 mg 2.5-5 mg کھئے
24 TOLAZAMIDE	300-1000 mg 100-250 mg کھئے
12-14 GLIPIZIDE (Diabinese)	2.5-30 mg 2.5-5 mg کھئے
BIGUANIL (GLUCONIL) (GLUCOPHAGE)	0.5-1 gm 1-1.5 gm

خون میں شکر کی مقدار کو کم کرنے میں گولیوں کی ایک قسم (BIGUANIDIES) کے  
 نام سے موسوم ہے۔ اس میں مذکورہ بالا فہرست کی آخری دوا آتی ہے۔ جس کی طویل  
 اثر والی قسم (PHENFORMIN) بھی ہے۔ ان سب کے استعمال کا طریقہ اور  
 خوراک ایک جیسی ہے۔ البتہ ان کو بالائی فہرست میں مندرجہ ادویہ کے ساتھ ملا کر  
 بھی دیا جاتا ہے۔

ذیابیطس میں اعصاب کی سوزش اور خون کی ٹالیوں کی بندش معمول کا حصہ ہیں۔  
 اس لئے ہر مریض کو وٹامن B مرکب کی معقول مقدار جس میں B کی مقدار کافی  
 زیادہ ہو ہمیشہ دی جانی ضروری ہے۔ اکثر مقامات پر تحقیقات کے دوران یہ معلوم ہوا  
 ہے کہ علاج میں اگر وٹامن C (VITAMIN -C) بھی شامل ہو تو دوائی کی کم مقدار  
 سے بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وٹامن B کے اجزاء میں سے  
 (NICOTINIC ACID) خون کی ٹالیوں کو کھولنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لئے

علاج کے ساتھ اس جزو کی شمولیت بھی ضروری ہے۔  
 مریض کے پیروں کو سنگریں سے بچانے کے لئے روزانہ دھویا جائے۔ ٹھک جوتا  
 نہ پہنے ناخن ہفتہ وار کاٹنے جائیں پیروں پر زخموں کے تیل کی مالش کی جائے تو انگلیوں  
 کے درمیان پھپھوندی بھی نہیں ہوتی۔ یہی مقصد وضو کرنے سے بھی حاصل ہو سکتا  
 ہے۔

## ذیابیطس اور طب یونانی

شکر کی بیماری کوئی نئی بات نہیں۔ اس کی علامات کا ذکر قدیم چینی کتابوں، طب  
 عرب اور ہندوستان کے قدیم حکماء کی بیاضوں میں کثرت سے ملتا ہے۔ طب اکبر میں  
 اس کا باقاعدہ علاج ملتا ہے۔ خاندان شرفی کے اطباء یہ جانتے تھے کہ شکر کی بیماری  
 بلبہ کی خرابی سے ہوتی ہے۔ اس لئے وہ مریض کی غذا میں بکرے کا بلبہ شامل کرتے  
 آئے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ جسم کے جس حصہ میں بیماری ہو تو مریض کو بکرے کا  
 وہی حصہ کھلایا جائے۔ اسی مفروضہ کی بنا پر ذیابیطس کے مریضوں کو بلبہ کھلایا جاتا رہا  
 ہے۔ آجکل کے بعض ڈاکٹر اس طریقہ پر معترض ہیں حالانکہ یہ ایک طبی حقیقت ہے  
 کہ خون کی کمی اور جگر میں خرابی کے مریضوں کو اگر بکرے کی کلیجی کھلائی جائے تو  
 فائدہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرق النساء (SCIATICA) کے مریضوں کو  
 بکرے کے پشت کے گوشت کی بخنی تجویز فرمائی اور ہم یہ نسخہ عرق النساء اور ریزہ کی  
 ہڈی کے جملہ مسائل کے لئے پچھلے 15 سالوں سے نہایت کامیابی سے استعمال کر رہے  
 ہیں۔

لوکات اور جاسن کے پیڑوں کے مختلف حصے ذیابیطس کے علاج میں صدیوں سے  
 بڑے مقبول چنے آ رہے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز نے متعدد اطباء اور اساتذہ قدیم کے  
 نسخوں کے مطابق ایک مرتبہ جاسن کے پھل سے دو من پانی نمود کر اس میں 2 میر  
 خالص فولاد کا برادہ ڈال کر چھ ماہ دھوپ میں رکھا۔ فولاد جاسن کے پانی میں مصل ہو کر



گھناری رنگ کا سفوف بن گیا۔ اس سفوف کو بعد میں قدھاری انار کے پانی میں کھل  
 کیا گیا۔ اسے ایک گرین کی مقدار میں ذیابیطس کے مریضوں کو دیا جاتا تھا۔ اس صبر  
 آزمائش سے ذیابیطس میں تو کوئی خاص کمی نہ آتی لیکن ان کی کمزوری کو یقیناً فائدہ  
 ہوا۔ کیونکہ یہ فولاد سے بنا تھا۔ اس لئے خون کی کمی اور جسمانی کمزوری کے متعدد  
 مریض شفا یاب ہوتے دیکھے گئے۔

گزار ہوئی میں یہ عجیب صفت ہے کہ اس کو کھانے کے بعد زبان پر مٹھاس کا  
 زائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ اس لئے اطباء نے ہر دور میں شکر کے مریضوں کو گزار ہوئی  
 مختلف شکلوں میں کھلائی ہے۔ ایسے نسخے استعمال کرنے والوں کو اکثر دیکھا گیا کہ ان کی  
 شکر پر کوئی خوشگوار اثر نظر نہیں آیا۔

سکھیا، انیون اور شگرف کو بھی اس علاج میں مقبولیت رہی ہے۔ ایک  
 مرتبہ ایک مشہور طبیب ذیابیطس میں مبتلا ایک صحافی کو بتا رہے تھے کہ ان  
 کو اب شکر نہیں آتی۔ کیونکہ انہوں نے ایک عجیب نسخہ بتایا ہے۔ صحافی  
 کے بارے میں تو معلوم نہیں لیکن ان حکیم صاحب کا تین مرتبہ سکھیا کے  
 معطر اثرات کی وجہ سے ہم نے خود علاج کیا تھا۔ پھر ان کے پیر کی انگلیاں  
 خون کی بالیوں کے بند ہونے کی وجہ سے کالٹی گئیں۔ اور ان کی وفات خون  
 کی شریانوں میں رکاوٹ کی وجہ سے ہوئی۔ ذیابیطس کی تمام پیچیدگیاں ان کی  
 علامات ان میں موجود تھیں لیکن ان کے پیشاب میں شکر کی مقدار ہمیشہ  
 برائے نام رہتی تھی جو کہ مخفی ذیابیطس کی علامت تھی۔

کرپے کے جج اور لوکٹ کے بے شرت رکھتے ہیں۔ ایک اکثر روزہ سیر کیا  
 بیگم لوکٹ کے بچے ابال کر ان کا تودہ جتی تھیں۔ دو تین دن پینے کے بعد  
 ان کے پیشاب سے شکر ختم ہو جاتی تھی۔ وہ مدتوں اسی علاج پر تکیہ کئے  
 رہیں۔ لیکن بیماری موجود رہی اور اسی جھوٹی تسلی کی وجہ سے ان کے  
 جسم پر پانی پڑ گیا۔

پھر تپ دن ظاہر ہوئی۔ حالانکہ ان کی جسمانی حالت بڑی اچھی تھی۔ آخر

میں کروں کے ٹل ہونے کی وجہ سے وفات ہوئی۔

معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب میں شہر آتی اگر بند ہو جائے یا کبھی کبھار خون میں گھو کوس کی مقدار اعتدال پر آجھی جائے تو ذیابیطس کا تحریمی عمل پھر بھی جاری رہتا ہے۔ کتنے ہی مریض دیکھے گئے جن کو مشاہدات سے بیماری میں واضح کمی نظر آرہی تھی لیکن وہ ان کو اندر سے کھن کی طرح چاٹتی رہی اور وہ چند مہینوں کے اندر مختلف علامات کے سبب وفات پا گئے۔ حالانکہ جدید علاج پر لوگوں کو مدتوں زندہ رکھا جاسکتا ہے۔ ہمارے ایک مشہور سیاسی لیڈر 60 سال تک ذیابیطس میں مبتلا رہے۔ چہرے اور پشت سے کبھی پیار نہ لگے۔ لیکن وہ شہر روزانہ پیتے تھے۔

حکیم کبیر الدین نے اپنی بیاض میں ایک نسخہ یوں تجویز کیا ہے۔

حب کبد نوشوری، مغز پنہ دانہ، تخم جامن اور انون کو ملا کر گولیاں بنا کر صبح شام دی جائیں۔ ایک دوسرے نسخہ میں وہ مندل سفید، نشاستہ، گوند کبیرا، تخم کاہو، تخم خرفہ، گل ارمنی، گٹار اور ساق تجویز فرماتے ہیں۔ موصلی سفید، ستاور، آملہ، منق، خار شک، ست گلو، سلاجیت، گل منڈی، پکھان بیدان کا دیگر نسخہ ہے۔

ان نسخوں میں نشاستہ اور بولہ کا تیل ایسی چیزیں ہیں جن کا ذیابیطس میں استعمال مناسب نہیں۔ انون دینا ناجائز ہے۔

دوسرے اہلہم کے نسخوں میں خرفہ، اسبغول، گلو اور انگور کی شاخوں کا پانی، کدو کا پانی، کھیرے اور ککڑی کا پانی، مصطفیٰ روی، سعد کوئی، ملک غبر، شیرہ الاچھی خورد، پوست گلو، تر پھلا، تر سو، نیلوفر، خشخاش، کافور، خش، مندی، منڈی بوئی، برہمی بوئی، خار شک، موصلی سفید، موصلی دکھنی، آملہ، سلاجیت، طباشیر، تخم کاہو، تخم خرفہ، تخم جامن، پکھان بید، ست گلو، بورہ ارمنی، سچے موتی، سیپ، سوختہ، مرجان سرخ سوختہ، منق، کشنہ قشر بیضہ مرغ، کشنہ قلعی اور بلسان تجویز کئے گئے ہیں۔

ذیابیطس ایک لمبی اور پیچیدہ بیماری ہی نہیں بلکہ فریب دینے والی کیفیت ہے۔ یہ مریض کو توانائی کا بھانوس دے کر بھی جھپٹ لیتی ہے۔ اس لئے کسی ایسی چیز کو استعمال کرنا جس پر لمبے مشاہدات کا عرصہ نہ گزرا ہو، خطرناک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں

کہ بعض دہی اور مقامی جڑی بوٹیاں شفا کی اثرات رکھتی ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی قابل اعتماد ہے اور کوئی ایسی ہے جس کے استعمال سے فوائد کا احساس ہونے کے بعد ایک روز گردوں کا فعل بند ہو جائے گا؟ اس لئے مسلسل نگرانی بار بار کے ٹیسٹ، مریض کی جسمانی حالت، توانائی پر ہمہ وقت نگاہ رکھتے ہوئے اگر کوئی نسخہ استعمال کیا جائے تو وہ جائز ہے۔ لیکن اس نسخہ میں 'شکرف'، 'سنگھیا'، 'سلاجیت' زیادہ مقدار میں پختائی والے مغزیات اور ایون نہ ہوں۔

### ذیابیطس اور غذا

نشاستہ اور مٹھاس کو ہضم کرنے کا نظام بیکار ہونے کے بعد مریض کی غذا کو حالات کے مطابق ترتیب دینا علاج کا اہم حصہ ہے۔ اس بیماری کے سلسلہ میں جانی ہوئی تلخ حقیقتوں میں موٹاپا اور بسیار خوری کے مسائل ہیں۔ موٹے مریضوں کا وزن کم کئے بغیر بیماری کا کنٹرول ممکن نہیں اور غذا میں نشاستہ اور مٹھاس کو اتنا کم کر دیا جائے کہ ان کو ہضم اور استعمال کرنا جسم کے لئے کسی مسئلہ کا باعث نہ رہے۔ ہماری ذاتی رائے میں مریض اگر مٹھاس کے سلسلہ میں کبھی بد پرہیزی کر بھی لے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا پختائی سے ہوتا ہے۔

### ممنوعہ غذائیں

شکر، چینی، جام، مرہ، شربت، ذبے میں بند پھل، مائیاں اور چاکلیٹ، کیک، مٹھائیاں، پنڈٹ، مٹھے، بکٹ، کھوکوس والے سفوف، شربت، چاول اور شراب۔

### معمولی مقدار میں جائز غذائیں

ڈبل روٹی، ہلکے وزن کی چپاتی، جو کا دلیا، مز، آلو، پھلیاں، تازہ پھل، پھلوں کے خالص جوس، (جن میں اضافی مٹھاس شامل نہ ہو) دودھ، سویاں، کسٹرو اور کارن فلور۔

### جن غذاؤں پر پابندی نہیں

پرندوں اور مرنی کا گوشت، بکے کا گوشت (لیکن چربی کے بغیر) پنیر، چائے

کافی 'گو بھی' بند گو بھی، 'سلاو' کدو، 'پینگن'، 'بھنڈی'، 'خلغم'، 'کھیرا'، 'نگاری'، 'نمڑ'، 'پالک'، 'سولی'، 'پیار'، 'اورک'، 'لسن'، 'مصا'، 'بناسپتی' تھی یا خوروفنی تیل، 'شماش' کے لئے 'سکرین' کی 'گولیاں'۔

### بھارتی ماہرین کی تجویز کردہ غذا

ناشتہ :- دو انڈے ابلے ہوئے۔ ایک نوٹ ایک چھو بناسپتی کھن، ایک سنگترا۔  
دوپہر کا کھانا :- دو بونیاں اور سبزی 'ایک سنگترا' ایک پھلکا۔

عصر کی چائے : ایک کپ چائے اور دو ہنکٹ یا اس کی جگہ گرم نکلے دودھ کا ایک پیالہ اور دو ہنکٹ۔

رات کا کھانا :- مرغی کی نغنی ایک پیالہ، دو بونیاں یا مچھلی کا تلو، 'سبزیوں'، ایک پھلکا، پنڈنگ یا کسٹریڈ۔

دوپہر یا رات کے کھانے میں گوشت نہ کھانے کی صورت میں دال کی ایک پلیٹ، کھیرے کا سلاو، دہی کا ایک پیالہ، ایک سنگترا اور دو چپاتیاں کافی ہوتی ہیں۔

### پروفیسر محمود علی ملک کے غذائی نسخے

میو ہسپتال لاہور میں ذیابیطس کے علاج کا ایک نہایت عمدہ مرکز کام کر رہا ہے۔ جسے قلم کار کن بڑے جذبہ اور لگن سے چلا رہے ہیں۔ اس ادارے کی طرف سے ذیابیطس کے مریضوں کو غذائی ضروریات کی تربیت اور ہدایت کے لئے "ذیابیطس فور غذا" نامی بڑی عمدہ اور کارآمد کتاب شائع کی ہے۔ اس کے مصنف پروفیسر محمود علی ملک صاحب نے بڑی محنت اور خلوص سے ذیابیطس کے مریضوں کے لئے خوراک کے قابل عمل اور موثر نسخے پیش کئے ہیں۔

### زیادہ وزن والوں کے لئے غذا کا جدول

ناشتہ : ایک کپ چائے۔ آدھ انڈا (آلیٹ یا فرائی)

ایک سلاٹس۔ آدھ سیب (200 حرارے)

11 بچے دن کی چائے میں ایک کپ چائے کے ساتھ دو بنکٹ۔ (100 حرارے)  
 دوسرے کا کھانا: آدھ پلیٹ سبزی، ایک چپاتی، سلاڈ چھوٹی پیٹ (250 حرارے)  
 سہ پہر کی چائے: آدھ پاؤ پھل، ایک کپ چائے۔ (100 حرارے)  
 رات کا کھانا: آدھ پلیٹ دال، ایک چپاتی، چند چمچ کسٹرو (200 حرارے)  
 رات سوئے سے پہلے آدھ پیالی دودھ میں ایک چمچ اسبغول کا چھلکا ملا کر لیا جاسکتا ہے۔ (200 حرارے)

اس غذا سے روزانہ 1000 حرارے حاصل ہوں گے۔ جو کہ ایک آدمی کی غذائی ضروریات سے کم ہیں۔ اس لئے کھانے والے کے جسم میں موجود فالتو چربی نکلی شروع ہو جائے گی اس ابتدائی فائدے کے بعد مریض کی خوراک میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔  
 درمیانے جسم والوں کے لئے خوراک کا شیڈول

ناشتہ: دو عدد سلائس، ایک کپ چائے، ایک انڈا سلیمٹ (300 حرارے) 11 بجے کی چائے میں ایک کپ چائے، دو بنکٹ، ایک سیب  
 دوسرے کا کھانا: دال، ایک پلیٹ، چھوٹی چپاتی، سلاڈ، کھیر چند چمچ  
 عصر کی چائے: چکن سینڈوچ ایک عدد، لیمن گر اس کا قہودہ (150 حرارے)  
 رات کا کھانا: آدھ پلیٹ آلو گوشت، ایک چپاتی، چھوٹی پلیٹ کسٹرو سوتے وقت دودھ کی ایک پیالی۔ (375 حرارے)

کمزور افراد کے لئے

ناشتہ: دودھ ایک پاؤ  
 شامی کباب ایک، ایک چکن سینڈوچ (400 حرارے)  
 11 بجے کی چائے میں انڈے نماز کے سینڈوچ کے ساتھ ایک سیب اور کپ چائے (200 حرارے)

دوسرے کا کھانا: آلو گوشت ایک پلیٹ، دو چھوٹی پیائیاں، چند چمچ کھیر (500 حرارے)  
 عصر کی چائے: ایک کپ چائے، ایک شامی کباب، دو بنکٹ (200 حرارے)

رات کا کھانا :- ایک پلیٹ ابلے چاول، ایک پلیٹ وال، 'سلاو' ایک سیب (200 حرارے)

غذائی ہدایات کے سلسلہ میں اہم ترین مشورہ یہ ہے کہ لحمیات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے دالوں اور پرہیز پر زیادہ توجہ دی جائے کیونکہ گوشت کی زیادتی شریانوں اور دل کی بیماری کا باعث ہو سکتی ہے۔

غذا کے جدول نمونہ کے طور پر ہیں۔ جن میں مثال کے طور پر خوراک کی ایک جدول مثال کے طور پر تجویز کی گئی ہے۔ لیکن یہ واضح کر دیا گیا ہے۔ کہ کسی مریض کی خوراک میں روز مرہ کے حرارے (CALORIES) کی مقدار حالات کے مطابق 1500-2000 کے درمیان رہے۔ مریضوں کی سمولت کے لئے پروفیسر محمود علی ملک نے غذائیات کا بڑا خوبصورت تجربہ بھی تیار کیا ہے۔ جس میں اپنی پسند اور ضرورت کا انتخاب کیا جاسکتا ہے۔

خوراک	مقدار حرارے	اجزائے ترکیبی
CALORIES		
چائے کا پیالہ	30	ایک چمچانک خیر مکھن کے دودھ
دھکی کی 'س'	150	چائے کی پتی، نمک یا دودھ کے ساتھ کریم نکلا دہی ایک پاؤ، پانی اور نمک
شالی کباب	100	آدھ چمچانک قیمہ، آدھ چمچانک وال نمک مصالحے وغیرہ
چکن سینڈویچ	150	آدھ چمچانک مرغ کا قیمہ، ایک پتہ سلاو، مصالحے، نقلی مکھن
انڈے ٹماٹر کا مینڈویچ	100	آدھ ابلے انڈا، ایک سدرکس، ٹماٹر، مصالحے
ابلے انڈا	80-90	انڈا
آلیٹ انڈا	150	آدھ چمچ بنا پستی گھی یا تیل، مصالحے، پیاز، ٹماٹر، انڈا

ایڑا فرنی	135	ہا سپی تھی آدھ مچھ 'ایڑا
سبزی کی پلیٹ	150	پاؤ سبزی 'ایک چمچ تھی' پیاز 'لہسن' اور کدو وغیرہ
ایک پلیٹ دال	200	آدھ چمچاٹک دال 'ایک چمچ ہا سپی تھی'
		پیاز لہسن وغیرہ
چھوٹی چٹائی	100	آدھ چمچاٹک آٹا 'پالی

ڈبل روٹی کا سلاکس 60 حرارے بڑی چٹائی (چمچاٹک آٹا) 200 حرارے۔ ایک سیب  
70 حرارے اور آمروہ 50 حرارے، ایک پلیٹ ابلے چاول 210 حرارے اور کھیر کی  
پلیٹ میں 180 حرارے ہوتے ہیں۔

پروفیسر محمود علی ملک اپنی شاندار غذائی تجاویز کے ساتھ کچھ اہم نکات بھی بتاتے  
ہیں۔ جیسے کہ نشاستہ دار غذائیں اگر کھائی جائیں تو ان میں موجود ریٹے گلوکوس کی  
مقدار کو قابو میں رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ تھین کی روٹی  
گندم سے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ اس میں نشاستہ گندم سے قدرے کم ہوتا ہے۔ زمین  
کے نیچے اگنے والی سبزیوں میں صرف شکر قندی اور آلو میں نشاستہ قدرے زیادہ ہوتا  
ہے ورنہ مولیٰ، گاجر اور شلغم وغیرہ کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ جن نشاستہ دار  
غذائوں میں لیمبات بھی موجود ہوں ان کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں۔

پروفیسر ملک بوتلوں والے مشروبات کو ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن ڈیٹا پیس کے  
مریضوں کے لئے آنے والے جدید قسم کے (DIET COLA) کو برا نہیں مانتے۔ مگر  
ان کا کہنا ہے کہ ان کی بجائے کسی زیادہ مفید اور ہمارے ملک کے حالات کے مطابق  
ہے۔

پاکستان کونسل برائے سائنسی تحقیقات کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر فرخ حسین شاہ صاحب  
نے مختلف غذاؤں کے عناصر اور ان سے حاصل ہونے والے حاروں کی مقدار مرتب  
کی ہے۔ جس کا خاکہ یہ ہے۔

## عام کھانوں کا غذائی تجزیہ

لحیہ	پختائی	نشاستہ	حرارت	کیشیم	فاسفورس	نولاد	وٹامن	وٹامن	
ج	پ	ج	پ	ج	پ	ج	پ	ج	
27.6	20.4	45.8	477	66	54	10	12	15	اروی گوشت
17.4	19.9	16.1	309	27	69	20	17	-	کدو گوشت
8.8	12.0	12.3	201	44	98	6.0	15	9	پنے کی رال گوشت
10.7	10.1	5.5	156	72	120	15	-	-	پنار گوشت
2.5	12.3	1.6	127	163	132	3	10	15	بھنڈی گوشت
7.5	6.5	3.6	429	70	81	105	120	30	کوجی گوشت
18.2	25.1	20.7	382	60	45	5	-	-	موغرات گوشت
18.3	12.4	8.6	219	650	94	3	80	17	موتیر
7.7	11.5	4.09	154	14	80	100	60	3	سز گوشت
11.3	15.1	2.4	191	38	89	9	100	-	آلو گوشت
17.7	20.0	24.5	349	122	56	5	10	17	پالک گوشت
16.3	8.8	15.2	205	42	73	2	17	10	وال ماش قیر
12.9	12.6	4.4	182	126	214	1	-	-	کرلا گوشت
9.6	8.8	5.4	139	164	92	20	-	-	پنڈر گوشت
-	18.8	15.5	264	79	129	-	12	2	شامی کباب
15.5	11.1	6.4	188	58	-	3	-	-	پنڈہ
12.9	12.6	4.3	182	64	57	-	-	2	کرلا قیر
30.6	7.8	5.2	213	57	247	-	100	-	زرمی کوڑہ

## طب نبوی

اسلام کا اپنا نظام خوراک ہے۔ جو غذا کو ہر پہلو سے توجہ دینے کے بعد اسے  
تندرستی کی جگہ کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس نظام پر عمل کرنے والوں کو ذیابیطس کی بیماری  
ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب بھوک لگے تو کھانا کھایا جائے اور جب تھوڑی



سی بھوک باقی رہ جائے تو ہاتھ کھینچ لیا جائے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو جسم میں نامناسب عناصر کا اجتماع ہی ہونے نہیں دیتا۔ مسلمان خانہ نشین اور ست نہیں ہو سکتا۔ اسے دن میں کم از کم پانچ نمازوں کے سلسلہ میں گھر سے باہر مسجد جانا ہے۔ جہاں اس نے تقریباً آدھے جسم کو دھونا اور دانت صاف کرتا ہے۔ دانت صاف کرنے کی اضافی تاکید نماز منہ اور سوتے وقت کے لئے بھی موجود ہے۔ صبح کے دانت صاف کرنے کے لئے پیلو کی مسواک مقرر ہوئی۔ جو کہ مسوڑوں کی بیماریوں کی دوا بھی ہے۔

ذیابیطس کے ہزار ہا مریضوں کے مشاہدات کے دوران معلوم ہوا کہ ان میں اکثر کے منہ میں خراب دانتوں کے باعث سوزش پائی گئی۔ جب اس کا علاج کیا گیا اور خراب دانت نکال دیئے گئے تو اکثر کی شکر ختم ہو گئی یا برائے نام رہ گئی۔ کرغل الہی بخش صاحب نے ایک مریض کو سمجھایا تھا کہ وہ کہاؤں کو پیپ لگا کر کھا رہا ہے۔ جب ہیٹ میں مسلسل پیپ جا رہی ہو تو تندرست رہنا ناممکن ہے۔ دن میں 21 مرتبہ دانت صاف کرنے اور مسواک کرنے والے کے دانت خراب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اس طرح ذیابیطس کے تین اہم اسباب سستی، کالی، بسیار خوری اور خراب دانت خارج ہو جاتے ہیں۔ کیرت کے محکمہ صحت نے پیلو کی شاخیں سکھا کر ان کا سنوف تیار کیا۔ پھر مسوڑوں کی بیماریوں کے مریضوں کو مختلف ادویہ کے مقابلے میں یہ منجن دیا گیا۔ زیادہ تر مریض اسی سے شفا یاب ہوئے۔

ہر مسلمان کو دو سروں کی بھلائی، اپنے روزگار، بیماروں کی عیادت اور مرنے والوں کی تعزیت کے لئے پیدل چلنا لازمی ہے۔ پیدل چلنے کو فروغ دینے کے لئے متعدد انعامات کا وعدہ بھی کیا گیا پھر یہ تاکید فرمائی کہ رات کے کھانے کے بعد پیدل چلنا ضروری ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پسند تھا۔ انہوں نے اسے متعدد بیماریوں میں دوا کے طور پر بھی تجویز فرمایا۔ مگر جب خود استعمال فرماتے تو اس میں اکثر پانی ملا لیتے تھے جس سے اس میں پختائی کی مقدار کم ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ مجلس میں خواہش فرمائی کہ گندم کا آٹا دودھ میں گوندھ کر اگر اس کے پراٹھے کھائے جائیں تو کیسے مزے دار

ہوں۔ اس کو سن کر جب ایک نیاز مند اگلے دن پراٹھے لے کر حاضر ہوئے تو نوش فرمانے پر توجہ نہ ہوئی۔ البتہ شریذ پر یا سالن نہ ہونے کی وجہ سے کھجی کی معمولی مقدار مجلس میں سالن کے عوض استعمال فرمائی لیکن اپنے گھر میں سالن کی جگہ سرکہ یا کھجور کو پسند فرمایا۔ جس سے ظاہر ہے کہ وہ چکنائیوں کا استعمال پسند نہ فرماتے تھے۔ اور کبھی توجہ فرمائی تو ان کی مقدار کم سے کم رہی۔

### شہد اور ذیابیطس

ذیابیطس میں شہد کے استعمال کا مسئلہ مغربی ماہرین کے لئے خاصا الجھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اسے معزیتاتے ہیں۔ اور کچھ مفید۔ اسے معزیتانے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پاکستانی ماہرین میں پروفیسر محمود علی ملک اپنے مریضوں کو شہد دینا پسند نہیں کرتے۔ بھارتی ماہرین میں کرنل چوہڑا اور نندکارنی اسے پسند ہی نہیں کرتے بلکہ کمزوری کے لئے اسے اکسیر قرار دیتے ہیں۔ شہد کو معزیتانے والوں کا زیادہ تر استدلال اس میں گلوکوس کی زیادہ مقدار پر ہے۔ کبھی جب شہد جمع کر لے جاتی ہے تو وہ پھولوں کے علاوہ مٹھاس کے دوسرے ذرائع پر بھی متوجہ ہو سکتی ہے اور اس طرح وہ شکر یا گلوکوس کی ایک مقدار اپنے پیچھے میں لے جاتی ہے۔ کبھی کے منہ میں (INVERTASE) نامی ایک کیمیادی خامہ موجود ہوتا ہے جو اسے (FRUCTOSE) میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگرچہ فرکٹوس بھی مٹھاس ہے لیکن جسم میں جا کر یہ ان مسائل کا باعث نہیں بنتا جو گلوکوس سے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی جتنی بھی شکر اپنے پیچھے میں لے جائے وہ دو تین دن میں فرکٹوس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس وقت ہم کسی خاص پیچھے سے شہد لیتے ہیں وہاں گلوکوس کا کچھ حصہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہو گا اور کچھ فرکٹوس میں تبدیل ہو چکا ہو گا۔ اس لئے شہد کے متعدد نمونے لینے کے بعد اس میں شکر کی اوسط مقدار کو اندازہ کے لئے لے لیا جاتا ہے۔

ڈاکٹر فرخ حسن شاہ نے پاکستان کے مختلف علاقوں سے شہد کے 60 نمونے حاصل کئے اور ان کے تجزیہ کی رپورٹ یہ ہے۔

شکر	نرگٹوس	نمی
SUCROSE	INVERT SUGARS	MOISTURE
کونپلوں کا شہد	6.7	13.5
لوکات کا شہد	2.8	18.9
شگرتوں کا شہد (واہ)	1.2	12.4
== (زرعی پوندرشی)	2.2	13.5
گلاب کا شہد (ولو)	10.0	17.4
گلاب کا شہد (زرعی پوندرشی)	9.8	16.20
جنگل شہد (چھانکا مانگا)	3.3	13.8

اس موازنہ میں (SUCROSE) سے مراد چینی ہے۔ گلاب کے شہد کے علاوہ کسی بھی نمونہ میں چینی کی مقدار 10 فیصدی سے کم رہی۔  
 پاکستان میں اشیاء خوردنی کے معیار کو متعین کرنے کے قوانین موجود ہیں۔ جن کو (PURE FOOD ORDINANCE) کہتے ہیں۔ ان کے مطابق بازار میں فروخت ہونے والے شہد کا کیمیائی معیار اس طرح سے مقرر کیا گیا ہے۔

SUCROSE	FRUCTOSE	MOISTURE
10 %	60 %	25 %

کینیڈا کے معیار کے مطابق شہد میں شکر کی مقدار 7.6 فیصدی سے زیادہ نہیں ہونی چاہئے۔ ان تمام موازنوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شہد میں اگر ملاوٹ نہ کی گئی ہو تو اس میں شکر کی مقدار 10 فیصدی سے زائد نہیں ہوتی جبکہ آلو میں نشاستہ 10 فیصدی سے زائد ہوتا ہے۔ اگر ہم غذائی چارٹ میں اپنے مریض کو آلو اور جاول کھانے کی اجازت دے سکتے ہیں تو شہد کو منع کرنا تعصب کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

پاکستان کے ایک سابق وزیر اپنے ذیابیطس کے علاج کے سلسلہ میں نیویارک کے ایک شفاخانہ میں داخل رہے۔ جہاں بار بار ٹیسٹ کر کے ان

کے لئے غذا کا جدول تیار کیا گیا۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ شکر، آلو، گھی، چاول وغیرہ سے اگر پرہیز کرتے رہیں تو ان کو برائے نام انسولین کی ضرورت ہو گی۔ انہوں نے شہد کے بارے میں پوچھا تو منع کر دیا گیا۔ انہوں نے ہسپتال والوں کو مطلع کیا کہ جس خوراک پر ان کے خون میں شکر کی مقدار اعتدال پر رہی اس میں 4 بڑے چمچے شہد بھی شامل تھے۔ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ قرآن مجید نے جس کو شفا مظہر قرار دیا ہے۔ وہ حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے۔

قرآن مجید نے جس چیز کو شفا کا مظہر قرار دیا ہے شہد نہیں بلکہ ROYAL JELLY ہے۔

”وہ اپنے پیٹ سے ایک سیال نکالتی ہیں۔ جس کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان میں شفا ہے“

یہ سیال عملی طور پر کبھی کا دودھ ہے جس پر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ اس میں توانائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو کھانے کے بعد بچوں کا وزن 10 دن میں 350 گنا بڑھ جاتا ہے نشوونما کی ایسی کوئی مثال پوری حیوانی دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ سیال بٹھکانیں ہوتا۔ یہ دنیا کی ہر بیماری میں مفید ہے اسے پینے والوں کو ہر حالت میں توانائی میسر آتی ہے۔ ذیابیطس کے مریض میں کمزوری اور جسم میں قوت مدافعت کی کمی اہم مسائل ہیں۔ ان دونوں کا معقول اور قابل اعتماد علاج اس مبارک سیال میں موجود ہے۔ جب بھی اس کی کوئی مقدار میسر آئی تاوانی میں جملہ مریضوں کو دی گئی۔ ایک خاتون فرماتی ہیں۔

”کمزوری جتنی بھی ہو۔ اس بیکہ کو پینے سے ایک دفعہ تو بدن میں جان آجاتی ہے۔ آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ میں کبھی بیمار نہ تھی۔“

عام شہد میں اس سیال کی کافی مقدار ہوتی ہے۔ جب ہم شہد پیتے ہیں تو اس کے ساتھ لیمبات، معدنی نمک اور وٹامن بھی جسم میں جاتے ہیں۔ بلکہ ہر وہ عنصر جو انسانی

کی ساخت میں استعمال ہوا وہ کسی نہ کسی مقدار میں شد میں ضرور ہوتا ہے۔ یعنی جسم کی ٹوٹ پھوٹ اور مرمت کے لئے ہمیں جس جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ شد میں موجود ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس میں مٹھاس کی معمولی مقدار (جس کا تعین مشتبہ ہے) کی بنا پر اسے مریض کی غذا سے خارج کر کے اسے اس کی افادیت سے محروم کر دیں۔ اگر ہم چاول دے کر مٹھاس میں زیادتی کا خطرہ منوں لے سکتے ہیں تو شد دے کر یہ خطرہ لینے سے کیوں گریزاں ہیں؟

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی صبح نماز منہ شد کا شہرت نوش فرمایا اور کبھی عصر کی نماز کے بعد بھی پیاد۔ یہ ان کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس پر عمل کرتا ہے تو شد کی افادیت اسے نفع تو بہر حال دے گی بلکہ اس کے ساتھ سنت رسول پر عمل کرنے کا ثواب یا اس کی برکت اس کی بیماری میں بھی فائدے کا باعث ہو گا انہوں نے شد کو اتنی اہمیت عطا فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا۔

### علیکم بالشفائین، العسل والقرآن

(ابن ماجہ، مسند رک حاکم)

(تمہارے لئے شفا کے دو مظہر ہیں۔ شد اور قرآن)

بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا مشروب شد تھا۔ انہوں نے اہمیت کے لحاظ سے افادیت میں اسے قرآن مجید کے ساتھ بیان فرما کر اعتراض کرنے والوں کو مسکت جواب عطا فرما دیا ہے۔

### غذا اور بیماریاں

اسلام نے غذا کے بارے میں چند موٹی باتیں بیان کی ہیں۔ کم کھلایا جائے لیکن کھانا صاف ستھرا ہو۔ مسلمان کو اسراف سے ہر حال میں منع کیا گیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا وہ اسے کھانوں کا سردار قرار دیتے تھے مگر جب ایک صاحب کو گھر کے لئے گوشت کی بیشمار مقدار سر پر لادے دیکھا تو اسے

ناپسند فرمایا۔ درزی کی دعوت میں کدو اور گوشت کے شوربہ میں وہ بوٹیوں کی بجائے کدو کے تیلے تلاش کر کے کھاتے دیکھے گئے۔ سبزیوں میں سب سے کم نشاستہ کدو اور بیٹوں والی سبزیوں میں ہوتا ہے۔ وہ انہی کو پسند کرتے تھے۔ کدو کے علاوہ ان کی پسندیدہ غذائیں سرکہ، کھجور، تریز، انجیر اور شہد تھے۔

انجیر ایک عظیم پھل ہے۔ جس کی تعریف میں وہ یہاں تک فرما گئے۔  
 ”اگر کوئی کسے کہ جنت سے کوئی پھل زمین پر آسکا ہے تو میں کون کجا کر  
 یہی وہ پھل ہے۔“

انجیر اگر درخت پر پکے تو اس میں گلوکوس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ عام قسم کی خشک انجیر میں 46 فیصدی مٹھاس ملتی ہے۔ جس میں نصف سے کم شکر ہوتی ہے اور بقیہ غیر مضر مٹھاس ہے۔ انجیر میں ایسے فائدے کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں جو گلوکوس اور دوسری اقسام کی شکر کو گھلا کر اس کی معصرت دور کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ ایک سورۃ اس کے نام سے موسوم کی گئی۔ ہم نے اسے زیابطیس کے مریضوں کو نہایت عمدہ نتائج کے ساتھ ہمیشہ دیا اور کبھی ایسا موقع نہ آیا کہ اسے بند کیا جائے۔ یہ باضرہ کی اصلاح کرتی اور کھانے کو ہضم کرتی ہے۔ چونکہ زیابطیس میں اصل مسئلہ ہیٹ کی خرابی بھی ہوتا ہے اس لئے یہ مریض انجیر سے فائدہ پاتے ہیں۔ حالانکہ بھارتی ڈاکٹر اسے منع کرتے ہیں۔

تریز میں مٹھاس کم اور پانی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ گردوں کو صاف کرنا اور آنٹوں کی جلن اور سوزش کو دور کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے سے پہلے کھانا زیادہ مفید قرار دیا ہے۔ ابن عساکر نے عمارۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

**البطیخ قبل الطعام بغسل البطن غسلا و بنصب بالماء اصلا**

(کھانے سے پہلے تریز ہیٹ کو مکمل غسل دیتا ہے اور اس سے

بیماریوں کو دھو کر نکال دیتا ہے۔)

نذا کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی اصول اسے وقت پر کھانا ہے۔

وہ صبح کا ناشتہ جلد از جلد کرنے اور رات کا کھانا ضرور کھانے پر زور دیتے ہیں۔ انہوں نے جن غذاؤں کو دوا کے طور پر استعمال فرمایا ان سب کو ہمارے ہی کھانے کو پسند کیا۔

### ذیابیطس کا علاج

عمر نبوی میں لوگ کم کھاتے تھے۔ چلتے پھرتے اور فعال زندگی گزارتے تھے۔ اس لئے وہ بیمار نہیں ہوتے تھے یا ان کو ذیابیطس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ورنہ مٹھاس ان کی پسندیدہ غذا تھی۔ وہ پیٹ بھر کر کھجوریں اور کھجور کا گایا کھاتے تھے بلکہ غریب لوگ روٹی کے ساتھ سالن کی بجائے کھجور کھاتے تھے یا روٹی کو کبھی کبھی سے چڑ بھی لیتے تھے۔ ذیابیطس بعد کی مصیبت بلکہ یہ اس دور کا خفہ ہے جب مسلمان مشرق وسطیٰ میں نو تباہی کاروں والی حالت میں آ گئے۔ ان کے باغات تھے۔ جاگیریں تھیں اور کام کاج کے لئے فوکر اس آرام طلب زندگی اور بسیار خوری نے جہاں ان کے دینی کردار کو متاثر کیا وہاں ذیابیطس بھی ان کے لئے سزا بن گیا۔

بو علی سینا نے اس کیفیت کو پہلی بار محسوس کیا اور اس کے علاج میں ایک عجیب اصولی استعمال کیا۔ اطباء میں یہ پہلا ذہین تھا جس نے بیماریوں کی ماہیت کو سمجھا اور ادویہ کو بیماری کی نوعیت کے مطابق ارشاد نبوی کی عقل میں تجویز کیا۔ اس نے اکثر و بیشتر طب نبوی کی دوائیں استعمال کیں اور اس طرح اپنے لئے ایک منفرد مقام بنا لیا۔

ذیابیطس میں بو علی نے مختلف ارشادات نبوی کو سامنے رکھ کر مہلہ کے بیج اور مرز بخوش کا سفوف پسند کیا۔ اس کے پاس پیشاب نیٹ کرنے کا بندوبست نہ تھا۔ البتہ مریض کی کمزوری، پیشاب کی مقدار، پیاس کی شدت میں کمی اس کے پاس تدریجی کامیاب تھے۔ اس نسخہ میں وہ ضرورت کے مطابق اضافے کر کے مریض کو شفا یاب کر لیا کرتا تھا۔

جب ہم نے ذیابیطس میں مبتلا ایک نہایت ہی محترم عزیز کو دیکھا اور جدید علاج کا نام لیا تو اس نے یہاں تک کہ اس کے لئے دوائیں دے دیں اور اسے شفا یاب کر دیا۔

اور ہم پڑھ لکھ کر لاچار سوچ سوچ کر اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا اور یہ حدیث مبارکہ ذہن میں آئی۔

”ان کالے دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سوائے موت کے“

کلوچی کے بارے میں یہ حدیث ہر مجموعہ میں مختلف ذرائع سے اتنی بار مذکور ہے کہ اس کی ثقاہت یعنی بن چکی ہے۔ پھر کاسنی کے بارے میں دیکھا کہ ”تمہارے لئے کاسنی موجود ہے۔ ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب جنت کے پانی کے قطرے اس کے پودے پر نہ گرتے ہو“

(ابو نعیم)

جب کلوچی میں شفا ہے۔ کاسنی کے پتے جنت کے پانی سے فیض رسیدہ ہیں تو ان دونوں کا ملاپ کسی بھی مشکل مسئلہ کا حل ہونا چاہئے۔ ابتدائی نسخہ میں۔

75 گرام

کلوچی

25 گرام

برگ کاسنی

ملا کر مریضوں کو ایک چھوٹا بچہ صبح۔ شام کے بعد دیا گیا۔ خون میں شکر کی مقدار کم ہونے لگی اور مریضوں کی کنزروی کم ہوتی گئی۔ مزید مشاہدات کے بعد اس نسخہ میں جیتھی ملائی گئی اور اب سوزش سے محفوظ رکھنے کے لئے قسط البحرہ بھی شامل کر دی گئی۔ جیتھی کے بارے میں قاسم بن عبدالرحمان روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”جیتھی سے شفا حاصل کیا کرو“ (ابو نعیم)

اس موضوع پر محمد احمد ذہبی بیان کرتے ہیں کہ۔

”میری امت اگر یہ جان لے کہ جیتھی کے اندر کیا کیا قاعدے موجود ہیں تو

وہ اسے سونے کے عوض بھی لینے میں دریغ نہ کریں“

اس مرحلہ پر مرز بخوش بھی توجہ میں آئی۔ کیونکہ بوعلی سینا کے نسخہ میں جیتھی اور مرز بخوش شامل تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرز بخوش کے بارے میں صرف ایک ہی حدیث دیکھنے میں آئی جس میں انہوں نے اسے زکام کے لئے مفید قرار دیا ہے۔



علم الادویہ کی ساری کتابوں میں تلاش کیا گیا۔ اس کے اثرات میں اندرونی فوائد کا کہیں سے بھی تذکرہ نہیں مل سکا۔ جس نے بھی اسے استعمال کیا زکام، کھانسی اور درروں سے آگے نہیں گیا۔ البتہ ہومیو پیتھک طریقہ علاج میں جنسی کمزوریوں کے لئے نوجوانوں کو دی جاتی ہے۔ ابن القیم نے اس کو آنکھ میں سفیدی اور موتیا بد میں مفید قرار دیا اور فی الواقع وہ ایسی ہے۔ لیکن اس کے افعال میں ہسانی کمزوری۔ ہاضمہ یا خون کی غلیظوں پر اثرات کا کوئی قائل اعتاد تذکرہ نہیں مل سکا۔ جس کی وجہ سے اسے زیابٹیس میں استعمال کرنے کا جواز سمجھ میں نہیں آ سکا۔

ان تمام مشاہدات کی روشنی میں پچھلے دس سالوں سے ہم زیابٹیس کے مریضوں کا علاج ذیلی نسخہ سے کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں۔

1۔ نہار منہ اور عصر کے وقت بڑا چھچھو شہ۔ ابلے پانی میں

2 ہر کھانے کے بعد 3 دانے خشک انجیر

3۔ کلونچی 55 گرام

برگ کاسنی یا بج 15 گرام

عجم جلد 10 گرام

قطہ البحر 10 گرام

حب الرشاد 10 گرام

اس مرکب کا پون سے پورا چھوٹا چھچھو صبح، شام کھانے کے بعد۔

4۔ وٹامن ب اور سی کی مرکب گولیاں۔ صبح، شام

حالات کے مطابق نسخہ میں مناسب رد و بدل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ نسخہ زیابٹیس

کی بدترین حالت کے لئے بھی مفید ہے۔

کچھ مریضوں میں بہتری نظر آتی ہے۔ لیکن خون میں گلوکوس کی مقدار نارمل پر

نہیں آتی یا پیشاب میں شکر کی مقدار موجود رہتی ہے۔ کبھی تو ہم نے اس پر توجہ

چھوڑ دی اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں معمول پر آگئیں اور کبھی اضافی طور پر شکر کو کم

کرنے والی کسی گولی کا چوتھائی حصہ صبح ناشہ کے بعد دے دیا۔ مریض کی غذا اور ذہنی

دباؤ پر توجہ دی گئی تو اکثر اوقات مسئلہ کسی اضافہ یا تبدیلی کے بغیر حل ہو گیا۔

اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بلب کو اگر موقع دیا جائے اور حالات سازگار ہوں تو وہ پھر سے انسولین پیدا کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ جدید علاج میں کئے گئے طویل مشاہدات کے دوران ایسے مریض دیکھنے میں نہیں آتے جن کی بیماری وقت کے ساتھ ختم ہو گئی ہو۔ جبکہ طب نبوی کے تحائف سے استفادہ کرنے کی صورت میں ایسا ہونے کے امکانات موجود ہیں۔

### دل اور ذیابیطس

ذیابیطس میں پیچیدگیاں ایک اہم مسئلہ ہیں۔ جب مریض کی قوت مدافعت ماند پڑے تو وہ تپ دق سے لے کر پھوڑے، مہسبوں تک کے مسائل میں مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ جن کے لئے اس کی غذا میں لحمیات کی معقول مقدار، تازہ پھل اور شہد ہونے چاہئیں۔ خون کی ٹالیوں میں رکاوٹ اور اس کی وجہ سے پیروں پر زخم اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اکثر اوقات پیروں کی انگلیاں یا پورا پیر کاٹنا پڑتا ہے۔ خون کی ٹالیوں میں اور دل پر ذیابیطس کے اثرات سے پچلاؤ کے لئے طب جدید والے کہتے ہیں کہ خون کی کویسٹروں کی مقدار کو کم کیا جائے۔ جس غرض کے لئے کچھ گولیوں کی شہرت ہے۔ لیکن کویسٹرول عام طور پر کم نہیں ہوتی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کئے دلیا کو پیٹ کی بیماریوں اور مریض کی کمزوری کے لئے اکسیر قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہؓ کی ایک روایت میں ارشاد گرامی ہوا۔

”جو کا دایا مریض کے دل کے جملہ مسائل کا کھل علاج ہے اور مریض کے

دل پر سے غم کا بوجھ اتار دیتا ہے۔“ (بخاری مسلم، احمد)

یہ ایک حقیقت ہے کہ پندرہ دن تک جو کا دایا کھانے کے بعد خون میں کویسٹرول کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس لئے اوٹ پٹانگ ادویہ کی بجائے ذیابیطس کے مریض علی الصبح جو کا دایا پانی میں پکا کر پھر تھوڑا سا دودھ ملا کر اس میں کھانڈ کی جگہ شہد ملا کر کھائیں تو دل کے دورہ سے محفوظ رہنے کے علاوہ کویسٹرول کے اضافہ

سے بچاؤ کے لئے خطرات سے بھی بچ جائیں گے۔

خون کی نالیوں میں حرار اور خوراک میں چکنائیوں کی کثرت کی وجہ سے نالی جاتی ہے۔ یہ کیفیت بالکل ان طبع جس طرح نالیوں میں گارا وغیرہ جم کر ان کو نیم مسدود کر دیتے ہیں۔ طب میں اسے ARTERIO SCLEROSIS کہتے ہیں۔ ریڈیٹس میں شریانوں میں یہ صورت حال اکثر جگہوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ جب نالیوں میں ہوتی ہے تو GANGRENE جیسی خطرناک مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ جبکہ دماغ کی نالیوں میں رکاوٹ بیہوشی اور دوسرے دماغی عوارض کا باعث بنتی ہے۔ کہتے ہیں کہ DUXII نامی گولیوں سے اس کیفیت کا مداوا ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہ گولیاں اپنی ذاتی تجرباتی میں کئی مریضوں کو دی ہیں اور دوسروں کو دیتے دیکھا ہے لیکن تندرست ہونے والا کوئی دیکھ نہیں گیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریانوں اور خاص طور پر دل کی شریانوں میں رکاوٹ کے علاج میں بھی کامیابہ۔ کھجور اور اس کی مٹھلیاں شہد کا ارشاد فرمایا۔ ہم نے ایسے مریضوں کو ابتدائی طور پر انجیر اور جو کا دلیہ شدہ ڈال کر دیا۔ اکثر اوقات اس سے زیادہ کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ ورنہ ان کو کھجور کی مٹھلیاں پیش کر کھانے سے بھی یہ مقصد حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہاں پر یہ اہم بات توجہ میں رہے کہ جسم کے کسی حصہ کو اگر خون منقطع ہو جائے اور وہ حصہ نیلا پڑ جائے تو اس کا مطلب خیموں کی وفات ہے۔ چونکہ کسی مردہ حصہ کو پھر سے زندہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے مرض جب یہاں تک بڑھ جائے تو ادویہ سے مزید کوشش کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مردہ حصہ کو جسم سے جلد از جلد جدا کر دینے سے مریض کی زندگی بچائی جاسکتی ہے۔

شریانوں کی بندش کا علاج ان کو بند ہونے سے پہلے کرنا چاہئے بلکہ ریڈیٹس کے ہر مریض کو یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھنی چاہئے کہ اس کی نالیوں دماغ اور دل کی نالیوں وقت کے ساتھ بند ہو سکتی ہیں وہ ان سے بچنے کے لئے پیڈل چھڑا رہے۔ غذا میں چکنائیوں کو بند کر دے۔ دودھ اگر چہنا ہو تو گرم نکلا ہو۔ ہوتا نرم اور پیر کو تکلیف نہ دینے والا ہو۔ پیروں پر مسندتی اور سرکہ مار کر ہفتے میں ایک دو مرتبہ لگایا جائے۔ اس سہ پیروں کی کھل کی معمولی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر کبھی زخم ہو اور روزمرہ کے علاج سے آرام نہ آئے تو پھر کسی مستند معالج سے فوراً رجوع کریں۔